

۲-۲- بیماری‌های مهم درختان میوه

هدف‌های رفتاری: در پایان این قسمت، از فرآگیر انتظار می‌رود بتواند:


- ۱- بیماری‌های مهم درختان میوه را توضیح دهد.
- ۲- مناطق انتشار آن‌ها را بشناسد و نام ببرد.
- ۳- گیاه بیمار را شناسایی کند.
- ۴- دوره‌ی رشد عامل بیماری را توضیح دهد.
- ۵- مهم‌ترین آثار خسارت این بیماری‌ها را تشخیص دهد.
- ۶- با روش‌های مناسب نسبت به کنترل این بیماری‌ها اقدام کند.

لکه‌ی سیاه سیب

۱- مناطق انتشار: این بیماری در اکثر نقاط ایران شامل کناره‌ی دریای خزر، آذربایجان، فارس، خراسان، بروجرد، همدان، قزوین، خوزستان و تهران انتشار دارد.

میزان: این بیماری علاوه بر سیب، به گلابی، زالزالک و ازگیل ژاپنی نیز حمله می‌کند.

۲- زیست شناسی: قارچ^۱ عامل بیماری در چرخه‌ی زندگی خود دارای دو مرحله‌ی مشخص انگلی و گندرویی می‌باشد. مرحله‌ی انگلی معمولاً روی میوه و برگ درخت دیده می‌شود و مرحله‌ی گندرویی آن روی برگ‌های خزان شده تا اواخر بهار سال آینده می‌گذرد.



۳—علائم بیماری و خسارت: بروز لکه‌هایی که روی برگ‌ها و میوه‌ها که عمدتاً شامل کاهش محصول و مرغوبیت میوه، صدمه به شاخه و برگ درختان می‌باشد. آسودگی شدید میوه اگر در ابتدای فصل باشد سبب بد شکلی، شکافتن و ریختن میوه‌ها شده و اگر در انتهای فصل باشد سبب ایجاد لکه‌های سیاه بر روی میوه می‌شود.



اولین علائم بیماری به صورت لکه‌های روشن زیتونی رنگ در زیر سطح کاسبرگ‌ها یا برگ‌های کوچک و یا در سطح رویی برگ‌های جدید دیده می‌شود که سپس به لکه‌های سیاه تبدیل می‌گردد. لکه‌هایی که روی میوه به وجود می‌آیند نیز ابتدا مدور و محملی و زیتونی رنگ‌اند ولی بعداً سیاه می‌شوند و بعضی اوقات شکاف هم بر می‌دارند.

۴- کنترل بیماری:

الف - زراعی:

- استفاده از واریته‌های مقاوم

- هرس شاخه‌های آلوده و سوزاندن آن‌ها

ب - مکانیکی:

- جمع آوری کلیه‌ی برگ‌ها پس از خزان و سوزاندن آن‌ها

ج - شیمیایی: حداقل سه نوبت سم‌پاشی با قارچ‌کش‌هایی که کارشناسان حفظ نباتات توصیه می‌کنند برای دفع این بیماری ضروری است. بار اول، قبل از بازشدن غنچه‌های گل؛ بار دوم پس از ریش گلبرگ‌ها و بار سوم ۱۰ روز پس از سم‌پاشی بار دوم.

گموز مرکبات

۱- مناطق انتشار: نواحی کشت مرکبات در شمال و جنوب کشور

۲- زیست شناسی: عامل این بیماری قارچ است که نوع آن در شمال^۱ و جنوب^۲ کشور با هم تفاوت دارد. عامل بیماری در خاک‌های مرطوب و خیس به خوبی رشد می‌کند. در این خاک‌ها رطوبت کافی برای حرکت و جابه‌جایی زئوسپورها فراهم بوده و زئوسپورها توسط تازک‌هایی که دارند در داخل خاک جابه‌جا شده تا خود را به طوفه یا ریشه‌ی گیاه میزبان برساند و در زخم‌ها و ترک‌های طوفه جا بگیرد. رطوبت اشباع بهترین میزان رطوبت برای تشکیل اسپور و حرکت زئوسپورها می‌باشد. اسیدیته‌ی مناسب برای رشد عامل بیماری ۶-۷/۵ است. عامل این بیماری قادر است درجه حرارت بین ۱۰ تا ۴۰ درجه‌ی سانتی‌گراد را تحمل نماید.


۳- علائم بیماری و خسارت: نفوذ عامل بیماری از طریق زخم‌های موجود بر روی طوفه صورت می‌گیرد. بدین طریق که پس از فراهم شدن رطوبت کافی جوانه زده و آلودگی آغاز می‌گردد. مهم‌ترین نشانه‌ی بیماری ترشح صمغ آبکی در ناحیه‌ی آلودهی پوست طوفه و در نزدیکی سطح خاک

۱- *Phytophthora parasitica*

۲- *Diplodia natalensis*

است. زخم‌هایی که بر اثر بیماری به وجود می‌آید ابتدا در یک طرف پوست طوقه به وجود آمده و سپس توسعه می‌یابد. رنگ زخم‌هایی که ایجاد می‌گردند از قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای تیره متغیر است.

بر اثر حمله‌ی این بیماری چون طوقه از بین می‌رود در انتقال شیره‌ی پرورده اختلال به وجود می‌آید در نتیجه ریشه‌ی درخت به تدریج کم می‌شود و از بین می‌رود و نشانه‌هایی در قسمت تاج درخت از جمله کاهش برگ و ریزش آن، کوچک‌ماندن میوه‌ها، خشکیدگی سر شاخه‌ها و کاهش ریشه‌ی درخت مشاهده می‌گردد.



۴- کنترل بیماری:

الف- زراعی:

- استفاده از پایه‌های مقاوم


- پیوند، تا حد امکان از سطح خاک فاصله‌ی بیشتری داشته باشد.

ب - شیمیایی:

- پوست آلوده را بزیده و سپس محل مورد نظر را با مواد شیمیایی ضد عفونی می کنند.
 - چنانچه خاک محل کاشت آلوده است نسبت به ضد عفونی خاک اقدام می کنند.
- ج - قبل از کاشت بذور برای تهیه‌ی پایه، آنها را در آب 5° درجه‌ی سانتی گراد به مدت ۱ دقیقه ضد عفونی می نمایند.

سفیدک سطحی مو

- ۱- مناطق انتشار: در کلیه‌ی مناطق موکاری کشور مشاهده می شود.
- ۲- زیست‌شناسی: عامل بیماری سفیدک سطحی مو یک نوع قارچ^۱ است.



۳- علائم بیماری و خسارت: قارچ عامل بیماری تمام اندام‌های جوان گیاه را مورد حمله قرار می دهد ولی بارزترین علائم بر روی سطوح فوقانی برگ‌ها ظاهر می گردد که همان پوشش آردی می باشد. برگ‌ها در هوای گرم و خشک به طرف بالا لوله می شوند. برگ‌های مبتلا در تابستان به رنگ قهوه‌ای درآمده و خزان می کنند. این لکه‌های قهوه‌ای بر روی شاخه‌های جوان نیز تشکیل می گرددند. اگر خوشها در اوایل ظهور مورد حمله بیماری قرار گیرند گل‌ها بدون تلقیح مانده و می ریزند. اگر میوه‌ها مورد حمله قرار گیرند گرد سفید خاکستری رنگ تمام حبه‌ها را می پوشانند.

میوه‌های صورت نارس و ترش مانده و می ترکند. دانه‌های انگور کثیف، چرکین و نامرغوب و

ترک خورده می‌شوند. درخت مو بهشدت ضعیف شده و رشد چندانی ندارد. مقدار محصول بهشدت کاهش می‌یابد در موقع شدت بیماری حتی یک خوشه نیز برای خوردن باقی نخواهد ماند. به طور کلی در ایران ۵۵-۶۰ درصد سطح موستان‌ها به بیماری سفیدک مبتلا می‌شوند.



۴- کنترل بیماری:

الف- زراعی:

- هرس شاخه‌های آلوده و سوزاندن آن‌ها

- بیل زدن پای درختان پس از ریزش برگ‌ها و دفن برگ‌ها در زیر خاک

– کاشت به طریقی که امکان تهویه مناسب برای درخت وجود داشته باشد.

ب – شیمیایی:

– عملیات سپاشی با استفاده از قارچ‌ها متناسب با توصیه‌ی کارشناسان حفظ بیات در

سه نوبت:

۱ – زمانی که جوانه‌های برگ تازه باز شده‌اند،


۲ – زمان گل کردن انگور،

۳ – ۲ تا ۳ هفته پس از نوبت دوم.

لکه‌ی آجری برگ بادام

۱ – مناطق انتشار: این بیماری در بیشتر مناطق بادام خیز کشور از جمله قزوین، آذربایجان و اصفهان وجود دارد.

۲ – زیست‌شناسی: عامل بیماری نوعی قارچ^۱ است.



درختان ضعیف می‌شوند و محصول آن‌ها حدود ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.




۴—کنترل بیماری: کنترل این بیماری به طریق شیمیایی صورت می‌گیرد. برای کنترل این بیماری بایستی یک بار در اسفند ماه درختان و برگ‌های ریز آن‌ها را با قارچ‌کش سم‌پاشی نمود و چهار نوبت در بهار با سوموم قارچ‌کش عمل سم‌پاشی را انجام داد.

اولین سم‌پاشی بهاره را باید بعد از ریزش گلبرگ‌ها انجام داد، زیرا در این موقع میوه‌های بادام کوچک بوده و جوانه‌های برگی در حال باز شدن هستند و سم‌پاشی‌هایی بعدی را به فاصله‌ی دو هفته از یکدیگر باید تکرار کرد.

پیچیدگی برگ هلو یا بیماری لب شتری

۱—مناطق انتشار: این بیماری در نواحی مختلف کشور از جمله آذربایجان، سواحل دریای خزر، اصفهان، خراسان و زنجان وجود دارد.

۲—زیست شناسی: عامل بیماری یک نوع قارچ^۱ است.



۳- علائم بیماری و خسارت: بازترین علائم بر روی برگ‌ها قابل مشاهده است. برگ‌ها در بهار پیچیده شده و پهنک در بعضی از قسمت‌های متورم و کلفت شده و به رنگ‌های سفید تا قرمز درمی‌آید که به همین جهت آن را لب‌شتری می‌گویند.

نشانه‌ها ممکن است بر روی تعدادی از برگ‌ها دیده شود ولی عملاً تمام برگ‌ها آلوده است. بر روی شاخه‌ها و میوه‌ها نیز لکه‌های شانکر دیده می‌شود. موقعی که برگ‌های آلوده به رنگ قرمز یا ارغوانی درآید اسپور قارچ سطح فوقانی برگ را به صورت گرد خاکستری می‌پوشاند و موجب خزان‌شدن برگ می‌شود.

خسارت شامل پیچیدگی، تغییر رنگ و ریزش برگ‌ها و آلودگی جوانه‌ها می‌باشد که سرانجام به ضعف درخت منجر می‌گردد. این بیماری در مناطق گرم و خشک اهمیت اقتصادی ندارد.



۴—کنترل بیماری: بهترین زمان برای کنترل شیمیایی بیماری ۳-۴ هفته قبل از شروع رشد دوباره در بهار (متورم شدن جوانه‌ها) می‌باشد. سم‌پاشی‌های بهاره معمولاً در سه نوبت انجام می‌گیرد نوبت اول قبل از باز شدن جوانه‌های گل. نوبت دوم بعد از ریزش گلبرگ‌ها. نوبت سوم تقریباً پانزده روز بعد از سم‌پاشی نوبت دوم. برای کنترل بهتر بیماری توصیه می‌شود در فصل پاییز پس از ریزش برگ‌ها نیز عملیات سم‌پاشی انجام گیرد.

۳-۲- بیماری‌های مهم سبزی‌ها و گیاهان زینتی


هدف‌های رفتاری: در پایان این قسمت، از فرآگیر انتظار می‌رود بتواند:

- ۱- بیماری‌های مهم سبزی‌ها و گیاهان زینتی را توضیح دهد.
- ۲- مناطق انتشار آن‌ها را نام ببرد.
- ۳- گیاه بیمار را شناسایی کند.
- ۴- دوره‌ی رشد عامل بیماری را توضیح دهد.
- ۵- مهم‌ترین آثار خسارت ناشی از این بیماری‌ها را تشخیص دهد.
- ۶- با روش‌های مناسب نسبت به کنترل این بیماری‌ها اقدام کند.

موزاییک گوجه فرنگی

۱- مناطق انتشار: این بیماری در اصفهان، شهرکرد، هرمزگان، کرمان، آذربایجان و اطراف تهران مشاهده شده است.

۲- زیست‌شناسی:



عامل بیماری ویروس موزاییک توتون می‌باشد.

۳- علائم بیماری و خسارت: از علائم مهم این بیماری کوتولگی گیاه، بدشکل شدن برگ‌ها، نکروز ساقه و دمبرگ و لکه‌دار و موزاییکی شدن و پیچیدگی برگ‌های جوان می‌باشد. در روی میوه باعث ایجاد لکه‌های زرد در روی میوه و حالت تاولی در آن می‌گردد. میوه‌ها بدشکل شده و خاصیت بازار پسندی ندارند. تولید در هکتار محصول نیز کاهش زیادی می‌یابد.



۴- کنترل بیماری:

الف - مکانیکی و زراعی:


- جلوگیری از انتقال ثانویه توسط لباس‌های آلوده، نشا، ابزار و ماشین‌های داشت مشترک زراعی از توتون به گوجه‌فرنگی.
 - از بین بردن علف‌های هرز حاشیه‌ی مزارع
 - از بین بردن بقایای گیاهی آلوده
 - کاشت ارقام مقاوم
- ##### ب - شیمیایی:
- ضدغفونی بذر با آنتی ویروس‌ها با توصیه‌ی کارشناسان حفظ نباتات

سفیدک داخلی کاهو

- ##### ۱- مناطق انتشار:
- این بیماری در خوزستان، مازندران، گیلان و فارس انتشار دارد.
- ##### ۲- زیست شناسی:
- عامل این بیماری نوعی قارچ^۱ است که علاوه بر کاهو به آندیو، شبکوره

^۱- *Bremia lactucae*

و آرتیشو نیز حمله می کند.



در شرایط مساعد پس از ۵-۶ روز چرخه‌ی زندگی قارچ عامل تجدید می‌شود.

۳- علائم بیماری و خسارت: در روی برگ‌های کاهو لکه‌های رنگ پریده‌ی زرد رنگی به قطر حدود یک سانتی‌متر ظاهر می‌شوند که به تدریج نکروزه می‌شوند و نسج گیاه در آن قسمت می‌میرد. در محل لکه‌ها قارچ به صورت قشر سفیدرنگ آرد آلود مشاهده می‌شود. این لکه‌ها به تدریج قسمت اعظم پهنه‌ک برگ را می‌پوشانند. خسارت بیماری اغلب در موقعی چشم‌گیر است که کاهو هنوز جوان و بدون مغز می‌باشد. در شرایط مناسب می‌تواند نشاها جوان را نیز مبتلا و خشک کند. اگر برگ‌های خارجی آلوهه باشند پس از برداشت به رنگ قهوه‌ای درآمده و باعث فساد سریع کاهو می‌شوند.

در صورت حمله‌ی بیماری، قسمت اعظم محصول کیفیت خود را از دست می‌دهد.

۴- کنترل بیماری:

الف - زراعی:

- از بین بردن بقایای گیاهان آلوهه

- از بین بردن علف‌های هرز اطراف مزرعه

ب - شیمیایی:

- ضد عفونی کردن بذر با قارچ کش‌ها

- توصیه می‌شود از روش شیمیایی استفاده نشود و در صورت استفاده، حداقل ۱۵ روز قبل از برداشت محصول باشد.


- استفاده از سوم قارچ کش با توصیه‌ی کارشناسان حفظ نباتات، با مشاهده اولین لکه‌های

پریده رنگ در روی برگ‌های خارجی کاهو.

سفیدک سطحی رز

۱- مناطق انتشار: این بیماری در تمام نقاط کشور شیوع دارد و به سفیدک نمدی یا حقیقی نیز معروف است.

۲- زیست‌شناسی: عامل بیماری نوعی قارچ است که در بهار آشکار می‌شود و در تمام دوره‌ی روش میزان به رشد خود ادامه می‌دهد.



۳- علائم بیماری و خسارت: خسارت شدید موقع به گل رفتن میزان اتفاق می‌افتد و به شاخه‌های جوان، برگ و غنچه‌ی گل و گلبرگ‌ها حمله می‌کند. برگ بعد از ابتلا پوشش یک‌نواخت



_ *Sphaeroteca pannosa rosae*

آردالود دارد. دمبرگ‌ها کوتاه و خمیده شده و سطح برگ چین‌دار می‌شود. نوک شاخه نیز رنگ سبز خود را ازدست داده و قهوه‌ای یا سیاه رنگ می‌شود و بالاخره می‌خشکد. کاسبرگ‌ها از لایه‌ی سفید رنگی پوشیده می‌شوند و حجم نهنج به دو برابر حجم طبیعی می‌رسد. غنچه‌های گل یا باز نمی‌شوند و یا پس از شکفتن می‌رینند.

۴—کنترل بیماری :

الف—زراعی:

— شاخه‌های جوان و آلوده با دقت هرس شوند.

ب—شیمیایی:

— با نظر کارشناسان حفظ نباتات می‌توان با سموم قارچ‌کش سم‌پاشی نمود.

باید توجه داشت که :

۱—سم‌پاشی با پیدایش اولین لکه‌ها انجام گیرد.

۲—موقع عصر یا ضعف تابش آفتاب سم‌پاشی شود.

خودآزمایی

- ۱ - عامل بیماری سیاهک آشکار گندم چگونه زمستان گذرانی می کند؟
- ۲ - چگونه می توان زنگ غلات را تشخیص داد؟
- ۳ - سیکل زندگی سفیدک داخل یونجه را رسم کنید.
- ۴ - چرا سس مجبور است به صورت انگل زندگی کند؟
- ۵ - میزان های گل جالیز را نام ببرید.
- ۶ - بیشترین خسارت سفیدک سطحی چندر قند در چه موقعی بر گیاه وارد می شود؟
- ۷ - نماتود چندر قند چند نسل در سال دارد؟
- ۸ - سیکل زندگی سفید داخلی چندر قند را توضیح دهید.
- ۹ - علائم بیماری بوته میری سبب زمینی را توضیح دهید.
- ۱۰ - با سفیدک دروغی سبب زمینی چگونه می توان مبارزه شیمیایی نمود؟
- ۱۱ - علائم ظاهری بیماری بلاست برنج را توضیح دهید.
- ۱۲ - بیماری لکه های قهوه ای برنج در چه شرایطی حداکثر فعالیت را دارد؟
- ۱۳ - سفیدک داخلی سویا در کدام مناطق شیوع دارد؟
- ۱۴ - علائم بیماری بوته میری پنبه را توضیح دهید.
- ۱۵ - میزان های دیگر لکه های سیاه سبب را نام ببرید.
- ۱۶ - زیست شناسی عامل بیماری گموز مرکبات را توضیح دهید.
- ۱۷ - چگونه می توان با سفیدک سطحی مو با روش زراعی کنترل نمود؟
- ۱۸ - لکه های آجری برگ بادام چگونه به میزان خود خسارت وارد می کند؟
- ۱۹ - پیچیدگی برگ هلو چرا به بیماری لب شتری معروف است؟
- ۲۰ - سیکل زندگی مو زاییک گوجه فرنگی را رسم کنید.
- ۲۱ - سفیدک داخلی کاهو چند نسل در سال دارد؟
- ۲۲ - علائم بیماری سفیدک سطحی رز را توضیح دهید.