

فصل دوم

ذرّت *Zea mays L.*



هدف‌های رفتاری: انتظار می‌رود در پایان این فصل فراگیران بتوانند:

- ۱- تاریخچه و منشأ پیدایش ذرت را در دو سطر توضیح دهند؛
- ۲- اهمیت اقتصادی، ارزش غذایی و موارد استفاده‌ی ذرت را نام ببرند؛
- ۳- خصوصیات گیاه‌شناسی ذرت را توضیح و تشخیص دهند؛
- ۴- شرایط مناسب رشد و نمو ذرت را توضیح دهند؛
- ۵- ارقام مختلف ذرت را نام برد، چگونگی آماده نمودن رقم مطلوب را جهت کاشت توضیح و انجام دهند؛
- ۶- عملیات آماده‌سازی ذرت را توضیح داده، آن را انجام دهند؛
- ۷- هریک از عملیات کاشت، داشت و برداشت را به طور جداگانه توضیح و انجام دهند؛
- ۸- موقعیت این محصول را از نظر سطح زیر کاشت و عملکرد آن بیان کنند.

تاریخچه و منشأ ذرت

ذرت اولین بار به سال ۱۴۹۲ توسط کریستف کلمب – کاشف قاره‌ی امریکا – در کوبا شناخته و به اروپا برده شد. این گیاه سپس از اروپا به قاره‌ی آفریقا و آسیا و بالاخره به سراسر جهان راه یافت. با این حال، ذرت از گیاهان زراعی بسیار قدیمی قاره‌ی امریکاست. حداقل ۵۶ سال قبل از میلاد در ایالت ایندیاناوی امریکای شمالی کشت ذرت معمول بوده است. از نظر منشأ، احتمال داده می‌شود که منشأ اولیه‌ی این گیاه مکزیک در امریکای مرکزی و منشأ ثانویه‌ی آن امریکای جنوبی باشد. کشفیات باستان‌شناسی نشان می‌دهد که ۸۰۰۰–۴۵۰۰ سال قبل از میلاد این گیاه در مکزیک وجود داشته است.

خصوصیات گیاه‌شناختی



ذرت، گیاهی است یک ساله از خانواده‌ی گندمیان. ریشه‌ی ذرت به صورت افسان و ساقه‌ی آن برافراشته و بندبند است. ارتفاع آن نیز به طور معمول $1/5\text{--}3$ متر و گاهی به بیش از ۴ متر می‌رسد. برگ‌ها به صورت متناوب، کشیده و شمشیری شکل با رگبرگ‌های موازی است. گل در ذرت دارای همان ویژگی‌های گل در گندم است با این تفاوت که گل نر فاقد مادگی و گل ماده فاقد پرچم بوده و خامه آن بسیار بلند بوده و به ابریشم معروف است. گل آذین نر به صورت خوش‌های مرکب در انتهای ساقه قرار دارد. گل آذین ماده به صورت سنبله‌ی مرکب در زاویه‌ی بین برگ‌ها با ساقه به تعداد متغیر و معمولاً $1\text{--}3$ عدد قرار گرفته است. بنابراین، ذرت گیاهی یک پایه و درنتیجه دگرگشن است.

میوه‌ی ذرت گندمه است. در فرهنگ عوام به مجموعه‌ی گل آذین ماده که در آن مادگی گل‌ها تبدیل به میوه شده است بلال گفته می‌شود.

شکل ۲-۱۲

فعالیت

بذور و بوتهای ارقام مختلف ذرتی که در منطقه کاشت می‌شوند جمع آوری و در کلکسیون گیاهان زراعی خود نگهداری کنید.

ارزش غذایی و موارد مصرف ذرت

ترکیبات غذایی ذرت و مقایسه‌ی آن با چند غله‌ی دیگر در جدول ۲-۴ آمده است.

موارد مصرف ذرت را بیش از ۵۰۰ مورد ذکر کرده‌اند که می‌توان جهت سهولت مطالعه، این موارد را به طور کلی در ۳ گروه زیر تقسیم‌بندی نمود.

۱- غذای انسان: مصرف نان ذرت در کشورهایی از آفریقا و امریکا به صورت خالص یا مخلوطی از آرد گندم معمول می‌باشد. علاوه بر این، میوه‌ی ذرت در مرحله‌ی شیری به صورت خام، در مرحله‌ی سخت به صورت پخته، سرخ کرده و بوداده (پاپ کورن) مصرف می‌شود.

۲- خوراک دام: دانه‌ی ذرت به عنوان یکی از ترکیبات اصلی در کنسانتره‌ی خوراک دام، در تقدیمه‌ی انواع دام‌ها و طیور مورد مصرف بسیار زیادی دارد. علوفه‌ی حاصل از شاخه و برگ ذرت به صورت تازه و سیلو شده به عنوان یکی از مواد غذایی اصلی در واحده‌ای دامپروری مورد استفاده‌ی گسترده دارد.

۳- در صنعت: ذرت، ماده‌ی خام بسیاری از فرآورده‌های صنعتی است. از جمله‌ی این فرآورده‌ها می‌توان به روغن نباتی، نشاسته، الکل، دکسترن، کاغذ دیواری، نیتروگلیسیرین، مواد بهداشتی، آرایشی و ترکیبات دارویی متعدد اشاره کرد.

جدول ۲-۴- ترکیبات غذایی عمدی ذرت و مقایسه‌ی آن با چند غله دیگر

ترکیبات محصول	خاکستر	پروتئین	چربی	قند	نشاسته
دانه‌ی ذرت	۱/۴۴	۱۰/۳	۴/۸	۱/۹۷	۷۱/۵
دانه‌ی گندم	۱/۹	۹-۱۳	۲	-	۷۵-۸°
دانه‌ی برنج	۱/۳	۸	۲	-	۷۶
دانه‌ی جو	۲/۵	۱۰	۳	-	۵۸-۷°

انواع ذرت

ذرت از نظر: طول ساقه، رنگ دانه، تعداد خوشة، وزن هزار دانه، طول خوشة، طول دوره‌ی رویشی، ویژگی‌های اندوسپرم، موارد مصرف و غیره بسیار متنوع بوده و ارقام بسیاری دارد به‌طوری که تعداد ارقام آن به چندین هزار می‌رسد. پژوهشگران این ارقام را به طرق مختلفی دسته‌بندی کرده‌اند که از میان آن‌ها طبقه‌بندی زیرکه بر اساس فرم و مشخصات دانه است بیش از همه، مورد پذیرش قرار گرفته است:

۱- دندان اسپی

۲- ذرت سخت یا ذرت بلوری یا ذرت کهربایی

۳- ذرت آردی یا ذرت نرم

۴- پاپ کورن

۵- ذرت شیرین

۶- ذرت مویی

۷- ذرت غلافدار

بررسی کنید

۱- ذرت علوفه‌ای مورد کاشت در منطقه‌ی شما، جزء کدام ارقام می‌باشد؟

۲- علت نام‌گذاری ذرت دندان اسپی چیست؟

مشخصات آب و هوایی مناسب کشت ذرت

ذرت عمده‌اً در عرض جغرافیایی 30° تا 55° درجه کاشت می‌شود. هر چند به علت داشتن انواع و ارقام متعدد کاشت آن در خارج از این محدوده نیز کم و بیش گسترش یافته است. در همه‌ی سرزمین‌های گرمسیری از سطح دریا تا چند هزار متر بالای سطح دریا کاشت آن عملی است. ولی بخش عمده‌ای از ذرت در جهان در شرایط آب و هوایی معتدل و نیمه‌گرمسیری کاشته می‌شود. واکنش ذرت به شرایط اقلیم به شرح زیر است:

۱- حرارت: ذرت در مناطقی قابل کاشت است که 12° - 18° روز فصل بدون یخ‌بندان داشته و متوسط دمای ماههای گرم آن بین 21° - 27° درجه سانتی‌گراد باشد. مناسب‌ترین دما برای

جوانه زدن ذرت $18/3^{\circ}\text{C}$ است. دمای کمتر از $12/8^{\circ}\text{C}$ ، سرعت جوانه زنی و عملکرد آن را کاهش می‌دهد و چنان‌چه بعد از سبز شدن دما هر چند به مدت ۴–۳ ساعت به $4/4^{\circ}\text{C}$ برسد کاملاً از بین می‌رود. مناسب‌ترین درجه‌ی دما در مرحله‌ی رشد و نمو $27-21^{\circ}\text{C}$ است. حرارت پایین‌تر از 10°C در این مرحله و نیز آب و هوای سرد و مرطوب اثر سوئی در روند رشد داشته و عملکرد را شدیداً کاهش می‌دهد. مناسب‌ترین دما برای توسعه‌ی ریشه و نیز مرحله گل‌دهی حدود 24°C و برای تشکیل دانه‌ها $24-26^{\circ}$ و برای رسیدن دانه $20-22^{\circ}$ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. دمای بالاتر از 30°C در گل‌دهی ایجاد اختلال می‌کند.

۲—نور: ذرت گیاهی روز کوتاه است، ولیکن انواع بی‌تفاوت نیز دارد. لذا کاشت ۲ بار در سال در اغلب مناطق ممکن است. از آنجایی که ذرت گیاهی ۴ کربنه^۱ است، در مقایسه با گندم و جو (گیاهان ۳ کربنه) شدت نور بالایی را طلب می‌کند. کاهش شدت نور (ابری شدن هوا) یا کاشت متراکم، تأثیر بدی روی عملکرد دانه‌ی ذرت دارد.

۳—رطوبت: ذرت برای ساختن یک کیلوگرم ماده‌ی خشک به حداقل 315 و حداکثر 413 کیلوگرم آب نیاز دارد. دانه ذرت با جذب آب به مقدار $44-47^{\circ}$ درصد وزن خود با فراهم شدن سایر شرایط شروع به جوانهزنی کرده و بر حسب شرایط منطقه به $51^{\circ}-88^{\circ} 00$ میلی‌متر (۰–۵۱ متر) متر مکعب) آب برای یک فصل رشد و نمو نیاز دارد. حساس‌ترین مرحله ذرت به آب از ظهور گل آذین نر تا ظهور گل آذین ماده است.

رطوبت نسبی محیط بخصوص در مرحله‌ی گرده‌افشانی این گیاه، یک عامل بسیار مهم می‌باشد و حد مطلوب آن $85-75^{\circ}$ درصد است. خشکی هوا در این مرحله، همانند رطوبت بیش از حد هوا، باعث کاهش عملکرد به بخصوص عملکرد دانه می‌شود.

۴—خاک: ذرت یکی از گیاهانی است که در خاک‌های با بافت متفاوت قابل کاشت است. اما خاک‌های نسبتاً سبک، رسی شنی گرم و شنی رسی، انواع خاک‌های لیمونی که به مقدار کافی مواد آلی و غذایی داشته باشند، برای آن بهتر است. تنها محدودیت در کشت ذرت، شوری و باتلاقی بودن خاک است. مطلوب‌ترین pH برای کشت ذرت $6-7$ است هر چند در محدوده $5-8^{\circ}$ نیز قابل کشت می‌باشد. لذا در خاک‌های قلیایی نیز به شرط فراهم بودن سایر شرایط می‌تواند رشد و نمو

۱—برخی از گیاهان دارای سیستم فتوسنتزی C_3 ، گروهی C_4 و CAM هستند. گیاهان زراعی عموماً C_4 یا C_3 هستند. گیاهان C_3 گیاهانی هستند که اولین محصول پایدار حاصل از تثبیت کربن در آن‌ها یک ترکیب ۳ کربنی به نام اسید ۳-فسفوگلکسیریک است. در حالی که در گیاهان C_4 این ماده اسید‌مالیک یا اسید‌آسپاراتیک چهار کربنی است.

نماید. EC خاک ذرت حداکثر ۴ می‌باشد و اگر مقدار EC خاک به ۵، ۶ یا ۷ برسد به ترتیب ۱۰، ۵ و ۰ درصد افت عملکرد حادث خواهد شد.

تناوب زراعی

از میان انواع تناوب‌هایی که در زراعت ذرت رایج می‌باشد، به چند نمونه اشاره می‌شود:

۱- ذرت، گندم، سویا.

۲- ذرت، سویا، یولاف، شبدر.

۳- چغندر قند، حبوبات، ذرت، شبدر، گندم.

تحقیق کنید

تناوب‌های رایج در زراعت ذرت منطقه‌ی خود را جمع‌آوری و نتایج را در کلاس بحث کنید.

تهیه‌ی زمین:


الف – آماده‌سازی فیزیکی زمین: مراحل آماده‌سازی زمین ذرت همانند اغلب محصولات دیگر به این نحو است که ابتدا سطح زمین را آماده‌ی شخم می‌کنند. آن‌گاه بر حسب زمان شخم (پاییزه یا بهاره) عمق خاک سطحی و محصول قبلی، آن را حدود ۲۵–۴۰ سانتی‌متر شخم می‌زنند. بعد از شخم و قبل از کاشت، عملیات تکمیلی شخم، مثل دیسک و هرس انجام می‌گیرد و سپس زمین صاف می‌گردد. به ترتیبی که تا عمق ۱ سانتی‌متری خاک نسبتاً نرم بشود.

ب – آماده‌سازی شیمیایی زمین: محصول ذرت چه به صورت دانه و چه به صورت علوفه‌ای، به اندازه‌ی قابل توجهی از سایر گیاهان علوفه‌ای بیشتر است؛ به همین جهت به کود بیشتری احتیاج دارد. ولی نمی‌توان فرمول استانداردی را جهت تأمین احتیاجات غذایی ذرت ارایه کرد. این امر بستگی به عوامل مختلفی چون رقم ذرت، تراکم بوته در هکتار، میزان رطوبت در دسترس، جای ذرت در تناوب، وضع حاصل خیزی خاک و غیره دارد. جدول ۵-۲ معیاری کلی از میزان احتیاج ذرت به عنصر غذایی مختلف را شان می‌دهد.

جدول ۵-۲- معياري کلی از احتياج ذرت به چند عنصر غذائي

دانه

سيلو



فعاليت

حداقل ۵٪ هكتار از اراضي واحد آموزشی را برای کاشت ذرت آماده سازی نمایید.

باید خاطر نشان کنیم که تشکیل ماده‌ی خشک در ذرت در ابتدا کند است ولی پس از گل دادن شتاب می‌گیرد. این نکته‌ی مهم را باید هنگام تصمیم گیری در مورد زمان بندی مصرف کود در نظر گرفت. به طور معمول ۵ درصد کود ازته را به صورت پایه و ۵ درصد بقیه را در آستانه گل دهی گیاه به عنوان سرک مصرف می‌کنند.

کاشت ذرت

روش‌های مختلف کاشت ذرت:

۱- کاشت ردیفی: در این روش که معمولی‌ترین روش کاشت ذرت می‌باشد، بذور با ردیف کارهای مکانیکی یا پنوماتیکی به فاصله دلخواه یا تنظیمی کشت می‌شوند. تجربه نشان داده که بهترین فاصله‌ی میان دو ردیف برای ذرت دانه‌ای بین ۱۰°-۷۵ سانتی‌متر و برای ذرت علوفه‌ای ۸°-۵ سانتی‌متر است اما با توجه به فواصل واحدهای برداشت ماشین چاپر که ۷۵ سانتی‌متر است، فاصله ردیف‌ها در ذرت علوفه‌ای عموماً ۷۵ سانتی‌متر می‌باشد. شکل ۱۳-۲ عمليات بذر کاری را به وسیله‌ی ردیف کار ذرت نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۳ - دستگاه ردیف کار ذرت در حال کاشت ردیفی

۲- کاشت در هم: در صورت عدم دسترسی به ردیف کار، می توان به صورت در هم بذر پاشی نمود. بذر پاشی به صورت دستی (در مساحت های کوچک) یا به وسیله‌ی ماشین سانتریفوژ (در مساحت های بزرگ) صورت می گیرد. در هر صورت، بعد از بذر پاشی به ایجاد ردیف های آبیاری با دستگاه فاروئر اقدام می شود (شکل ۲-۱۴). در این روش عملیات برداشت هم با دست صورت خواهد گرفت. برای چرای مستقیم نیز روش مشکل داری محسوب نمی شود، اما چنان‌چه بخواهیم محصول علوفه‌ای این روش را با چاپر برداشت کنیم، درصد تلفات نسبت به کاشت ردیف‌ها بسیار بیشتر است. چرا؟



شکل ۲-۱۴ - دستگاه فاروئر بعد از بذر پاشی ایجاد فارو می نماید.

انتخاب بذر و آماده کردن آن برای کاشت: انتخاب بذر باید با توجه به شرایط آب و هوایی و نیز هدف از کاشت ذرت (علوفه یا دانه‌ای) صورت گیرد. در موقع انتخاب بذر، کیفیت آن که تأثیر زیادی در عملکرد محصول دارد، باید مورد توجه قرار گیرد. در جدول ۲-۶ پاره‌ای از ارقام ذرت که در ایران مورد کشت قرار می‌گیرند، نشان داده شده است. برای پیشگیری از شیوع بعضی بیماری‌های قارچی مثل انواعی از سیاهک‌ها، لازم است که بذور توسط قارچ‌کش‌های مناسبی چون ویتاواکس به نسبت ۳-۲ در هزار، ضدغونی شود.

مقدار بذر در هکتار: وزن بذر، تعداد بوته در هکتار و ارزش مصرفی بذور از عوامل تعیین‌کننده مقدار بذر در هکتار هستند. برای تعیین میزان بذر در هکتار در صد قوه نامیه و نیز در صد خلوص بذر که تعیین‌کننده ارزش مصرفی بذر هستند و نیز وزن هزار دانه رقم، روی کیسه‌های بذر گواهی شده درج شده است. لذا در مورد ذرت که شما الزاماً باید از بذور f گواهی شده مصرف کنید جهت تعیین مقدار بذر مورد نیاز به حد تراکم مطلوب احتیاج دارید. جدول ۷-۲ این حد را که حاصل آزمایش‌های متعدد می‌باشد به شما نشان می‌دهد. برای علوفه‌ای حدود ۲۵-۲۰ در صد به عدد تراکم اضافه کنید.

فعالیت

با توجه به نوع بذر توصیه شده توسط هنرآموز خودتان، الگوی کاشت، تراکم مطلوب و مقدار مصرف بذر را تعیین کنید. برای نتیجه‌گیری خود دلایلی ارائه نمایید.

معمولًاً در روش دست پاش به دلیل دقت عمل کم‌تر در پاشیدن بذر، مقدار بذر مصرفی در هکتار بیش‌تر است. در مورد زمین‌های حاصل‌خیز، بدیهی است که هر چه خاک حاصل‌خیز‌تر و غنی‌تر باشد، می‌توان تعداد بوته را در هکتار بیش‌تر گرفت. این موضوع در مورد میزان آب موجود نیز صادق است. هر چه مقدار آب آبیاری بیش‌تر باشد می‌توان تعداد بوته‌های بیش‌تری در واحد سطح کاشت. در مناطق دیمی که ذرت کشت می‌شود، باید با توجه به میزان بارندگی و پراکندگی آن تراکم بوته را در هکتار تنظیم کرد.

چرا تراکم مطلوب در ارقام دیررس کم‌تر از ارقام زودرس است؟

جدول ۶-۲- تعدادی از ارقام ذرت مورد کاشت در ایران و خصوصیات آن‌ها

رقم	زمان لازم از کاشت تا کاشت تا برداشت (روز)	محصول دهنی (تن در هکتار)	قدرت کاشت	زمان از کاشت تا کاشت تا برداشت (زودرس)	برداشت (زودرس)	هیبرید دبل کراس	دنبان اسبی	نواحی مناسب کشت	مقاومت در عوامل ناساعد	مقاومت در عوامل امراض و کاشت	میزان بذر (کیلوگرم در هکتار)	منظر از کاشت	وزن هزار دانه (گرم)	طول بلال (سانتی متر)	تعداد ردیفهای دانه	ارتفاع آخرين بلال قاعده از سطح خاک (سانتي متر)	ارتفاع بوته (سانتي متر)	قدرت محصول دهنی (تن در هکتار)
دندان اسبی	تمام نقاط ایران بخصوص پس از برداشت گدم و جو در مناطق شمالی و مرکزی کشت تابستانی در خوزستان	مقاوم به خشکی بوسیدگی خوش بوسیدگی ساقه و ساقه، کرم ذرت	۱۷-۲۰	دانه و علوفه	۳۵۰	۱۶-۱۸	۱۴-۱۶	۹۰	۲۳۰	۲-۵	۱۱۰	هیبرید دبل کراس	(زودرس)	۳۷	دبل هیبرید دبل کراس			
دندان اسبی	تمام مناطق ایران	مقاوم به خشکی بوسیدگی خوش بوسیدگی خوش و ساقه، کرم ذرت	۱۷-۲۰	دانه طبور و علوفه	۳۵۰	۲۰	۱۴-۱۶	۱۰۰	۲۴۰	۲-۵	۱۱۵	دبل کراس	۴۴۸	دبل کراس				
نیمه دندان اسبی	تمام مناطق ایران به جز مناطق سرد و کوهستانی	خشکی، امراض خارجی، کرم ذرت	۲۵	فقط علوفه کورن فلکس ماکارونی نشاسته	-	۲۵	۱۴-۱۶	۱۱۰-۱۱۸	۲۷۰-۳۰۰			دبل کراس	۷۹۰	دبل کراس				
دندان اسبی	تمام نقاط ایران بخصوص مازدرا	مقاومت زیاد به خشکی، بیماری‌های قارچی کرم ذرت	۱۸-۲۰	دانه و علوفه	۳۶۵	۲۵	۱۶-۱۸	۱۱۰	۲۷۰	۵-۶	۱۳۵-۱۴۰	(دبررس)	۷۵۵	دبل کراس				
پیش تر دندان اسبی	به جز مناطق سرد سیر و شمالی	مقاومت به خشکی یا جیز مقاوم به قارچ	۲۵-۲۸	فقط علوفه	۴۰۰-۴۵۰	۲۰-۳۵	۱۶-۲۴	۱۴۰-۱۵۰	۳۰۰-۳۵۰	۶۰-۸۰	۱۷۰-۱۸۰	(دبررس)	K06	کمبوزیت				
پیش تر دندان اسبی	به جز مناطق سرد سیر کوهستانی	مقاوم به قارچ و کرم ذرت	۲۲	فقط علوفه	۳۵۰	۲۰-۳۰	۱۴-۱۸	۱۱۵	۲۷۵	۶۰-۸۰	۱۳۵-۱۴۰	علوفه	K04	کمبوزیت				
دندان اسبی	تمام ایران به جز نواحی سیار مرطوب	خشکی، قارچ کرم ذرت	۱۷-۲۰	خوارک طبور	۳۷۰	۲۰	۱۶-۱۸	۱۱۰	۲۷۰-۲۸۰	۶-۹	۱۲۰			سینگل				
دندان اسبی	تمام ایران به جز مناطق سرد و کوهستانی	مقاومت نسبی به خشکی و قارچ	۱۸-۲۰	دانه و علوفه	۳۷۰	۲۰-۲۳	۱۴-۱۶	۱۱۰	۲۸۵	۶-۹	۱۳۵-۱۴۰	علوفه	۷۰۴	سینگل				
دندان اسبی	جز مناطق سرد و کوهستانی و نواحی مرطوب	مقاوم به قارچ (به جز فوزاریوم)	۱۷-۲۰	استخراج نشاسته، ذرت سیلولی	۴۰۰	۲۵	۱۴-۱۸	۱۱۰	۲۷۵	۵-۸	۱۳۵-۱۴۵	علوفه	Cl	سینگل				
نیمه سخت	جز نواحی سرد و کوهستانی	مقاوم به خشکی قارچ سیاهک و امراض خوش	۱۵	دانه طبور آردسازی علوفه سیلولی	۳۳۵	۲۸-۳۵	۱۲-۱۴	۱۱۴	۲۹۵	۵-۷	۱۳۵-۱۴۰		C71	سینگل				
دندان اسبی	به جز نواحی سرد و کوهستانی	خشکی، قارچ کرم ذرت	۱۷-۲۰		۴۳۰	۲۰-۲۳	۱۴-۱۶	۱۲۵	۲۷۰	۶-۸	۱۳۵-۱۴۰		۴	سینگل				

جدول ۷-۲- رابطه عملکرد ذرت دانه‌ای با تراکم‌های مختلف

ارقام	تراکم (بوته در هکتار)	۳۰/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۷۰/۰۰۰
زودرس		۴۸۶°	۵۷۲°	۶۴۵°	۶۹۰	۷۱۸°
متوسطرس		۵۳۹°	۶۴۱°	۷۲۳°	۷۵۲°	۷۵۴°
دیررس		۶۳۲۱	۷۲۴°	۷۶۸°	۷۹۰	۷۲۲°

حل کنید

اگر قوه‌ی نامیه‌ی رقمی از ذرت ۹۶ درصد و خلوص آن ۹۸ درصد و وزن هزار دانه‌ی آن ۲۵ گرم باشد باید فاصله‌ی بذور روی ردیف‌های ۷۵ سانتی‌متری، چند سانتی‌متر باشد تا تراکم ۸ هزار بوته در هکتار حاصل شود؟ برای تمرین بیش‌تر اعداد و خواسته مسئله را تغییر دهید تا در حل این گونه مسائل توانمند شوید.

موقع کاشت

مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده‌ی زمان کشت ذرت، دمای هوای منطقه و دمای خاک می‌باشد. دمای خاک در زمان کاشت (عمق ده سانتی‌متری خاک) باید حدود $12-14^{\circ}\text{C}$ باشد. علاوه بر دما، رطوبت خاک، فصل بارندگی، زمان شیوع آفات، شرایط اقلیمی زمان برداشت و چگونگی امکانات مکانیزاسیون منطقه در تاریخ کاشت مؤثر هستند.

در مناطقی مثل مناطق مرکزی ایران که فصل رویش طولانی دارند، می‌توان در طیف زمانی طولانی‌تری به کشت اقدام کرد حتی ۲ مرتبه در یک سال کشت کرد. اما در مناطق سردسیر و کوهستانی که دارای فصل رویش کوتاه بوده، از طرفی باران‌های زودرس پاییز، یک عامل محدود‌کننده در تاریخ کشت می‌باشد. به محض آن‌که هوا به اندازه‌ی کافی گرم شد با مناسب شدن رطوبت خاک باید اقدام به بذر کاری کرد و بدین وسیله تأثیرات سوء باران‌های پاییزه را در عملیات برداشت به حداقل رسانید. در مناطق معتدل کاشت، عمدتاً در اوائل تا اواسط بهار صورت می‌گیرد.

در مناطق گرمسیر مانند خوزستان از حدود اواسط بهمن ماه به محض مساعد شدن هوا، کاشت انجام می‌پذیرد. چنان‌چه تأخیر در کشت صورت گیرد، به دلیل این‌که گیاه در مرحله‌ی رشد

زايشی با دمای بالا (دماهای ۲۸ – ۳۵ و بیشتر) مواجه می‌شود، تلقیح گل‌ها دچار اختلال می‌گردد. به دلیل وجود همین شرایط خاص، در خوزستان کشت ذرت پاییزه بیشتر می‌باشد. برای بیان بردن به اهمیت تاریخ کاشت به نتایج یک تحقیق که در جدول ۲-۸ آمده توجه کنید و در کلاس بر روی آن بحث کنید.

جدول ۲-۸ - تأثیر تاریخ کاشت بر روی عملکرد ارقام ذرت تابستانه در خوزستان (سیادت و شایگان ۱۳۷۳)

تاریخ کاشت	رقم	عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)	هیبرید ۴۶A	هیبرید ۳۷۰	هیبرید ۷۰۴
۵/۴	۱۷۶۹/۹	۲۴۴۵/۵	۱۱۸۹/۳	۴۶۸/۰	۹۱۶۵۷/۱
۵/۱۴	۶۵۴۱/۹	۸۶۵۱/۰	۱۱۶۵۷/۱	۴۶۸/۰	۹۸۰۳/۰
۵/۲۴	۶۳۶۳/۱	۶۶۶۱/۲	۹۸۰۳/۰	۴۶۸/۰	۹۱۸۹/۳

عمق کاشت: عمق کاشت در ذرت بر حسب عوامل مختلف ۱۰-۲/۵ سانتی‌متر و به طور متوسط ۷ سانتی‌متر می‌باشد.

فعالیت

عملیات کاشت ذرت را پس از تنظیم کارنده، انجام دهید. در انجام عملیات ضمن رعایت اصول فنی و ایمنی، عوامل مؤثر را در نظر بگیرید.

عملیات داشت ذرت

آبیاری: نیاز ذرت به آب در مراحل مختلف فرق می‌کند. از این لحاظ می‌توان دوره‌ی زندگی گیاه ذرت را به چند مرحله‌ی زیر تقسیم کرد :

۱- مرحله‌ی کاشت تا جوانه زدن : در این مرحله، گیاه به رطوبت کافی جهت جوانه زدن احتیاج دارد. ذرت با جذب مختصر رطوبتی (۴۴-۲۷ درصد وزن بذر) با فراهم بودن سایر شرایط

شروع به جوانهزنی می‌کند اما جهت اطمینان از رسیدن همین مختصر رطوبت به تمام بذر و نیز ذخیره رطوبت برای مراحل بعد، آبیاری اول را طولانی کرده به نحوی که عمق خیسیدگی خاک را حدود ۱ متر درنظر می‌گیرند.

۲- مرحله‌ی جوانه زدن تا ساقه رفتن که میزان نیاز ذرت به رطوبت کم است و آبیاری اول یا خاک آب برای این مرحله کافی می‌باشد.

۳- مرحله‌ی ساقه رفتن تا ظهور گل آذین نر : که در برابر کمبود آب، نسبتاً مقاوم است ولی به هر حال نیاز آبی آن بیشتر از مرحله‌ی قبل می‌باشد. ذرت را معمولاً پس از جوانهزنی و استقرار اولیه جهت توسعه‌ی ریشه حدود ۳ هفته تنش می‌دهند.

فعالیت

عملیات داشت را انجام دهید. در ضمن عملیات، تمام عوامل زیان‌آور را شناسایی و جمع‌آوری کنید. زمان و مقدار مصرف هریک از نهاده‌ها را که توسط هنرآموز شما تعیین می‌شود، به دقت یادداشت کنید.

۴- مرحله‌ی ظهور گل آذین نر تا ظهور گل آذین ماده : در این دوره که مرحله‌ی بحرانی زندگی گیاه ذرت به آب را تشکیل می‌دهد مصرف آب و مواد غذایی در بوته ذرت به حداقل می‌رسد و در صورت کمبود رطوبت کافی، عمل تلقیح گل‌ها مختلط می‌شود. در نتیجه عملکرد محصول به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. جبران آبیاری در مراحل بعدی تأثیری بر خسارت قبلی نخواهد داشت. برای مثال دو روز تأخیر آبیاری در مرحله‌ی بحرانی ۲۲٪ و ۵ روز تأخیر بیش از ۵۰ درصد کاهش عملکرد به همراه خواهد داشت. زیرا هم تشکیل گل و هم لقادح گل‌ها در این مرحله اتفاق می‌افتد.

۵- مرحله‌ی ظهور گل ماده تا خمیری شدن دانه‌ها : در این مرحله نیز میزان مصرف آب زیاد است، اما نسبت به مرحله‌ی قبلی کمتر می‌باشد. بروز تنش در این مرحله باعث کوچکی اندازه‌ی دانه می‌گردد.

۶- مرحله‌ی خمیری دانه تا رسیدن کامل : میزان مصرف آب باز به تدریج درحال کاهش است. اما بروز تنش شدید باعث چروکیدگی دانه و کاهش وزن هزار دانه می‌گردد. وقتی که میزان رطوبت دانه‌ها به ۳۵ درصد کاهش یابد، آبیاری متوقف می‌شود تا بتوان به موقع اقدام به برداشت نمود.

به طور خلاصه می‌توان نتیجه گرفت که ذرت به استثنای مرحله‌ی بحرانی زندگی‌اش، تا حدودی خشکی را تحمل می‌کند، در مناطقی که میزان بارندگی سالیانه $600 - 700$ میلی‌متر با پراکنش مناسب باشد، به نحوی که در مرحله‌ی بحرانی حداقل $\frac{1}{3}$ رطوبت فوق تأمین گردد، می‌توان ذرت را به صورت دیم کشت کرد، ولی در مناطق خشک باید حتماً اقدام به آبیاری شود. دور آبیاری در مناطق مختلف، بسته به گرمای هوا، نوع واریته‌ی ذرت، نوع خاک و تراکم بوته در واحد سطح و مرحله‌ی رشد گیاه فرق می‌کند و معمولاً بین $15 - 5$ روز است.

کنترل علف‌های هرز: ذرت نیز مانند هر گیاه وجینی دیگر با مشکل علف‌های هرز روبروست. علف‌های هرز در جذب آب و مواد غذایی، نور و گاز کربنیک با گیاه اصلی رقابت می‌کنند و در بسیاری موارد بیش از خود ذرت رطوبت و مواد غذایی خاک را جذب نموده، عملکرد ذرت را کاهش می‌دهند. مبارزه با علف‌های هرز تا زمانی لازم است که بوته‌های ذرت به ساقه نرفته باشد زیرا پس از این مرحله، بوته‌ها رشد سریع داشته، مانع رشد علف‌های هرز می‌شوند.

برای کنترل علف‌های هرز می‌توان از روش‌های مختلف فیزیکی، زراعی و شیمیایی استفاده کرد. برای کنترل علف‌های هرز یک رشتہ اقدامات پیشگیرانه مثل شخم اراضی در پاییز و دیسک بهاره، جلوگیری از مصرف کود حیوانی تازه، رعایت صحیح برنامه‌ی تناوب زراعی انجام می‌شود. کاربرد ماشین‌های داشت از جمله کولتیواتور بهویژه از نوع ستاره‌ای یا غلطان که مجهز به ییلچه‌های خاک‌دهنده پای بوته و کودکار شده باشند به تعداد ۲ تا ۳ مرتبه می‌توانند ضمن سله‌شکنی و کود و خاک‌دهی پای بوته می‌توان علف‌های هرز را به طور مؤثر کنترل کرد.



شکل ۱۵-۲- استفاده از کولتیواتور در دفع علف‌های هرز بین ردیف‌های کاشت

در روش کنترل شیمیایی با علف‌های هرز، علف‌کش‌های انتخابی متعددی ساخته شده‌اند که در مراحل مختلف قبل از کاشت، قبل از جوانه‌زنی و پس از رویش کاربرد دارند. برحسب آزمایش‌های مختلف، روش‌های تلفیقی در کنترل علف‌های هرز بسیار مؤثر و در عین حال کم‌هزینه می‌باشد. یعنی رعایت اصول به زراعی همراه با انجام دقیق عملیات داشت و در صورت نیاز کاربرد علف‌کش‌های انتخابی. در مورد استفاده از علف‌کش‌ها باید نوع، زمان مصرف و مقدار و چگونگی آن را کارشناسان حفظ نباتات تعیین نمایند.

واکاری و تنک: اگر به دلایلی تراکم بوته در مزرعه بالا باشد، برای جلوگیری از خسارات بعدی باید در همان مراحل اولیه رشد بوته‌های اضافی را از زمین ریشه‌کن کرد تا رقابت ایجاد نشود. در همان مراحل اولیه سبز شدن مزرعه، ضمن سرکشی باید دقت کرد چنان‌چه قسمت‌هایی از مزرعه به علی‌مانند خرابی دستگاه بذر کار و یا بدی تهیه‌ی زمین، بذر کشت یا سبز نشده است، بلافاصله اقدام به واکاری قسمت‌های سبز نشده کرد. بهتر است که عمل تنک کردن و واکاری را با هم انجام داد تا از هزینه‌های اضافی کارگر صرفه‌جویی گردد. امروزه با استفاده از بذور مرغوب، کارنده‌های دقیق و هدایت درست ماشین‌ها این عملیات حذف شده‌اند.

کود سرک: عملیات دادن کود سرک بر حسب شرایط خاک و آب و هوای منطقه، یک تا دو نوبت و به روش‌های مختلف (با توجه به روش کاشت) صورت می‌گیرد. در کشت ردیفی با استفاده از دستگاه کودکار می‌توان کود مورد نیاز را در کنار ردیف‌های کشت در زیر خاک دفن کرد (شکل ۲-۱۶) و یا می‌توان با استفاده از روش محلول کردن کود و از طریق آب آبیاری، کود محلول را وارد مزرعه کرد. این روش اخیر در هر دو سیستم کشت، عملی است. گرچه باید دانست راندمان مصرف کود در این روش بسیار کم و آلودگی محیط‌زیست ناشی از آن بالا می‌باشد.



شکل ۲-۱۶—کودکار در حین انجام کار

کنترل آفات و بیماری‌های ذرت

آفات مختلفی به ذرت، بسته به محل کشت و تاریخ کشت آن، در طول فصل رشد خسارت می‌زند. از آن جمله می‌توان کرم ساقه‌خوار ذرت، هلیوتیس، کرم ذرت، اگروتیس و شب پرهی تک نقطه‌ای را نام برد، که در رابطه با بیولوژی این آفات و فرم خسارت و روش‌های مبارزه با آن‌ها به طور کامل در کتب حفظ نباتات و دفع آفات آشنا می‌شوید. شکل ۲-۱۷ نوعی سمپاشی را در مزارع ذرت نشان می‌دهد.

از بیماری‌های ذرت می‌توان سیاهک ذرت، سیاهک خوشی ذرت، پوسیدگی‌های ریشه، شاخه و خوشی را نام برد.



شکل ۲-۱۷-عملیات سمپاشی در مزارع ذرت

برداشت ذرت دانه‌ای

برداشت، شامل مراحل الف: چیدن میوه (بالال) از ساقه، ب: کندن غلاف، ج: جدا کردن دانه از میوه می‌باشد.

ماشین‌های برداشت که در ذرت کاری به کار گرفته می‌شوند، مختلف بوده، بسته به نوع آن‌ها ممکن است یک، دو یا همه‌ی مراحل برداشت را با هم انجام دهند. امروزه بیشتر برداشت ذرت در کشور ما به وسیله‌ی کمباین انجام می‌شود که همان کمباین گندم است؛ با این تفاوت که از هد^۱ مخصوص برداشت ذرت استفاده می‌شود و کمباین هرسه مرحله‌ی برداشت را توأم انجام می‌دهد. برداشت به موقع ذرت دانه‌ای، امر بسیار مهمی است. چنان‌چه زودتر از

موقع اقدام به برداشت شود، در اثر وجود رطوبت اضافی در دانه‌ها، محصول دچار کپک‌زدگی و نابودی می‌شود. چنان‌چه برداشت به تأخیر بیفتند، ممکن است در اثر خواهد بونه‌های ذرت، عمل برداشت ماشینی آن با دشواری رو به رو شود. در این صورت امکان ریزش و تلفات بذر نیز وجود دارد. رطوبت مناسب برای ذخیره و انبار کردن بذر ۱۶–۱۴ درصد می‌باشد. چنان‌چه به دلایلی در موقع برداشت، رطوبت بذر بیشتر از مقدار فوق باشد که عموماً چنین است، قبل از انبار کردن، رطوبت اضافی آن را با روش‌های مصنوعی و با استفاده از خشک کننده‌های حرارتی با حرارت کنترل شده، می‌گیرند. علاوه‌ی ظاهری رسیدن محصول با خشک و زرد شدن برگ‌های پایینی شروع می‌شود. غلاف آن زرد و شکننده و ابریشم‌های کاکل ذرت، کاملاً قهوه‌ای می‌شوند. شکل ۲-۱۸ عملیات برداشت ذرت دانه‌ای به وسیله‌ی کمباین را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۸—برداشت ذرت دانه‌ای به وسیله‌ی کمباین

برداشت ذرت علوفه‌ای

بهترین موقع برداشت ذرت علوفه‌ای، وقتی است که ماده‌ی خشک آن حدود ۳۵–۳۲ درصد باشد. برداشت قبل از موقع به علت وجود آب اضافی در بافت گیاه و هم‌چنین مواد قندی، سبب آبکشدن سیلو و نیز ترش شدن آن می‌شود. از طرف دیگر تأخیر در برداشت، باعث چوبی شدن و کاهش

کیفیت آن می‌گردد و در سیلو نیز به اندازه‌ی کافی فشرده نخواهد شد و باعث کپک‌زدگی سیلو می‌شود. نتیجه این که ذرت سیلوبی زمانی برداشت می‌شود که ضمن داشتن بیشترین ارزش غذایی، قابلیت سیلوشدن را به حد کمال داشته باشد. طبق آزمایش‌های انجام شده، بهترین زمان برداشت ذرت سیلوبی وقتی است که دانه‌ها حالت خمیری دارند. در این شرایط ضمن این که حداکثر ذخیره‌ی مواد غذایی را دارند، از آب لازم برای تخمیرات داخل سیلو نیز بهره‌مندند. برداشت ذرت سیلوبی با ماشین چاپر^۱ صورت می‌گیرد (شکل ۲-۱۹). چاپر یک نوع دنباله‌بند و خودگردان و یک تاشش ردیفه است.

فعالیت

- ۱- قسمتی از مزرعه‌ی خود را با داس برداشت کنید و عملیات برداشت ذرت را با یونجه مقایسه نمایید.
- ۲- در برداشت مکانیزه مزرعه‌ی خود مشارکت کنید.



شکل ۲-۱۹ - عملیات برداشت ذرت علوفه‌ای با چاپر

۱- Chapper

این دستگاه، ضمن درو کردن بوته از نزدیکی سطح خاک، تمام قسمت‌های برداشت شده (ساقه، برگ و خوشها) را به قطعات ۳-۴ سانتی‌متری خرد می‌کند و برای حمل به محل سیلو، به داخل تریلی یا کامیون مجاور می‌ریزد.

عملکرد: عملکرد ذرت علوفه‌ای به طور تازه، بحسب شرایط از ۴۰ تا ۱۱۰ تن در هکتار متفاوت است.

فعالیت

عملکرد بنه خود را با عملکرد واحد آموزشی، منطقه، استان، کشور و متوسط جهانی مقایسه کرده نتیجه‌گیری کنید.

با توجه به جدول ۲-۹ (فقط برای بحث و بررسی است) و با جمع‌آوری اطلاعات در مورد سطح زیر کاشت تولید و عملکرد ذرت علوفه‌ای، توضیح دهید که تغییرات این دو نوع محصول از جنبه سطح زیر کاشت، تولید و عملکرد در سال‌های مختلف چگونه بوده است؟

جدول ۲-۹- سطح زیرکاشت، تولید و عملکرد ذرت دانه‌ای در کشور

عملکرد (کیلوگرم در هکتار)		تولید (تن)			سطح زیر کاشت (هکتار)			ردیف زیرکاشت
دیم	آبی	جمع	دیم	آبی	جمع	دیم	آبی	
۰	۶۱۶۱/۳۲	۱۰۶۴۱۸۶/۴	۰	۱۰۶۴۱۸۶/۴	۱۷۷۲۷۲۰/۵۴	۰	۱۷۷۲۷۲۰/۵۴	۷۹_۸۰
۱۴۷۸/۲۶	۶۷۳۵/۷۷	۱۴۲۸۵۲۲/۶۴	۶۰۷/۵۶	۱۴۳۷۹۲۵/۰۸	۲۱۳۸۸۷	۴۱۱	۲۱۳۴۷۶	۸۰_۸۱
۱۸۸۸/_۰۴	۶۷۲۵/۷۴	۱۶۵۳۰۰۰/۷۵	۱۴۳/۴۹	۱۶۵۲۸۵۷/۲۶	۲۴۵۸۲۷	۷۶	۲۴۵۷۵۱	۸۱_۸۲
۳۳۸۵/۹	۷۰۲۴/۸۵	۱۶۲۶۰۷۸/۲۸	۱۹۵/_۲۸	۱۹۲۴۱۲۸	۲۷۴۴۷۹	۵۷۶	۲۷۳۹۰۳	۸۲_۸۳
۲۷۸۸/_۰۵	۷۲۲۷/۳۳	۱۹۹۵۲۵۲/۷۲	۹۳۷/۳۴	۱۹۹۴۳۱۵/۳۸	۲۷۶۲۷۷/۱	۳۲۶/۲	۲۷۵۹۴۰/۹	۸۳_۸۴

خودآزمایی

- ۱- موارد مصرف ذرت را به طور کلی توضیح دهید.
- ۲- نقش و تأثیر دما را در مراحل مختلف رویشی گیاه ذرت توضیح دهید.
- ۳- تقسیم‌بندی انواع ذرت را بر حسب نوع دانه شرح دهید.
- ۴- علایم رسیدن در ذرت دانه‌ای و روش‌های برداشت آن را توضیح دهید.
- ۵- روش‌های توزیع کود سرک در ذرت را توضیح دهید.
- ۶- نیاز ذرت به رطوبت نسبی هوا و آب را شرح دهید.
- ۷- زمان برداشت ذرت علوفه‌ای و روش برداشت آن را توضیح دهید.
- ۸- روش‌های مختلف کاشت را در ذرت توضیح دهید.
- ۹- فوائل کاشت در ذرت علوفه‌ای بیشتر است یا دانه‌ای؟ چرا؟

تحقیق کنید

کمبود کدام عنصر غذایی در منطقه‌ی شما بیشتر رایج است و علام آن چگونه است؟

فعالیت

علام کمبود را در روی گیاهان زراعی مختلف جمع‌آوری کنید و پس از تأیید هنرآموزان، در کلکسیونی به همین عنوان نگهداری و مطالعه کنید.

مطالعه کنید

چرا تعداد دانه‌های واقع در پیرامون یک بلال همیشه زوج است؟
اعلام نظر کنید: برای «افزایش عملکرد»، «کاهش مقدار مصرف نهاده‌ها» و «کاهش هزینه‌ی تولید» چه کارهایی باید انجام شود؟