

# بخش اول

## فصل پنجم

### عملیات روی تابع‌ها

#### هدف کلی

تعیین ضابطه‌ی  $f \pm g$ ،  $f \cdot g$  و  $\frac{f}{g}$  با داشتن ضابطه‌ی تابع‌های  $f$  و  $g$  و کاربرد آن‌ها

هدف‌های رفتاری: انتظار می‌رود فرآگیر پس از پایان این فصل بتواند:

۱- چهار عمل اصلی روی دو تابع را تعریف کند.

۲- با داشتن ضابطه‌ی تابع‌های  $f$  و  $g$ ، ضابطه‌ی تابع‌های  $f \pm g$ ،  $f \cdot g$  و  $\frac{f}{g}$  را بنویسد.

۳- دامنه‌ی تابع‌های  $f \pm g$ ،  $f \cdot g$  و  $\frac{f}{g}$  را تعیین کند.

۴- از اعمال بر تابع‌ها در موارد کاربردی استفاده کند.

## پیش‌آزمون (۵)

### محل پاسخ به سؤالات پیش‌آزمون

۱- اگر  $x = 2$  و دامنهٔ  $f$  مجموعهٔ  $\{2, 3, 4, 5, 6\}$

باشد، حاصل عبارت‌های زیر را حساب کنید :

(الف)  $f(2) \times f(3)$

(ب)  $f(2) + f(3)$

(پ) آیا تساوی  $f(2) \times f(3) = f(2+3)$  درست است؟

۲- اگر  $2 - 2x$  و  $f(x) = x^2 + x - 2$  ، حاصل

عبارت‌های زیر را حساب کنید :

(الف)  $f(2) + g(2)$

(ب)  $f(2) - g(2)$

(پ)  $f(2) \times g(2)$

(ت)  $\frac{f(2)}{g(2)}$

۳- دو تابع  $f$  و  $g$  با ضابطه‌های  $x = 5 - 3x$  و  $f(x) = 5 - 3x$

داده شده‌اند. مطلوب است محاسبه عبارت‌های  $g(x) = 2x + 6$

زیر :

(الف)  $f(4) + g(4)$

(ب)  $f(x) + g(x)$

(پ)  $f(2) - g(2)$

(ت)  $f(x) - g(x)$

(ث)  $f(\frac{1}{x}) \times g(\frac{1}{x})$

(ج)  $f(x) \times g(x)$

(چ)  $\frac{f(2)}{g(3)}$

۴- اگر  $g(x) = x^2 + x - 1$  و  $f(x) = 2x^2 - x + 3$

ضابطه و دامنهٔ تابع‌های زیر را تعیین کنید.

(الف)  $f + g$


(ب)  $f - g$

(پ)  $f \times g$

(ت)  $\frac{f}{g}$

## ۵-۱- عملیات روی تابع‌ها

اگر  $f$  و  $g$  دو تابع حقیقی باشند به ازای هر  $x$  از دامنه مشترک آنها  $f(x)$  و  $g(x)$  دو عدد حقیقی هستند. بنابراین، می‌توان روی آنها چهار عمل اصلی را انجام داد.




شکل ۱-۸۷

۱) یک استخر دارای دو شیر آب است (شکل ۱-۸۷).

شیر اول در هر ثانیه ۲ لیتر و شیر دوم در هر ثانیه ۳ لیتر آب وارد استخر می‌کند. اگر این دو شیر با هم آب وارد استخر کنند در هر ثانیه چند لیتر آب وارد استخر می‌شود؟

اگر  $f(t)$  مقدار آب وارد شده در  $t$  ثانیه، از شیر اول (برحسب لیتر) و  $g(t)$  مقدار آب وارد شده در  $t$  ثانیه، از شیر دوم باشد، پس از  $t$  ثانیه  $f(t) + g(t)$  لیتر آب وارد استخر می‌شود. بنابر آنچه گفته شد: لیتر  $f(t) = 2t$ ، لیتر  $g(t) = 3t$  پس، توسط دو شیر، در  $t$  ثانیه، لیتر  $f(t) + g(t) = 2t + 3t = 5t$  آب وارد استخر می‌شود.



شکل ۱-۸۸

۲) شخصی، مطابق شکل ۱-۸۸، روی واگن کفی یک

قطار می‌دود و در هر ثانیه به طور متوسط  $5/5$  متر طی می‌کند. اگر قطار در هر ساعت به طور متوسط  $90$  کیلومتر (در هر ثانیه  $25$  متر) طی کند، این شخص در هر ثانیه چند متر از مبدأ حرکت قطار دور می‌شود؟

مطابق شکل ۱-۸۸، واضح است که  $g(x) = 5/5x$  و  $f(x) = 25x$ . بنابراین، این شخص در هر ثانیه به اندازه‌ی  $30/5$  متر از مبدأ حرکت قطار دور می‌شود.

اگر  $h(x)$  فاصله‌ی این شخص تا مبدأ پس از  $x$  ثانیه باشد،

داریم:

$$h(x) = f(x) + g(x) = 25x + 5/5x = 30/5x$$

**مثال‌های حل شده در مورد مجموع،  
تفاضل و ضرب دو تابع.**

اگر  $g(x) = 2x + 1$  و  $f(x) = x^3 - 2x$   
آنگاه، اگر  $h = f + g$  داریم :  

$$h(x) = f(x) + g(x) = (x^3 - 2x) + (2x + 1)$$
  


$$= x^3 + 1$$

تابع  $h$  را مجموع دو تابع  $f$  و  $g$  می‌گویند و می‌نویسند :

$$h = f + g$$

$$\therefore h(x) = f(x) + g(x)$$

تابع  $f + g$  به ازای هر  $x$  از دامنه مشترک  $f$  و  $g$ ، یعنی  $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$  تعريف می‌شود.



شکل ۸۹

اگر این شخص خلاف جهت حرکت قطار بود، در هر ثانیه چقدر از مبدأ دور می‌شود؟ (شکل ۱-۸۹)

$$\text{متر} \quad f(1) - g(1) = 25 - 5 / 5 = 19 / 5$$

اگر  $d(x)$  فاصله این شخص تا مبدأ پس از  $x$  ثانیه باشد داریم :

اگر  $f(x) = 2x^3 + 5x - 3$  و  $g(x) = 2x^3 - x + 2$  ضابطهٔ تابع  $h = f - g$  را بنویسید.

حل: با توجه به تعريف داریم :  

$$h(x) = f(x) - g(x)$$
  

$$= (2x^3 + 5x - 3) - (2x^3 - x + 2) = 6x - 5$$

$$d(x) = f(x) - g(x)$$

تابع  $d$  را با  $g - f$  نشان می‌دهند.

تابع  $f - g$  به ازای هر  $x$  از دامنه مشترک  $f$  و  $g$ ، یعنی  $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$  تعريف می‌شود.

فرض کنید  $1$   $f(x) = x + 1$  اندازهٔ عرض یک مستطیل و  $g(x) = 2x + 3$  اندازهٔ طول این مستطیل باشد. اگر مساحت این مستطیل را با  $s(x)$  نمایش دهیم، ضابطهٔ  $s(x)$  را بنویسید.

حل: واضح است که  

$$s(x) = f(x) \times g(x) = (x + 1)(2x + 3)$$
  
 بنابراین،

$$s(x) = 2x^3 + 5x + 3$$

در حقیقت،  $s = f \times g$

به همین ترتیب می‌توان حاصل ضرب دو تابع  $f$  و  $g$  را نیز تعريف کرد.

تابع  $f \times g$  به ازای هر  $x$  از دامنه مشترک  $f$  و  $g$ ، یعنی  $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$  تعريف می‌شود.

مثال:

$$\text{اگر } f(x) = x^2 + 1 \text{ و }$$

$\frac{f}{g}$ ، ضابطه‌ی تابع  $g(x) = 3x - 2$  را بنویسید

$$\text{و } \left(\frac{f}{g}\right)(\frac{5}{3}) \text{ را تعیین کنید.}$$

حل: با توجه به تعریف  $\frac{f}{g}$  داریم:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^2 + 1}{3x - 2} \quad (x \neq \frac{2}{3})$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(\frac{5}{3}) = \frac{\left(\frac{5}{3}\right)^2 + 1}{3\left(\frac{5}{3}\right) - 2} = \frac{\frac{25}{9} + 1}{5 - 2} = \frac{34}{27}$$

تابع  $\frac{f}{g}$  را نیز، برای تمام  $x$ ‌هایی که  $g(x) \neq 0$ ، می‌توان تعریف کرد.

در حقیقت،

$$D_{\frac{f}{g}} = (D_f \cap D_g) - \{x : g(x) = 0\}$$

تابع  $\frac{f}{g}$  به ازای هر  $x$  از دامنه‌ی مشترک  $f$  و  $g$

که  $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ ، با ضابطه‌ی  $g(x) \neq 0$  تعیین شود.

به مثال رویه‌رو توجه کنید.

## تمرین ۱-۹

۱- فرض کنید  $g(x) = x + 1$  و  $f(x) = x^2 - 1$ .

(الف) ضابطه و دامنه‌ی تابع‌های  $g$  و  $f \times g$ ،  $f - g$ ،  $f + g$

را بنویسید.

(ب) مقدارهای  $(f+g)(2)$ ،  $(f-g)(1)$ ،  $(f \times g)(0)$  و

$\left(\frac{f}{g}\right)(4)$  را حساب کنید.

۲- فرض کنید  $N_{t+1}^{t+1}$  و  $M_{t+1}^{t-1}$  و نقطه‌ی  $P$  وسط


پاره‌خط  $MN$  باشد.

(الف) مطابق شکل ۱-۹، مختصات نقاط  $R$  و  $Q$  را

بنویسید.

(ب) اگر مساحت ذوزنقه  $MQRN$  را با  $s(t)$  شان دهیم،

ضابطه‌ی تابع  $s$  را بنویسید.



شکل ۱-۹

## آزمون پایانی (۵)

محل پاسخ به سؤالات آزمون پایانی

۱- مقدار آبی که در هر ثانیه، بر حسب لیتر، از فواره‌ی A وارد یک استخر می‌شود از دستور  $f(t) = 2t$  و مقدار آبی که در هر ثانیه از فواره‌ی B وارد این استخر می‌شود از دستور  $g(t) = 5t$  محاسبه می‌شود.

الف) مقدار آبی که در هر ثانیه از هر دو فواره‌ی A و B وارد استخر می‌شود از کدام دستور می‌توان محاسبه کرد؟

ب) در ۵ ثانیه چقدر آب وارد استخر می‌شود؟

پ) اگر حجم استخر ۳۵۰۰۰ لیتر باشد دو فواره‌ی A و B در چه مدت این استخر را پر می‌کنند؟

۲- مختصات نقطه‌های متغیر M و N چنین است :

$$M \left|_{t^{\gamma}+1}^{t-1} \right. \quad \text{و} \quad N \left|_{t+1}^{t^{\gamma}-1} \right.$$

طول پاره خط MN را بر حسب t به دست آورید.