

فصل پنجم

نتایج رشد میکروارگانیسمها در مواد غذایی

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل، فرآگیر باید بتواند:

- ۱- عوامل بیماریزا در یک میکروب را مشخص کند.
- ۲- عوامل مختلف باکتریهای بیماریزا برای غلبه بر سد دفاعی بدن را نام برد.
- ۳- سم‌زایی را تعریف و انواع سموم در باکتریها را مشخص نماید.
- ۴- عوامل اصلی فساد میکروبی مواد غذایی را نام برد.
- ۵- میکروارگانیسمهای موجود در دستگاه گوارش میزان را شرح دهد.
- ۶- نقش میکروبها در تولید و تبدیل مواد غذایی شرح دهد.

۱-۵- بیماریزا ای باکتریها

تغییر شرایط واکنشهای زیستی موجود زنده را بیماری می‌گویند و بیماریهای عفونی بیماریهای هستند که به وسیله میکروارگانیسمها ایجاد می‌گردند.

اصولاً وقتهایی از یک گونه باکتری بحث می‌شود باید اصطلاح قدرت بیماریزا را بکار برد و وقتی قدرت بیماریزا گونه‌های مختلف یک باکتری یکسان نباشد، اصطلاح حدّت مطرح می‌شود. بنابراین حدّت یا درجه بیماریزا نه تنها در گونه‌های مختلف باکتریها بلکه در سویه‌های یک گونه نیز متفاوت است. اگر قدرت بیماریزا در سویه‌های مختلف یک گونه زیاد باشد آنها را سویه‌های حاد^۱ می‌نامند و اگر فاقد قدرت بیماریزا بود، یا قدرت بیماریزا کمی داشته باشند به ترتیب سویه‌های غیرحاد^۲ یا با حدّت کم نامیده می‌شود.

قدرت بیماریزا در یک میکروب خاص به دو عامل بستگی دارد:

۲-۵- قدرت تهاجمی

توانایی میکروب برای استقرار یافتن در بافت‌های بدن میزان را «قدرت تهاجمی» می‌نامند. برای

اینکه یک میکروارگانیسم بتواند به بافت‌های موجود زنده حمله کرده و در آن نفوذ نموده، ایجاد عفونت و احتمالاً بیماری کند، باید توانایی غلبه بر سدهای دفاعی متواالی را که در بدن میزبان وجود دارد داشته باشد. یکی از عوامل مهم بدن بیگانه‌خوارها یا ریزه‌خوارها هستند. سلولهای بیگانه‌خوار در همه نقاط بدن وجود دارند. این سلولها شامل گلبولهای سفید خون (الکوسیتها)، سلولهای کوچک سرگردان در درون بافت‌ها و بسیاری از سلولهای مستقر شده در جدار مویرگها و بهویژه در کبد می‌باشند. این سلولها مانند آمیب ذرات خارجی و از جمله عوامل عفونی را بلعیده، سپس به کمک آنزیمهای درون سلولی خود آنها را هضم می‌نمایند. اگر عمل بیگانه‌خواری بدروستی انجام گیرد، بسیاری از عفونتها قبل از گسترش، متوقف خواهد شد. اما غالباً باکتریهای بیماریزا به کمک عوامل مختلفی از این سد دفاعی می‌گذرند. برخی از این عوامل عبارتند از :

الف - کپسول: معمولاً کپسول به عنوان لایه‌ای محافظ، باکتری را از آسیب بیگانه‌خوارها در امان نگاه می‌دارد.

ب - آنزیمهای سبب افزایش قدرت تهاجمی باکتری می‌شوند و انواع مختلفی دارند مانند :

— **هیالورونیداز^۱:** این آنزیم اسید هیالورونیک^۲ را که مانند سیمانی سبب استحکام بافت همبند

می‌شود هیدرولیز نموده، آن را می‌شکند.

— **کلاژنаз^۳:** این آنزیم کلاژن را که ماده استحکام بخش عضلات، استخوانها و غضروفها

می‌باشد شکسته و تجزیه می‌نماید.

— **کوآگولاز^۴:** این آنزیم پلاسمرا منعقد می‌سازد.

۳-۵- سمزایی

سموم، اجزای طبیعی سلولی یا فرآورده‌های متابولیکی هستند که فعالیت سلولهای بدن حیوانات، گیاهان و انسان را متوقف ساخته، یا به آنها آسیب می‌رسانند. سموم یا زهرابه‌های^۵ باکتریها به دو دسته اندوتوكسین^۶ و اگزوتوكسین^۷ تقسیم می‌شوند.

اندو توکسین: این سموم در واقع بخشی از ساختمان دیواره سلولی باکتریها است که با مرگ و متلاشی شدن پیکر باکتری به محیط خارج آزاد می‌شوند.

اگزوتوكسین: اگزوتوكسین مواد سمی محلولی هستند که به وسیله باکتری زنده به محیط خارج

۱_Hyaluronidase

۲_Hyaluronicacid

۳_Collagenase

۴_Coagulase

۵_Toxin

۶_Endotoxins

۷_Exotoxins

ترشح می‌شوند. قدرت بیماریزایی اندوتوكسینها کمتر از اگزوتوكسینها می‌باشد تفاوت حرارتی این سموم نیز متفاوت است. سم کلستریدیوم بوتولینوم در برابر دما حساس است در حالی که سوم سم استافیلوکوکها مقاومت حرارتی بیشتری دارند.

اثرات میکروارگانیزمها در مواد غذایی

میکروارگانیزمها می‌توانند اثرات بسیار متفاوتی بر روی موادغذایی داشته باشند که برخی از آنها مطلوب و برخی نامطلوب و حتی زیانآور و یا بیماریزا می‌تواند باشد.

۴-۵- اثرات مفید میکروارگانیزمها

۱-۴-۵- انجام فرآیند تخمیر: یکی از مهمترین کاربردهای مطلوب میکروارگانیزمها در صنایع غذایی فرآیند تخمیر است. تخمیر فرآیند تجزیه‌ی بی‌هوایی کربوهیدراتهاست که در طی آن مقادیری اسید آلی و سایر متابولیتها تولید می‌گردد. تخمیر نه تنها یک روش نگهداری موادغذایی است بلکه بهوسیله‌ی آن انسانها به انواع جدیدی از غذاها دسترسی پیدا نموده‌اند. تخمیر ممکن است به وسیله‌ی گونه‌های مختلفی از میکروارگانیزمها انجام گیرد. در ادامه به‌طور خلاصه چند فرآورده تخمیری شرح داده می‌شود.

الف - خمیر نان: یکی از اساسی‌ترین مراحل تهیه نان اضافه کردن مخمر نانوایی^۱ به خمیر می‌باشد. مخمرها قند موجود در خمیر را تخمیر نموده و دی‌اکسیدکربن و الکل تولید می‌کنند و به این ترتیب سبب حجم شدن خمیر و ورآمدن آن می‌شوند. همچنین متابولیتهاست که در طی تخمیر توسط مخمر ایجاد می‌شود یکی از عوامل ایجاد عطر و طعم در نان هستند. ضمن این که مخمر مجموعه‌ای از آنزیمهای مختلف را در خمیر آزاد می‌کند که هر کدام نقش مفیدی در تهیه نان دارند.

نانهایی که به صورت صنعتی و سنتی و به‌طور مناسب تهیه می‌شوند، رطوبت مورد نیاز برای میکروارگانیزمها غیر از کپکها را فراهم نمی‌کنند. کپک نان^۲ و کپک قرمز نان^۳ بعضی وقتها از سطح نان جدا می‌شوند و این فساد در مکانهایی رخ می‌دهد که رطوبت آن جا بالا باشد یا زمانی که نان در حالت گرم بسته‌بندی شود. سویه‌های باسیلوس سوبتیلیس^۴ عامل فسادی به نام روپینس^۵ در نانهای خانگی می‌باشند.

۱ - *Saccharomyces cerevisiae*

۲ - *Rhizopus stolonifer*

۳ - *Neurospora Sitophila*

۴ - *Bacillus subtilis*

۵ - *Ropiness*

ب – سرکه: یکی از تغییرات طبیعی در آب میوه‌ها تخمیر الكلی آنها به وسیله مخمرها و سپس اسیداسیون الكل به اسید استیک توسط باکتریها می‌باشد. در این حالت اگر به اندازه کافی اسید استیک تولید شود محصول سرکه نامیده می‌شود. طبق استاندارد سرکه باید حداقل دارای ۴٪ اسید استیک باشد. سرکه محصولی از دو فرآیند است. در مرحله اول تخمیر الكل صورت گرفته و قند را به الكل تبدیل می‌کند. در مرحله دوم میکرووارگانیزمهای گروه استوپاکتر^۱، الكل تولید شده در مرحله اول را به اسید استیک تبدیل می‌کنند.

ج – سبزیهای تخمیر و شورشده: تخمیر و شور کردن سبزیها و تهیهٔ فرآورده‌هایی مانند خیارشور، زیتون شور و کلم شور از روش‌های قدیمی نگهداری آنها محسوب می‌شود هرچند امروزه این فرآورده‌های تبدیلی جهت طعم و مزه تولید می‌شوند و در این روش فرآورده‌ها در غلظتی از نمک قرار می‌گیرند که اجازه رشد به میکرووارگانیزمهای نامطلوب و عامل فساد نمی‌دهد اما در همین غلظت نمک باکتریهای لاکتیکی و استیکی مورد لزوم جهت تغییر فعالیت می‌کنند و به این ترتیب اسید لاکتیک و سایر متابولیستها تولید می‌شوند و دوباره از یک سو اسید رشد میکرووارگانیزمهای نامطلوب می‌گردد و از سوی دیگر سبب ترد شدن محصول می‌شود و فرآورده‌ی تخمیری آماده می‌گردد. به عنوان مثال در هنگام تهیه خیارشور، تخمیر با حداقل ۶ درصد نمک و ۲ درصد اسید استیک آغاز می‌شود و با اضافه کردن تدریجی نمک در طی ۸–۶ هفته غلظت نمک به ۱۵ درصد می‌رسد و در این مدت تخمیر کامل می‌شود. تخمیر توسط لوکونوستوک مزتروئیدس^۲ آغاز می‌شود. لاکتوسیلوس پلاتاروم^۳ نقش اصلی را در انجام عمل تخمیر بر عهده دارد. pH خیارشور در انتهای فرآیند حدود ۴ است. باکتریها و کپکها عامل فساد در این فرآورده هستند. سیاه شدن خیارشور ممکن است به خاطر رنگدانه سیاه رنگ و محلول در آب باسیلوس نیکریوفیکانس^۴ باشد. گونه‌ای از باکتریها مسئول بادکردگی^۵ در خیارشور می‌باشند.

ساورکرات^۶ فرآورده حاصل از تخمیر کلم تازه به وسیله باکتریها می‌باشد. pH نهایی محصول، ۳/۱ تا ۳/۷ می‌باشد. با وجود این امکان فساد توسط باکتریها، کپکها و مخمرها در این فرآورده وجود دارد. نرم شدن، لزج شدن، پوسیدن و صورتی شدن از فسادهای عمده در این فرآورده می‌باشند.

د – فرآورده‌های لبنی تخمیری: انواع بسیار زیادی از فرآورده‌های لبنی تخمیری وجود دارد، شامل ماست، کفیر، کومیس و انواع پنیر می‌باشد. یکی از اصلی‌ترین تغییراتی که در فرآورده‌های

۱ – *acetobacter*

۲ – *Leuconostoc mesenteroides*

۳ – *Lactobacillus plantarum*

۴ – *Bacillus nigrificans*

۵ – *bloater*

۶ – *Sauerkraut*

تخمیری رخ می دهد تبدیل لاکتوز به اسید لاکتیک می باشد که مقدار اندکی الکل نیز در این فرآیند تولید می شود.

ماست لخته یکنواخت حاصل از فعالیت دو باکتری استرپتوکوس ترموفیلوس^۱ و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس^۲ می باشد. استرپتوکوس تولید اسید را بر عهده دارد و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس موادی را تولید می کند که عطر و طعم خاص ماست را ایجاد می کند.

عمل تخمیر در کفیر^۳ توسط تورو لا کفیر، ساکارومیسنس کفیر^۴، لاکتوباسیلوس^۵ و استرپتوکوس لاکتیس^۶ صورت می گیرد. کومیس^۷ اولین بار از شیر مادیان ساخته شد و امروزه مشابه آن با تخمیر شیر گاو بدون چربی با لاکتوباسیلوس اسید و فیلوس^۸ تهیه می شود.

۴-۵-۲ تولید مواد افزودنی: از دیگر کاربردهای مفید میکرووارگانیزمها استفاده از آنها جهت تولید مواد افزودنی در صنایع غذایی می باشد. اسید سیتریک، اسید استیک، اسید لاکتیک، اسید نوماریک و اسید گلوکونیک اسیدهای آلی اصلی هستند که توسط میکرووارگانیزمها تولید می شوند. بخش زیادی از اسید لاکتیک مورد استفاده در صنعت توسط باکتریهای اسید لاکتیک و به ویژه جنس لاکتوباسیلوس تولید می شود. بیشترین میزان اسید سیتریک که رایج ترین اسید مورد استفاده در صنایع غذایی می باشد توسط کپکها و به ویژه آسپرژیلوس نایجر^۹ تولید می شود همچنین بخش زیادی از آنزیمهای در صنایع غذایی مثل آمیلازها، پروتئازها و لیپازها توسط میکرووارگانیزمها تولید می شود.

۵-۵- اثرات نامطلوب میکرووارگانیزمها در مواد غذایی

بیماریهای ناشی از میکرووارگانیزمها در مواد غذایی به دو صورت عفونت غذایی^{۱۰} و مسمومیت غذایی^{۱۱} ظاهر می شوند. در عفونتهای غذایی میکروب وارد بدن شده و پس از جایگزینی در بدن شروع به رشد و تکثیر می کند که در مراحل بعدی به بافتهای بدن حمله کرده و سم نیز تولید می کند مثل باکتریهای سالمونلا^{۱۲}، ویبرو^{۱۳}، یرسینیا^{۱۴}، لیستریا^{۱۵}، کامپیلوباکتر^{۱۶} و برخی از موش های اشریشیا کلی^{۱۷}. مسمومیت غذایی نتیجه سم باکتری است و به دو صورت ایجاد می شود.

۱ - <i>Streptococcus Thermophilus</i>	۲ - <i>L.bulgaricus</i>	۳ - <i>Kefir</i>
۴ - <i>Torula Kefir</i>	۵ - <i>Saccharomyces Kefir</i>	۶ - <i>Lactobacillus</i>
۷ - <i>Streptococcus Lactis</i>	۸ - <i>Koumiss</i>	۹ - <i>Lactobacillus acidophilus</i>
۱۰ - <i>Aspergillus niger</i>	۱۱ - <i>Food in fection</i>	۱۲ - <i>Food intoxication</i>
۱۲ - <i>Salmonella</i>	۱۴ - <i>Vibrio</i>	۱۵ - <i>Yersinia</i>
۱۶ - <i>Listeria</i>	۱۷ - <i>Campylobacter</i>	۱۸ - <i>Escherichia coli</i>

- الف** – مسمومیت غذایی که در اثر مصرف مواد غذایی آلوده به سموم میکروبی به وجود می آید.
در این مورد وجود باکتری در بدن جهت ایجاد بیماری لازم نیست و در واقع سم از پیش ساخته شده در غذا، عامل اصلی این بیماری است. از این مسمومیتها می توان به مسمومیت حاصل از سم استافیلوکوکوس اورئوس^۱ و کلستریدیوم بوتولینوم^۲ اشاره کرد.
- ب** – مسمومیتهايی که در اثر تجزیه پیکر سلول و آزاد شدن سم آن به وجود می آید که می توان به مسمومیت ناشی از مصرف غذای آلوده به کلستریدیوم پرفینجنس^۳ اشاره کرد.
- ۱-۵-۵** – تفاوت های بین عفونتهای غذایی و مسمومیتهاي غذایی
- ۱- در مسمومیتهاي غذایی وجود و حضور میکروب در غذا ضروری نیست بلکه فقط سم میکروب عامل بیماری می گردد در صورتی که در عفونتهای غذایی وجود میکروب ضروری است.
 - ۲- در عفونت غذایی تب وجود دارد ولی در مسمومیتهاي غذایی در بیشتر موارد تب وجود ندارد.
 - ۳- دوره کمون بیماری و مدت زمان ظهور علایم در مسمومیتهاي غذایی کوتاه تر است در حالی که در عفونتهای غذایی دوره کمون طولانی تر است.

ارزشیابی فصل پنجم

- ۱- بیماری را تعریف کنید.
- ۲- منظور از اصطلاح حدت در باکتریهای بیماریزا چیست؟
- ۳- باکتریهای کپسول دار و فاقد کپسول را از نظر قدرت بیماریزا مقایسه کنید.
- ۴- چند نمونه از آنتیمهای مؤثر در بیماریزا باکتریها را نام برد، عمل آنها را شرح دهید.
- ۵- اندو توکسین و اگزو توکسین چیست؟
- ۶- اثرات مفید میکروارگانیزمها را نام ببرید.
- ۷- سه نمونه از مواد غذایی تخمیری را که میکروارگانیزمها در تهیه آنها نقش اساسی دارند بنویسید.
- ۸- تهیه سرکه در چند مرحله صورت می گیرد توضیح دهید.
- ۹- اسید لاکتیک و اسید سیتریک مورد استفاده در صنایع غذایی توسط کدام میکروارگانیزمها تولید می شوند؟
- ۱۰- میکروارگانیزمها سبب چه نوع فسادهایی در ساور کراتها می شوند؟

۱ – *Staphylococcus aureus* ۲ – *Closteridium botulinum* ۳ – *Closteridium perfringens*