

## پودمان ۲

# کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی



گیاه خاص و مشخصی وجود ندارد که ذاتاً علفهرز باشد بلکه به سبب ناخواسته رشد کردن گیاهان در یک مکان، غیر قابل استفاده بودن و ضرر و زیان حاصل از آنها است که علفهرز نامیده می‌شوند. بنابراین عنوان علف هرز فقط به خصوصیت و عادت رشد آن گیاه بستگی ندارد بلکه به ارتباط و موقعیت آن گیاه نسبت به گیاه زراعی و انسان نیز مربوط است.

## واحد یادگیری ۲

# کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی

### آیا می‌دانید که

- کنترل علفهای هرز به چه روش‌هایی انجام می‌شود؟
  - آیا نام علفهای هرز برای یک گیاه در همه حال مناسب است؟
  - علف کش‌های شیمیایی چه تأثیری بر محیط زیست دارند؟
- برخی از گیاهان به دلیل این که توان رقابتی بالایی با گیاه زراعی دارند و قدرت بیشتری در تسلط بر منابع مورد نیاز گیاه دارند؛ هنگامی که در مزرعه در کنار گیاه زراعی رویش می‌یابند باقیستی کنترل شوند. در کنترل علفهای هرز روش‌های ارزان و ساده که به محیط زیست صدمه نزنند؛ اولویت دارند. اجرای تناوب‌های زراعی، زیر پوشش گرفتن زمین، خفه کردن علفهای هرز، از بین بردن اندامهای هوایی بطور مکرر(خسته کردن) و کاشت گیاهان پوششی با شاخ و برگ زیاد قبل از کاشت گیاه زراعی، روش‌های مناسبی برای کنترل علفهای هرز و حفظ سلامت محیط زیست می‌باشند.

### استاندارد عملکرد

در شرایط مناسب آب و هوایی، مزرعه را مورد پایش قراردهد. انواع علفهای هرز را دسته‌بندی کند و پس از تعیین زمان عملیات کنترلی، به روش‌های مکانیکی و شیمیایی علفهای هرز مزرعه را کنترل نماید.

## مفهوم علفهای هرز

گیاهان بسیاری با زیستگاههای گوناگون در طبیعت رشد می‌کنند. آن دسته از گیاهان، که به صورت‌های مختلف با فعالیت‌های بشر و منافع او تداخل دارند، علف هرز به حساب می‌آیند. اصولاً علفهای هرز گیاهانی هستند که بدون قصد قبلی و به صورت ناخواسته در مزرعه یا مکانی می‌رویند که مورد دلخواه بشر نیست و رقیبی سرخست برای گیاهان کاشته شده و عامل مهمی در تخریب مکان‌هایی از قبیل جاده، ریل آهن، فرودگاه، مخازن نفت یا پالایشگاهها و غیره محسوب می‌گردد. اما بیشترین و مهم‌ترین اثر تخریبی آنها در بخش کشاورزی دیده می‌شود.

تعریف‌های متعددی از علفهای هرز ارائه شده است. به بیانی دیگر، علف هرز گیاهی است که بر خلاف میل بشر رویش می‌کند و در زراعت باعث کاهش کمی و کیفی محصول شده و هزینه‌های تولید را افزایش و در محیط‌های عمومی موجب ناهمانگی و مざاحمت می‌شود. بین علفهای هرز، گیاهان بسیاری هستند که مصرف خوراکی یا دارویی دارند، ولی چون ناخواسته روئیده‌اند، دست پرورده انسان نیستند و برای محصولات کشت شده یک رقیب به حساب می‌آیند و علف هرز محسوب می‌شوند.

اصطلاح علف هرز در مقابل آن دسته از گیاهانی به کار می‌رود که کشاورز آنها را کشت می‌کند و هدف او از عملیات زراعی دست‌یابی به محصولی است که کشت کرده است. گیاهان وقتی علف هرز محسوب می‌گردند که زمین زراعی و یا منابع آبی را آلوده می‌نمایند و در محلی می‌رویند که ما می‌خواهیم گیاهان زراعی مورد نظر، رشد نموده و یا اصلاً گیاهی در آن محل رشد ننماید. برای مثال، وجود بوته گندم در مزرعه جو به منزله علف هرز بوده و همچنین رویش گیاه خردل وحشی در زراعت گندم به عنوان علف هرز محسوب می‌شود.

### اهمیت خسارت علفهای هرز

بر حسب بررسی‌های انجام شده، خسارت علفهای هرز در مزارع غلات ایران به طور متوسط سالیانه ۲۵ درصد و در سایر زراعتها به مراتب بیش از مزارع غلات است. در بعضی مناطق و شرایط، خسارت علفهای هرز باعث نابودی کامل مزرعه شده است. علفهای هرز دارای اثرات زیان‌آوری برای گیاهان زراعی، انسان، حیوان و محیط زیست می‌باشند که در ادامه این فصل به‌طور مفصل به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

#### فعالیت



#### بازدید از مزرعه و مشاهده برخی از علفهای هرز

ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز: لباس و کفش مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی، امکانات نوشtarی و دوربین یا تلفن همراه برای تهییه عکس و فیلم.

#### مراحل انجام کار:

- ۱- همراه هنرآموز از مزارع هنرستان دیدن کنید.
- ۲- نوع گیاهان کشت شده را بازشناسی نمایید.
- ۳- بدون آسیب به گیاهان اصلی، وارد مزرعه شوید.
- ۴- گیاهان هرز موجود در مزرعه را مشاهد کرده و نام محلی آنها را از هنرآموز خود بپرسید.
- ۵- با تکرار عملیات در روزهای مختلف و در مزارع مختلف با علفهای هرز بیشتری آشنا شوید.


- ۶- از شمای کلی و اندامهای مختلف هریک از علفهای هرز عکس بگیرید تا فراغیری نام و مشخصات آنها راحت تر و در دسترس تر باشد.
- ۷- گیاهان هرز را از نظر میزان توسعه اندامهای هوایی با محصول اصلی، مقایسه کنید.
- ۸- اگر این گیاهان در مرحله بذر دهی می‌باشند، مقدار یا تعداد بذر آنها را بررسی کرده و از شکل میوه و بذر آنها نیز عکس بگیرید.
- ۹- از توضیحات هنرآموز، مشاهدات و یافته‌های خود گزارش تهیه کرده و آماده ارایه نمایید.

### تقسیم‌بندی علفهای هرز

علفهای هرز را به روش‌های مختلف، طبقه بندی می‌کنند. برخی از این روش‌ها عبارتند از:

**تقسیم‌بندی علفهای هرز بر اساس طول مدت زندگی**

طول عمر یک گیاه مدت زمانی است که بذر آن جوانه زده، رشد کرده و پس از تولید مثل و بوجود آوردن بذر، از بین می‌رود. از این نظر علفهای هرز را به سه دسته کلی: یکساله‌ها، دوساله‌ها و چندساله‌ها تقسیم می‌نمایند (شکل ۱).



شکل ۱- نمایی شماتیک از چرخه زندگی گیاه

#### الف) علفهای هرز یکساله

گیاهان یکساله، گیاهانی را گویند که چرخه زندگی آنها یعنی از جوانه زدن بذر تا تولید بذر جدید در طی یک سال زراعی انجام می‌شود و سپس از بین می‌روند.

این گیاهان به دو گروه یکساله زمستانه و یک ساله تابستانه تقسیم می‌شوند.

#### گیاهان هرز یکساله زمستانه

گروهی از گیاهان هستند که در پاییز جوانه می‌زنند. این گیاهان در طول زمستان، زندگی گند خود را می‌گذرانند و در بهار یا اوایل تابستان بذر جدید تولید می‌کنند. مانند فرفیون و دُمروباهی (شکل ۲) که در میان گیاهان زراعی کاشته شده در پاییز، مانند یونجه و گندم بیشتر دیده می‌شوند.

## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی



دم رو باهی



فرفیون

شکل ۲- علفهای هرز یکساله زمستانه

### گیاهان هرز یکساله تابستانه

گیاهانی هستند که بذر آنها در بهار سبز شده و در پاییز همان سال، بذر تولید می‌کنند. مانند جو وحشی و خرفه(شکل ۳). این گونه علفهای هرز بیشتر در میان گیاهان زراعی کشت شده در بهار، مانند چغندر قند، پنبه، ذرت و غیره دیده می‌شوند.



جو وحشی



خرفه


شکل ۳- علفهای هرز یکساله تابستانه

## ب) علفهای هرز دوساله

چرخه زندگی گیاهان دوساله، طی دو سال تکمیل می‌شود. این قبیل گیاهان در سال اول، با رشد رویشی، تولید ساقه و برگ می‌کنند و در سال دوم به گل نشسته، تولید بذر می‌نمایند. این گیاهان بیشتر در مناطق معتدله دیده می‌شوند. مانند پیرگیاه، کنگر صحراوی و علف ماهور(شکل ۴).



علف ماهور



کنگر صحراوی



پیر گیاه

شکل ۴ - علفهای هرز دو ساله

## علفهای هرز دائمی

گیاهان هرز دائمی یا چندساله، گیاهانی هستند که اغلب بیش از دو سال زندگی می‌کنند. تعدادی از این گیاهان، علاوه بر بذر، قادر به تکثیر و ازدیاد به وسیله اندامهای رویشی نیز می‌باشند(شکل ۵).



مرغ



سیر وحشی



پیرگیاه

شکل ۵- علفهای هرز دائمی



## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی

شناسایی اندامهای تکثیر شونده غیرجنسی علفهای هرز چندساله

ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز: لباس و کفش مناسب کار، دستکش، بیل، بیلچه یا شفره، آب، امکانات نوشت افزاری و دوربین برای تهیه عکس و فیلم.

**مراحل انجام کار:**

۱- همراه هنرآموز خود به مزرعه هنرستان وارد شوید.

۲- با راهنمایی هنرآموز، تعدادی از علفهای هرز چندساله معروفی شده در کتاب را شناسایی کنید.

به گیاه اصلی و نظم مزرعه آسیب وارد نسازید.



۳- با استفاده از ابزار مناسب، گیاهان شناسایی شده را تا حد امکان به طور کامل از زمین خارج نمایید.

۴- ریشه و اندامهای مورد نظر را با آب کاملاً بشوئید.

۵- اندامهای رویشی تکثیر شونده گیاهان را با راهنمایی هنرآموز، مشخص کرده و آنها را با هم مقایسه کنید.

۶- مشاهدات خود و توضیحات هنرآموز را به درستی در دفتر گزارش، ثبت و ضبط کرده و برای ارایه آماده نمایید.

## تقسیم‌بندی علفهای هرز از نظر نوع زندگی

علفهای هرز بر حسب نوع زندگی به سه دسته کامل، انگل و نیمه انگل تقسیم می‌شوند.

### الف) علفهای هرز کامل

علفهای هرزی هستند که قادرند مواد مورد نیاز خود را از زمین، آب و هوا به دست آورند. مانند خردل وحشی، پنیرک و ... (شکل ۶).



پنیرک



خردل وحشی

شکل ۶ - علفهای هرز کامل

## ب) علفهای هرز انگل

گیاهانی هستند که قادر به تأمین مواد غذایی خود نبوده و به این دلیل، کاملاً وابسته به گیاه میزبان می‌باشند؛ مانند سِس و گل جالیز که برای ادامه زندگی خود، ناگزیر هستند از گیاهان میزبان استفاده کنند (شکل ۷).



گل جالیز



سِس

شکل ۷- علفهای هرز انگل

## پ) علفهای هرز نیمه انگل

گیاهانی هستند که مقداری از غذای موردنیاز خود را به طور مستقیم، تأمین نموده (به دلیل وجود مقداری سبزینه یا کلروفیل در برخی از اندامها) و مقداری را از میزبان خود می‌گیرند؛ مانند دارواش که بر روی تنہ درختان بزرگ، مستقر می‌شود. این گونه گیاهان آب و املاح را از میزبان گرفته و با کلروفیل خود، عمل غذاسازی را انجام می‌دهند (شکل ۸).



شکل ۸- علفهای هرز نیمه انگل دارواش

## ۳- تقسیم بندی علفهای هرز بر اساس شکل برگ

بر این اساس علفهای هرز را به دو گروه بزرگ تقسیم‌بندی می‌کنند:

(الف) علفهای هرز پهن برگ؛ مانند گاو پنبه و توق (شکل ۹).

## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی



توق



گاو پنبه

شکل ۹- علفهای هرز پهنه برگ

ب) علفهای هرز باریک برگ: مثل سوروف، حلفه و مرغ. (شکل ۱۰)



حلفه



سوروف

شکل ۱۰- علفهای هرز باریک برگ

هدف از دسته‌بندی علفهای هرز چیست؟

بیندیشید



## مجموعه یا هر باریوم گیاهان هرز

یکی از راههای شناسایی گیاهان از جمله گیاهان هرز، داشتن نمونه آنها در تمام طول سال است. جمع آوری نمونه‌ها و نگهداری آنها از دیرباز مرسوم بوده است. برخی برای سرگرمی و لذت بردن اقدام به تهیه مجموعه یا کلکسیون می‌کنند. اما دانش آموختگان رشته‌های کشاورزی برای گسترش دانش، درک دقیق تفاوت بین انواع گیاهان، افزایش و به روز رسانی معلومات خود و تبادل اطلاعات علمی اقدام به این کار می‌نمایند. در گیاه شناسی به مجموعه نمونه‌های گیاهی اصطلاحاً هر باریوم گیاهی می‌گویند(شکل ۱۱).



شکل ۱۱- نمونه‌ای از هرباریوم

### مراحل تهییه هرباریوم گیاهی

- جمع آوری
- خشک کردن
- نگهداری

برای جمع آوری نمونه‌های علف‌های هرز، در زمان‌های مختلف به عبارت دیگر در مراحل مختلف رشد و نمو یا حداقل زمانی که گیاه تمام یا حداقل اندام‌های خود را دارد، به محل پراکنش یا مزارع اختصاصی آن علف هرز رفت، آنها را با احتیاط کامل از زمین خارج می‌کنند(شکل ۱۲)



شکل ۱۲- گیاه کامل

نمونه برداشتی را پس از حذف ناخالصی‌ها، داخل کیسه همراه (ترجیحاً کاغذی) قرار داده به محل آزمایشگاه یا محل خشک کردن می‌آورند.

برای خشک کردن و نگهداری علف‌های هرز، ابتدا ریشه را شسته و تمیز می‌کنند؛ و سپس آنها را مدت کوتاهی در محل سایه قرار می‌دهند تا رطوبت سطحی آنها خشک شود. اندام‌ها متعدد علف هرز را به ترتیبی که شکل و شمايل کلي گياه بهم نخورد، تا حدی تُنك می‌کنند. گیاه را روی صفحات کاغذی که جاذب رطوبت می‌باشد؛ مثل روزنامه قرار می‌دهند (شکل ۱۳). ساقه‌های بلند را به شکل‌های معمولاً N خم می‌کنند تا در یک صفحه جا بگیرد(شکل ۱۴).

## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی



شکل ۱۴- خم کردن ساقه



شکل ۱۳- خشک کردن نمونه

برگ‌ها، ریشه‌ها و سایر اندام‌ها را روی کاغذ به نحوی می‌گسترانند تا بدون چین خوردگی، شکل طبیعی گیاه حفظ گردد. این صفحه را لای صفحات کاغذی دیگر قرار داده و مجموعه را تحت فشار (پرس) قرار می‌دهند؛ تا هم ضمن کاهش یا کشیده شدن رطوبت و خشک شدن، گیاه دارای فرم مطلوبی برای نگهداری و شناسایی گردد.

نمونه گیاهی باید کامل بوده و حاوی برگ، ساقه، ریشه و گل یا میوه باشد. این نمونه‌ها را باید از رطوبت و حمله برخی آفات، دور نگه داشت. برای نگهداری بلند مدت نمونه‌های گیاهی خشک شده، آنها روی کاغذهای مخصوص قرار داده و می‌چسبانند. برچسبی در پایین سمت راست صفحه قرار می‌دهند. در روی برچسب اطلاعاتی از قبیل



شکل ۱۵- کمد طبقه‌بندی علفهای هرز در هرباریوم

نام عمومی و علمی علف هرز، خانواده، نام میزبان، محل جمع‌آوری، تاریخ جمع‌آوری و نام جمع‌آوری کننده و شماره گیاه را یادداشت می‌کنند. نمونه‌های مربوط به یک جنس یا خانواده یا مجموعه نمونه‌های مربوط به یک میزبان، در هر باریوم درون یک پوشه کاغذی نازک قرار می‌گیرد.

اطلاعات لازم مربوط به علفهای هرز را روی برچسب نوشته و سپس برچسب را روی پوشه می‌چسبانند. مجموعه‌های بزرگتر در یک فایل و به همین ترتیب در کمد مخصوص چیده می‌شوند(شکل ۱۵).

**فعالیت**

**جمع آوری نمونه‌های علف‌های هرز رایج در منطقه ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز:** لباس و کفش مناسب کار، دستکش، بیل، بیلچه، روزنامه، آب، کیسه پلاستیکی و امکانات ثبت و ضبط مشاهدات

**مراحل انجام کار:**

- ۱- همراه هنرآموز خود به مزرعه هنرستان وارد شوید.

برای ورود به مزرعه ضمیم هماهنگی قبلی، از گیاه اصلی مراقبت کنید.



- ۲- نمونه‌هایی از علف‌های هرز موجود در مزرعه هنرستان خود را شناسایی کنید.
- ۳- این نمونه‌ها را به آرامی و با استفاده از بیل یا بیلچه همراه با قسمتی از ریشه، از خاک بیرون بیاورید.
- دقت کنید: نمونه گیاهی کامل دارای ریشه، ساقه، برگ، گل یا میوه می‌باشد.
- ۴- نمونه خارج شده از خاک را پس از تأیید هنرآموز، در کیسه همراه قرار داده و به جمع آوری ادامه دهید.
- ۵- علف‌های هرز جمع آوری شده را به آزمایشگاه هنرستان منتقل نمایید.
- ۶- ریشه گیاهان هرز را با آب بشوئید و با استفاده از روزنامه خشک نمایید.
- ۷- مشاهدات خود را در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و برای ارایه آماده نمایید.

**فعالیت****خشک کردن نمونه‌های علف‌های هرز جمع آوری شده**

**ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز:** تخته پرس مخصوص، کش یا نخ مخصوص و یا پیچ و مهره، روزنامه باطله، نمونه‌های مختلف علف‌های هرز جمع آوری شده

- ۱- نمونه‌های علف هرز جمع آوری شده را به خوبی تمیز کنید.
- ۲- بخشی از اندام‌های مازاد نمونه را حذف کنید.

حذف کردن بخشی از اندام‌ها به حدی و به نحوی باشد که شکل اصلی گیاه تغییر ننماید.



- ۳- نمونه را روی یک کاغذ جذب کننده رطوبت (غیر روغنی) مانند روزنامه باطله قرار دهید.
- ۴- اندام‌های نمونه را ضمن گستراندن روی صفحه کاغذ، با چسب کاغذی مهار کنید.
- ۵- مشخصات اولیه نمونه را یادداشت کرده و در محل مناسبی از صفحه در کنار نمونه قرار دهید.

## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی

فعالیت



۶- نمونه را لابلای چند برگ روزنامه باطله قرار دهید(شکل ۱۶).

۷- نمونه‌های دیگر را به همین ترتیب آماده نمایید.

۸- نمونه‌های آماده شده را روی یک تخته قرار دهید.

ابعاد تخته مختصراً بزرگتر از ابعاد صفحه کاغذ نمونه باشد.



شکل ۱۶- خشک کردن نمونه علفهای هرز منطقه

دقت کنید: در صورت عدم دسترسی به تخته مناسب، می‌توانید از ورقه‌های مقواهی ضخیم استفاده کنید.

۹- تخته دیگری به شکل و ابعاد تخته زیرین، بر روی نمونه‌ها قرار دهید.

۱۰- بر روی تخته بالایی وزنه سنگین قرار داده یا به خوبی طناب کشی کنید.

■ نمونه‌ها باید به خوبی تحت فشار قرار گیرند تا در ضمن خشک شدن بخوبی شکل بگیرند.



■ نمونه‌ها باید حدود ۱۰ روز در این شرایط قرار داشته باشند، تا به طور کامل خشک شوند. چنانچه نمونه‌ها برگ‌های پهنهن یا آبدار باشند، کاغذها(روزنامه‌ها) را باید یک تا چند نوبت تعویض کرد.

۱۱- تجربیات خود و توضیحات هنرآموز را به درستی در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و برای ارایه آماده نمایید.

خلق باشید

با استفاده از نئوپان، پیچ و مهره و یا طناب و امکانات و وسایلی که در گارگاه هنرستان خودتان موجود است، یک تخته پرس جهت خشک کردن گیاهان هرز و تهیه هرباریوم طراحی نمایید(شکل ۱۷).



شکل ۱۷- تخته پرس مخصوص خشک کردن نمونه‌های گیاهی

#### فعالیت



#### نگهداری نمونه‌های علف‌های هرز خشک شده

ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز: مقواه سفید به ابعاد استاندارد (کاغذ هرباریوم)، نوار چسب مخصوص، برچسب مخصوص نمونه‌های گیاهی، پوشه و قفسه طبقه‌بندی شده.

#### مراحل انجام کار:

- ۱- با سرکشی به نمونه‌های تحت پرس، خشک شدن کامل آنها را به تأیید هنرآموز برسانید.
  - ۲- نمونه‌های خشک شده را از کاغذ روزنامه باطله به روی کاغذ هرباریوم منتقل کنید.
  - ۳- با چسب مخصوص، نمونه‌ها را روی کاغذ ثابت نمایید.
  - ۴- روی ورقه‌ای به ابعاد حدود  $6 \times 10$  سانتی‌متر اطلاعاتی از قبیل شماره گیاه، نام عمومی علف هرز، نام بومی، نام میزبان، محل جمع‌آوری، تاریخ جمع‌آوری و نام جمع‌آوری کننده را بنویسید.
  - ۵- ورقه شناسه را پس از تأیید هنرآموز، در گوشه پایینی سمت راست کاغذ هرباریوم، بچسبانید.
  - ۶- روی کاغذ هرباریوم حامل نمونه گیاهی و شناسه، مشخصات علف هرز را با نایلون مخصوص یا سلیفون، پیوشناید(شکل ۱۸).
  - ۷- نمونه‌های آماده شده را در پوشه و قفسه‌ای که هنرآموز تعیین می‌کند، قرار دهید(شکل ۱۹).
  - ۸- تجربیات خود و توضیحات هنرآموز را به درستی در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و برای ارایه آماده نمایید.
- دقت کنید: در هنگام قرار دادن نمونه‌ها در بین برگ‌های روزنامه، نحوه قرارگیری برگ، ساقه، ریشه و گل به شکل مناسب انجام شود تا آسیبی به این اندام‌ها وارد نشود.

## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی



شکل ۱۸- نمونه خشک شده علفهای هرز



شکل ۱۹- نمونه‌ای از هرباریوم‌های گیاهی

فعالیت



به همراه هنرآموز خود از هرباریوم‌های مراکز تحقیقات گیاه شناسی و علفهای هرز دانشگاهها و جهادکشاورزی نزدیک به منطقه خود بازدید کرده و از نزدیک با فعالیت آنها آشنا شوید(شکل ۱۹). از این بازدید گزارشی تهیه نمایید.

مقایسه کنید



شکل ۲۰- نگهداری نمونه‌های علف هرز به روش پرسکردن در تلق

## ویژگی‌های شاخص و نحوه خسارت علف‌های هرز



شکل ۲۱- رشد سریع‌تر علف‌های هرز نسبت به گیاه اصلی در مزرعه

ویژگی‌های شاخص علف‌های هرز  
گسترش علف‌های هرز در مناطق مختلف و  
پایداری آنها در شرایط متفاوت به دلیل ویژگی‌های  
آنها است.

- برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های علف‌های هرز  
عبارتند از:
- رشد سریع: علف‌های هرز عموماً نسبت به  
گیاهان اصلی رشد سریع‌تری دارند(شکل ۲۱).

پژوهش



اختلاف رشد (مثلاً تفاوت ارتفاع) چند نمونه از علف‌های هرز را با گیاهان اصلی در مزرعه، پیگیری کرده و ضمن تهیه  
عکس و گزارش، در کلاس ارائه دهید.



شکل ۲۲- رویش علف‌های هرز در خاک‌های نامناسب حاشیه مزرعه

- کم‌توقع بودن: علف‌های هرز نسبت به  
گیاهان اصلی کم‌توقع‌ترند. به عبارت دیگر، نیاز  
به مواد غذایی و عوامل مؤثر رشد در آن بسیار  
کمتر از گیاهان زراعی است. بنابراین با فراهم  
شدن عوامل و شرایط در کمترین حد ممکن،  
شروع به رشد و گسترش می‌نمایند(شکل ۲۲).

- تولید بذر زیاد: علف‌های هرز، بذر بسیار زیادی تولید می‌کنند. برای مثال، تعداد بذر در یک بوته سلمه تره  
(شکل ۲۳) به حدود ۷۰۰۰۰ و در تاج خروس(شکل ۲۴) به ۲۰۰۰۰ عدد می‌رسد.



شکل ۲۳- شکل گیاه و بذر سلمک (سلمه تره)

## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی



شکل ۲۴- گیاه و بذر تاج خروس

تولید بذر زیاد چه نقش و اهمیتی در پایداری و گسترش علف هرز دارد؟

بیندیشید



شکل ۲۵- غلبه علف هرز در رقابت با گیاه زراعی

با استفاده از منابع علمی معتبر(کتاب، مجلات، سایت و ...) سایر ویژگی‌های علفهای هرز را بدست آورید. در پژوهش خود به واژگان و اصطلاحاتی چون: طول عمر بذر، خواب بذر، روش‌های تکثیر، نحوه پراکنش یا انتشار و ... دقت کنید. بررسی خود را پس از تنظیم و تأیید هنرآموز، برای ارائه در کلاس آماده نمایید.

پژوهش





## بررسی برخی از خصوصیات علفهای هرز

ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز: لباس و کفش مناسب کار، دستکش، بیل، بیلچه، قیچی باگبانی، بینوکولر و لوب دستی

### مراحل انجام کار:

- ۱- در زمان مناسب همراه با هنرآموز خود به مزرعه هنرستان وارد شوید.
- دقت کنید: به نظم مزرعه و سلامت گیاه اصلی آسیب وارد نشود.
- ۲- تعدادی از علفهای هرز مزرعه را شناسایی کرده و تشخیص خود را به تأیید هنرآموز برسانید.
- ۳- نمونه‌هایی از بوتهای علفهای هرز را از نظر میزان رشد(ارتفاع، حجم...) با گیاه اصلی مقایسه نمایید.
- ۴- در مساحت محدود مثلاً یک مترمربع از مزرعه، تعداد علفهای هرز را به دقت شمارش کرده و یادداشت کنید.
- دقت کنید: چه نوع علف هرزی در منطقه شما از انواع دیگر، بیشتر روئیده است، چرا؟
- ۵- اندام بذر دهنده برخی از علفهای هرز را به کمک قیچی باگبانی جدا کنید و پس از انتقال به آزمایشگاه، آنها را شمارش نمایید.
- ۶- میزان نفوذ و پراکنش ریشه در برخی از علفهای هرز را مطالعه کنید.
- ۷- یافته‌های خود و توضیحات هنرآموز را به درستی در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و برای ارایه آماده نمایید.

- قabilت طولانی حیات (جوانه زنی): بذر علفهای هرز دارای عمر طولانی بوده و می‌توانند در شرایط مختلف محیطی، قوه نامیه خود را حفظ نمایند. برای مثال، بذر علفهای هرز گونه‌هایی از گاوزبان و پیچک صحرایی(شکل ۲۶)، می‌توانند برای مدت طولانی قوه نامیه خود را حفظ کرده و دارای قابلیت جوانه زنی باشند.



پیچک صحرایی



گاو زبان بدل

شکل ۲۶- علفهای هرز با قوه نامیه طولانی

## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی

- خواب بذر: مجموعه بذرها در شاخه‌های متفاوت یک بوته علف هرز و حتی در قسمت‌های مختلف یک شاخه، دارای خواب متفاوت هستند و در صورت قرار گرفتن در شرایط مطلوب جوانه‌زنی، بذرها با هم جوانه نمی‌زنند.
- سهولت انتشار: بذر برخی از علفهای هرز با برخورداری از زواید و شکل‌های خاص، توانایی انتقال و انتشار بیشتری نسبت به گیاهان زراعی دارند (شکل ۲۷).



شکل ۲۷- بذر علف هرز گل قاصد با چتر جهت انتشار آسان تر

فعالیت



### بررسی شکل و زواید بذر علفهای هرز

ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز: لباس و کفش مناسب کار، دستکش، بیلچه، ذرهبین یا لوپ.  
مراحل انجام کار:

- ۱- به همراه هنرآموز خود از مزارع و زمین‌های اطراف هنرستان دیدن کنید.
- ۲- با رعایت اصول مراقبت از گیاه اصلی، وارد مزرعه یا حاشیه آن شوید.
- ۳- بذر چند نوع علفهای هرز موجود در منطقه را پیدا کنید.
- ۴- شکل، زواید(زوایدی مانند بال، چتر، دنباله پیچ دار، خار...) و برجستگی‌های روی بذر این علفهای هرز را مطالعه کنید و از آنها عکس بگیرید.
- ۵- نتایج مشاهدات خود را در قالب یک گزارش تهیه و در کلاس ارائه دهید.

- امکان تکثیر غیرجنسی: برخی از علفهای هرز می‌توانند با اندام‌های غیرجنسی (ریشه، پیاز، غده، ریزوم و ...) ازدیاد و گسترش پیدا کنند(شکل ۲۸).



شکل ۲۸- ریزوم در علف هرز قیاق (نمونه‌ای از اندام رویشی تکثیرشونده)

#### فعالیت



#### مشاهده اندام‌های رویشی تکثیرشونده در علف‌های هرز

ابزار، مواد و امکانات موردنیاز: لباس و کفش مناسب کار، دستکش، بیل، بیلچه و آب.  
مراحل انجام کار:

- ۱- به همراه هنرآموز خود از مزرعه هنرستان بازدید کنید.
- ۲- باحتیاط و بدون آسیب زدن به گیاه زراعی وارد مزرعه یا حاشیه آن شوید.
- ۳- انواع علف‌های هرز موجود در منطقه که دارای اندام رویشی تکثیرشونده هستند را از هنرآموز خود بپرسید.
- ۴- علف‌های هرز مورد نظر را با استفاده از بیل و بیلچه از زمین خارج نموده به طوری که ریشه و اندام‌های زیرزمینی آنها کاملاً از زمین بیرون آید.
- ۵- ریشه و اندام‌های زیرزمینی این گیاهان را با آب بشویید.
- ۶- اندام‌های زیرزمینی تکثیرشونده آنها را مشاهده و مطالعه کنید.
- ۷- ضمن تهیه عکس، نتایج مشاهدات و یافته‌های خود را به صورت یک گزارش تهیه و به هنرآموز خود تحويل دهید.

#### روش‌های خسارت علف‌های هرز



علف‌های هرز به روش‌های متنوع و یا از راه‌های مختلفی ایجاد خسارت می‌کنند. برخی از آنها عبارتند از:

- هدردادن آب: علف‌های هرز میزان قابل توجهی از آبی را که باید صرف رشد گیاه اصلی شود، مصرف می‌کنند. همچنین وجود علف‌های هرز در کف یا کنار جوی‌ها، باعث کاهش سرعت جریان و افزایش نفوذ عمقی، نشت جانبی و گاهی سریز شدن آب جوی‌ها می‌شود به این ترتیب سبب کاهش آب مورد استفاده گیاه می‌شوند (شکل ۲۹).

شکل ۲۹- علف‌های هرز روئیده در نهر آبیاری

## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی

- **صرف مواد غذایی:** قدرت رقابت علفهای هرز با گیاهان اصلی برای جذب مواد غذایی خاک، خیلی زیاد است. علفهای هرز در بیشتر شرایط با سرعت زیادی رشد می‌کنند و تقاضای زیادی برای مصرف مواد غذایی دارند. در واقع بخش عمده‌ای از مواد غذایی موجود در خاک یا مصرف شده توسط کشاورز، با وجود علفهای هرز به هدر می‌رود.

- **سایه افکنی:** اگر رشد علفهای هرز مهار نگردد، به سرعت قد کشیده و مانع از رسیدن نور مناسب به گیاه اصلی می‌گردد(شکل ۳۰).



شکل ۳۰- علف هرز خاکشیر تاخ که با رشد سریع خود روی گندم سایه افکنی کرده است.

- **کاهش کیفیت و کمیت محصول:** محصولات تولیدی در مزارع آلوده به علفهای هرز، به مراتب از کیفیت پایین‌تری نسبت به محصولات تولید شده در مزارع بدون علف هرز، برخوردار هستند. میزان عملکرد در واحد سطح نیز در مزارع آلوده به علفهای هرز، بسیار کمتر است(شکل ۳۱).



محصول یونجه



محصول گندم

شکل ۳۱- مزرعه و محصول آلوده به بذر علفهای هرز

**افزایش هزینه تولید (قیمت تمام شده محصول):** مهار علفهای هرز با هر وسیله‌ای که باشد (وجین دستی، ماشینی، شیمیایی، بیولوژیکی و ...) از نظر اقتصادی هزینه زیاد و قابل توجهی برای کشاورز دارد (شکل ۳۲). همچنین مخلوط شدن بذر علفهای هرز، گاهی با ریشه‌های گسترده یا شاخ و برگ حجیم یا ساقه پیچنده خود، عملیات برداشت را کند و دشوار می‌نمایند (شکل ۳۲).



شکل ۳۲- وجین علفهای هرز توسط کارگران که باعث افزایش هزینه داشت محصول می‌شود.

به نظر شما علفهای هرز به چه روش‌های دیگری می‌توانند در روند تولیدات گیاهی اختلال ایجاد کنند؟ در انجام پژوهش افزون بر استفاده از منابع علمی معتبر، از کارشناسان کشاورزی و کشاورزان خبره منطقه استفاده نمایید.

پژوهش



بیندیشید



به کمک هنرآموز خود در خصوص شکل ۳۳ در کلاس بحث و تبادل نظر نمایید و بگویید چگونه بسیاری از آفات می‌توانند از علفهای هرز در جهت انتشار مجدد خود در طبیعت بهره بگیرند؟

شکل ۳۳- چرخه زندگی کرم خاردار پنبه



## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی

### ارزیابی نمونه خسارت علفهای هرز به محصولات زراعی

ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز: لباس و کفش مناسب کار، دستکش، امکانات یادداشت و تصویر برداری  
مراحل انجام کار:

۱- همراه هنرآموز خود در زمان و شرایط مناسب وارد مزرعه شوید.

جهت ورود به مزرعه ضمن توجه به وضعیت رشدی گیاه اصلی و علفهای هرز، به  
گاورو بودن زمین مزرعه هم توجه کنید.



شکل ۳۴- مزرعه گندم بدون علف هرز(۱)

و با علف هرز(۲)

۲- قسمتهایی از مزرعه را که فاقد علف هرز بوده یا علفهای هرز آن ناچیز است؛ مشخص کنید(شکل ۳۴ بخش ۱).

۳- قسمتهایی از مزرعه که دارای بیشترین تراکم علف هرز هستند را هم مشخص کنید(شکل ۳۴ بخش ۲).

۴- از هر قسمت، مساحتی حدود یک مترمربع را انتخاب کنید.

۵- وضعیت رویش گیاه اصلی را در دو قسمت(بدون علف هرز و دارای علف هرز) مقایسه نمایید.  
دقت کنید: برای مقایسه می‌توانید از شاخصهایی مانند: تعداد بوته اصلی در متر مربع، ارتفاع بوته، تعداد برگ‌ها و... استفاده کنید.

برای اطمینان بیشتر و قضاؤت درست‌تر، این عملیات را در دو نقطه دیگر، همانند فوق تکرار کنید.



۶- نقاط مورد آزمایش را با علامت گذاری، مشخص کنید.

۷- میزان تولید و مرغوبیت محصول در نقاط دارای علف هرز و بدون علفهای هرز را با هم بستجید.


۸- نتایج مشاهدات و سنجش‌های خود را در گزارش کار نوشته و به هنرآموز خود تحویل دهید.

## روش‌های تکثیر، انتشار و ورود علف‌های هرز به مزرعه

### روش‌های تکثیر علف‌های هرز

#### الف) تکثیر جنسی:

علف‌های هرز به روش جنسی و از طریق بذر تکثیر پیدا می‌کنند. لازمه تولیدمثل جنسی تشکیل اندام‌های زایشی و گرده افسانی است که منجر به تولید بذر می‌شود. خردل وحشی و چچم گونه‌هایی از علف‌های هرز هستند که به روش تکثیر جنسی ازدیاد می‌یابند (شکل ۳۵).



چچم



خردل وحشی

شکل ۳۵- علف‌های هرز دارای تکثیر جنسی



شکل ۳۶- علف هرز گل قاصد

ب) تکثیر غیرجنسی یا رویشی: در تولیدمثل غیرجنسی، اندام‌های رویشی گیاه نقش دارند. اغلب علف‌های هرز چندساله به روش غیرجنسی و تعداد کمی از آنها از طریق بذر تکثیر می‌شوند.

-تولید پاجوش: برخی از علف‌های هرز با ریشه‌های قطور و عمودی خود، افزون بر ازدیاد با بذر، از راه تولید پاجوش (ریشه جوش) هم ازدیاد پیدا می‌کنند. گل قاصد مثالی از این گیاهان می‌باشد (شکل ۳۶).

-ساقه‌های خزنده: ساقه‌های خزنده برخی از علف‌های هرز در محل تماس با خاکِ مرطوب، ریشه و اندام‌های هوایی تولید می‌کنند. توت فرنگی وحشی از طریق استولون<sup>۱</sup>، قیاق از طریق ریزوم<sup>۲</sup> (شکل ۳۷)، مرغ از طریق استولون و ریزوم (شکل ۳۸).

۱ - ساقه رونده در روی سطح زمین

۲ - ساقه رونده در زیر سطح زمین

## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی



مرغ

شکل ۳۸- علف هرز تکثیر شونده با استولن و ریزوم



قیاق(تکثیر با ریزوم)



توت فرنگی وحشی(تکثیر با استولن)

-ریشه‌های افقی یا خزنده: برخی علفهای هرز نظیر ازمک دارای ریشه‌های عمیق هستند که گاهی به صورت افقی در خاک گسترش یافته و از جوانه‌های موجود در روی این ریشه‌ها، پایه‌های جدید ظاهر می‌شوند (شکل ۳۹).

-پیاز: بعضی از علفهای هرز نظیر پیاز وحشی از طریق پیاز تکثیر پیدا می‌کنند (شکل ۴۰).

-غده: تعدادی از علفهای هرز با استفاده از غده ازدیاد می‌باشند که از آن جمله می‌توان به شمعدانی وحشی اشاره نمود (شکل ۴۱).



شکل ۴۱- شمعدانی وحشی



شکل ۴۰- پیاز وحشی



شکل ۳۹- ازمک

راههای انتشار علفهای هرز و ورود آنها به مزرعه بذرها و میوه‌های برخی از علفهای هرز با پیدا کردن زوائد یا ساختار خاصی، برای انتشار سازگاری یافته‌اند. خار، چتر، بال، دنباله متهای شکل و ... نمونه‌هایی از این سازگاری است (شکل ۴۲).



بذر شیرتیغک با زوائد چترمانند



بذر خارخسک با زوائد خارمانند



بذر توشک با زوائد بالمانند



بذر نوک لکلکی با ساختار مته‌مانند

شکل ۴۲ - انواع زوائد روی بذر در علفهای هرز

با توجه به شکل ۴۲، هریک از زوائد چگونه باعث انتشار بذر علفهای هرز می‌شوند؟

**بیندیشید**

به چه روش‌های دیگری بذر علفهای هرز منتشر می‌شود، چه ویژگی‌هایی باعث آن شده است؟

**پژوهش**

## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی

### عوامل انتشار بذر علفهای هرز عبارتند از:

۱- از طریق جریان هوا: باد عامل مهم و مؤثری برای انتشار بذر علفهای هرز دارای زوائد بال مانند، (مانند ترشک) یا دارای چتر (مانند گل قاصد) می باشد(شکل ۴۳).



بذر گل قاصدک



بذر ترشک

شکل ۴۳- انتشار از طریق جریان باد



شکل ۴۴- انتشار بذر علفهای هرز از محلی به محل دیگر توسط آب

۲- از طریق جریان آب: در حاشیه جوی‌ها و رودخانه‌ها انواع علفهای هرز می‌روید. بذر این گیاهان داخل آب می‌ریزد. بر این اساس آب در انتشار بذر علف هرز نقش مهمی دارد. سیلانهای طبیعی نیز به طور قابل توجهی باعث پخش علفهای هرز می‌گردند(شکل ۴۴).



شکل ۴۵- بذر علفهای هرز چسبیده به پشم گوسفند

۳- از طریق حیوانات: بسیاری از جانوران (اعم از وحشی و اهلی) از جمله گوسفندان از عوامل انتقال و انتشار علفهای هرز محسوب می‌شوند. بعضی از بذرها به دلیل داشتن قلاب، کرک، خار یا دارا بودن سطحی خشن و ناهموار به بدن جانوران به ویژه آنها یی که دارای کرک و پشم هستند، می‌چسبند و از محلی به محل دیگر منتقل می‌شوند. بذرهای جو وحشی، توق و دم روباهی نمونه‌هایی هستند که به این طریق پراکنده می‌شوند.

(شکل ۴۵)

حیوانات و پرندگان به جز موارد گفته شده، به چه روش‌های دیگری می‌توانند در انتقال و انتشار علفهای هرز مؤثر باشند؟

بیندیشید



۴- از طریق انسان: انسان‌ها ضمن عبور از مزرعه‌ای به مزرعه دیگر، ممکن است بذرهای علفهای هرز با توجه به چسبیدن آنها به لباس، کفش و یا دیگر وسایل همراه او، منتقل شوند(شکل ۴۶).



شکل ۴۶- بذر های چسبیده به کفش و لباس انسان

در منطقه یا هنرستان شما بذر کدام علفهای هرز از طریق فرو رفتن در کفش و یا چسبیدن به لباس، منتشر می‌شوند؟

بیندیشید



## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی



شکل ۴۷- انتقال بذر علفهای هرز با بذر گیاه اصلی

۵- از طریق بذر گیاه اصلی: این روش یکی از رایج ترین و مهم ترین روش انتقال بذر علفهای هرز می‌باشد. زیرا هرساله میلیون‌ها تن بذر گیاهی در سطح جهانی جابجا می‌شود(شکل ۴۷).

۶- از طریق کودهای دامی تازه: مصرف کودهای دامی، به صورت تازه یا نپوسیده، یکی از عوامل مهم انتشار بذرهای علفهای هرز به شمار می‌آید.

### فعالیت



بررسی اثر کودهای تازه و پوسیده بر مقدار علفهای هرز مزرعه

ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز: کود دامی پوسیده، کود دامی تازه، فرغون، بیل، امکانات ثبت و ضبط اقدامات مراحل انجام کار:

۱- حدود ۱۰ مترمربع از زمین مزرعه را انتخاب کنید.

۲- در قطعه انتخابی ۶ عدد کرت یک مترمربعی ایجاد کنید.

۳- یک فرغون کود تازه و یک فرغون کود پوسیده یا فراوری شده، فراهم کنید.

۴- در ۳ کرت کود تازه و در ۳ کرت دیگر کود پوسیده پخش کنید.

نوع کود برای هر کرت به صورت تصادفی تعیین گردد.  
مقدار مصرف کود در تمام کرتهای به یک اندازه و کیفیت باشد.



۵- کودها را در یک زمان و به روش یکسانی با استفاده از بیل، زیر خاک کنید.

۶- در تمام کرتهای در یک زمان مشخص اقدام به کاشت یک نوع بذر نمایید.

۷- همه کرتهای را در یک زمان، به یک مقدار و به روش یکسان آبیاری نمایید.

۸- سایر عملیات مراقبتی را بطور یکسان انجام دهید تا گیاه زراعی و علفهای هرز جوانه زده و رشد نمایند.

۹- میزان رشد و تراکم محصول اصلی و علفهای هرز را به روشی که هنرآموز تعیین می‌کند، اندازه‌گیری و مقایسه کنید.

۱۰- مشاهدات، یافته‌ها و تحلیل خود را در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و برای ارایه آماده نمایید.



از چه روش‌های دیگری ممکن است بذر علف‌های هرز جابجا یا منتشر شوند؟ در پژوهش خود ضمن استفاده از منابع علمی معتبر، از کارشناسان و کشاورزان خبره محلی کمک بگیرید.

## ارزشیابی مرحله‌ای

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهی)	نمره
۱	تعیین انواع علوفه‌ای هرز	ابزار: بیل یا بیلچه، تخته پرس، روزنامه باطله – مکان: مزرعه و آزمایشگاه	بالاتر از حد انتظار	نمونه علوفه‌ای هرز را تهیه کرده و از نظر مدت زندگی، نوع زندگی و شکل برگ دسته بندی کند. و چگونگی گسترش و تکثیر آنها را تحلیل نماید.	۳
۲	تعیین انواع علوفه‌ای هرز	ابزار: بیل یا بیلچه، تخته پرس، روزنامه باطله – مکان: مزرعه و آزمایشگاه	در حد انتظار	نمونه علوفه‌ای هرز را تهیه کرده و از نظر مدت زندگی، نوع زندگی و شکل برگ دسته بندی کند.	۲
			پایین‌تر از حد انتظار	عدم تهیه نمونه یا دسته بندی علوفه‌ای هرز	۱

## پیشگیری و کنترل علوفه‌ای هرز

عملیاتی که برای محدود ساختن رشد و انتشار علوفه‌ای هرز به کار گرفته می‌شوند به سه دسته عمومی تقسیم می‌گردند:

(الف) پیشگیری، (ب) ریشه کنی، (پ) کنترل

(الف) پیشگیری: عملیاتی است که در مقابل ورود و استقرار علوفه‌ای هرز صورت می‌گیرد.

(ب) ریشه کنی: ریشه کنی علوفه‌ای هرز به معنی نابود کردن یا پاکسازی کامل منطقه از وجود علوفه‌ای هرز

می‌باشد؛ به طوری که از آن به بعد گونه مزبور در آن ناحیه سیز نشود، مگر آنکه دوباره به آن منطقه وارد گردد.

این روش از نظر زراعی غیر ممکن و از نظر اکولوژیکی غیر مطلوب می‌باشد.

(پ) کنترل: روشی است که از میزان آلودگی و خسارت علوفه‌ای هرز می‌کاهد ولی آنها را ریشه کن نمی‌نماید.


به عبارت دیگر با عملیات کنترلی، جمعیت علوفه‌ای هرز در مزارع به حدی پایین آورده می‌شود که ضرر

اقتصادی نداشته باشند. این روش با مبانی حفاظت از محیط زیست و کشاورزی پایدار سازگار است. کنترل

علوفه‌ای هرز به روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد برخی از روش‌های کنترلی عبارتند از: اقدامات زراعی،

مکانیکی، فیزیکی، بیولوژیکی، شیمیایی و ... .

## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی



شکل ۴۸- بذر عاری از علف هرز

پیشگیری از ورود علفهای هرز به مزرعه پیشگیری بدین معنی است که از آلوده شدن یک یا چند ناحیه جغرافیایی توسط یک علف هرز و یا افراش جمعیت آن در یک مزرعه جلوگیری به عمل آید. در اجرای یک برنامه پیشگیری به نکات زیر باید توجه داشت:

(الف) استفاده از بذرهای بدون بذر علفهای هرز یا بذر بوجاری شده(شکل ۴۸).

(ب) حذف علفهای هرز مزارع قبل از به گل رفتن و تولید بذر

(پ) پاکسازی نهرهای آبیاری از وجود علفهای هرز قبل از به گل رفتن آنها  
ت) جلوگیری از ورود افراد، احشام، ابزار و ماشینهای مشکوک به آلوده بودن به بذر یا اندامهای تکثیر شونده علفهای هرز

## کنترل زراعی علفهای هرز

در کاربست مدیریت صحیح زراعی، روش‌های زیر برای کنترل رشد علفهای هرز، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(الف) یخ آب زمستانه

یخ آب در مناطقی با زمستانهای سرد می‌تواند باعث کاهش جمعیت علفهای هرز گردد زیرا بذرهایی که آب جذب نموده‌اند، با یخ بستن از بین می‌روند.

(ب) اجرای تناوب زراعی

با اجرای تناوب یا چرخه زراعی، علفهای هرزی که در زراعتهای خاصی مثلًا چغندر قند رویش می‌نمایند، مهار خواهند شد(شکل ۴۹).



شکل ۴۹- چرخه یا تناوب زراعی

**پ) اجرای آیش و انجام عملیات داشت در مرحله آیش**  
شخم سطحی و چرای مدیریت شده و ... در زمان آیش باعث کاهش مواد اندوخته‌ای در ریشه و اندام‌های هوایی علف‌های هرز می‌شود. به این ترتیب بخشی از علف هرز به دلیل کمی مواد ذخیره‌ای قادر به سبز شدن در فصل رویش نخواهد بود.



شکل ۵۰- گندم با رشد سریع خود علف‌های هرز را کنترل می‌کند.

**ت) کاشت گیاهان سریع الرشد یا خفه کننده**

این گیاهان با رشد سریع خود، از علف‌های هرز پیشی گرفته و آن را زیر سایه خود قرار می‌دهند. در نتیجه باعث محدود کردن رشد یا خفه کردن علف‌های هرز می‌شوند. جو یکی از بهترین گیاهان خفه کننده است(شکل ۵۰).

**ث) استفاده از مالچ**

مالچ یک کلمه انگلیسی و به معنی پوشش سطح زمین است. به عبارت دیگر می‌توان پوشش غیر زنده‌ای نامید که گیاهان را در برابر تغییر دمای شدید خاک، از دست رفتن آب زمین، محافظت می‌کند و نیز جلوی رشد علف‌های هرز را می‌گیرد (شکل ۵۱).

**ج) چرای علف‌های هرز توسط احشام، قبل از گل‌دهی**

چرای علف‌های هرز توسط احشام، قبل از گل‌دهی، موجب قطع اندام‌های فوقانی و زایشی علف‌های هرز می‌شود و از تکمیل چرخه زندگی و به وجود آمدن بذر جلوگیری می‌کند.

**چ) تنظیم تاریخ کاشت**

برای هر گیاه زراعی و علف هرز، محدوده زمانی مشخصی برای جوانه زنی بهینه و رشد مطلوب وجود دارد. تنظیم زمان کاشت (زوودتر یا دیرتر) در این محدوده می‌تواند در مقابله با عوامل زیان آور از جمله علف‌های هرز بسیار مؤثر باشد. این ساز و کار در زراعت پنبه، چغندر قندو ...، کاملاً رایج است(شکل ۵۲).



شکل ۵۲- جوانهزنی و قدکشیدن در کشت زود هنگام و بهنگام بیشتر است.



شکل ۵۱- استفاده از مالچ پلاستیکی جهت کنترل علف‌های هرز

## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی



شکل ۵۳- کاشت نشا، روشی برای غلبه بر علفهای هرز

تغییر روش کاشت: استفاده از روش‌هایی مانند کشت تأخیری و ماخار(اجرای شخم پس از رویش علفهای هرز) که جمعیت علفهرز را کاهش می‌دهد یا کشت نشاء به جای بذرکاری که گیاه اصلی را بر علفهرز مسلط می‌سازد(شکل ۵۳).

### فعالیت



#### بررسی اثر شخم در کنترل علفهای هرز

ابزار، مواد و امکانات موردنیاز: لباس و کفش مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی، تراکتور، گاوآهن برگرداندار، زمین زراعی دارای شرایط مناسب (وجود علف هرز، گاو رو بودن)، امکانات نوشتاری و تصویر برداری.

#### مراحل انجام کار:

۱- یک قطعه زمین زراعی را با تأیید هنرآموز انتخاب کنید.

زمین دارای مساحت مناسب، علف هرز کافی، خاک گاور و موقعیت مطلوب باشد.  
این ویژگی‌ها باید به تأیید هنرآموز برسد.



۲- همراه هنرآموز خود به واحد ماشین‌های کشاورزی وارد شوید.

۳- یک دستگاه تراکتور تحویل گرفته و پس از آطمینان از سلامتی ماشین، آن را روشن کنید.

۴- یک دستگاه گاوآهن برگرداندار را با رعایت نکات ایمنی و فنی، به تراکتور متصل کرده و تنظیمات اولیه را انجام دهید.

دقت کنید: تراکتور حامل گاوآهن توسط فرد صاحب صلاحیت به زمین انتخاب شده، هدایت گردد.

۵- نیمی از زمین انتخابی را شخم بزنید.

۶- بیست روز بعد، علفهای هرز موجود در نیمه شخم خورده و نیمه شخم نخورده (شاهد)، مقایسه کنید.

۷- تفاوت‌هایی که از نظر تعداد، نوع و میزان رشد علفهای هرز در دو قطعه مشاهده می‌کنید را ثبت و ضبط و آماده ارایه نمایید.

چنانچه اجرای عملیات در سطح وسیع مقدور نبود، در سطح چند کرت کوچک و انجام شخم با بیل این عملیات انجام شود.



## کنترل بیولوژیکی علفهای هرز

هر موجود زنده‌ای که بتواند بدون آسیب به گیاه اصلی، مانع از رشد یا تکثیر علفهای هرز گردد، یا آنها را کاهش دهد، دشمن طبیعی یا عامل بیولوژیکی در کنترل علفهای هرز، نامیده می‌شود. علفهای هرز دشمنان طبیعی زیادی دارند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: حشرات، قارچ‌ها، ویروس‌ها، حلزون‌ها و مهره‌دارانی مثل ماهی، اردک، غاز و گوسفند. این روش بر خلاف روش شیمیایی با محیط زیست سازگاری داشته و تاکنون موفقیت زیادی داشته است.

طی سال‌های اخیر بیش از ۴۰ گونه علف هرز با استفاده از عوامل بیولوژیکی، کنترل شده‌اند. اما نقش قارچ‌ها بیش از سایر عوامل کنترل کننده بوده است (شکل ۵۴).



شکل ۵۴- کنترل بیولوژیک گل راعی توسط نوعی سوسک

## - کنترل مکانیکی علفهای هرز

(الف) وجین یا کندن علفهای هرز با دست (به‌وسیله شفره، بیل و بیلچه): از آن جایی که وجین با دست هزینه کارگری بالایی دارد، معمولاً در مزارع بزرگ انجام نمی‌شود، زیرا صرفه اقتصادی ندارد اما در مزارع کوچک، بیشترین کاربرد را دارد.

روش کار با ابزارهای دستی وجین را در سال گذشته آموختید.



## وجین با ابزار دستی

ابزار، وسایل و امکانات مورد نیاز: لباس و کفش مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی، ابزار دستی وجین(بیلچه، شفره، داسک یا راهکارد، بیل، کج بیل).

### مراحل انجام کار:

- ۱- بخشی از مزرعه را با شرایط مناسب از نظر رطوبت خاک، رشد علف هرز، رشد گیاه اصلی و ... انتخاب کرده و به تأیید هنرآموز برسانید.
- ۲- علفهای هرز خیلی نزدیک به بوته اصلی را با احتیاط و مراقبت، با دست از زمین خارج و یا از زیر طوقه قطع کنید(شکل ۵۵).
- ۳- علفهای هرز بین بوته‌ها را با ابزار دسته کوتاه(شفره، اره کارد، بیلچه) از زیر طوقه قطع یا از زمین خارج کنید(شکل ۵۶).



شکل ۵۶- وجین با ابزار کوچک دستی: داسک (سمت راست) و شفره (سمت چپ)

شکل ۵۵- وجین علف هرز با دست



شکل ۵۷- کنترل مکانیکی علفهای هرز بین ردیفها با بیل

۴- علفهای هرز بین ردیف و فواصل زیاد گیاهان را با ابزار دسته بلند (بیل، کج بیل) از زیر طوقه قطع و از زمین خارج کنید(شکل ۵۷).

**ب) کنترل مکانیزه علفهای هرز:** در مزارع بزرگ از انواع ماشین‌ها استفاده می‌شود. این ماشین‌ها به پشت تراکتور یا تیلر متصل می‌گردند و ضمن سله‌شکنی، بخش عمده‌ای از علفهای هرز به خصوص علفهای هرز روئیده در داخل جویچه‌ها و یال پشت‌های زراعت‌های ردیفی را حذف می‌نمایند.



## حذف علف‌های هرز توسط ماشین کولتیواتور ستاره‌ای (پنجه‌ای)

ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز: لباس و کفش مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی، جعبه ابزار مکانیک عمومی، جعبه

کمک‌های اولیه، تراکتور و کولتیواتور پنجه‌ای

### مراحل انجام کار:

- ۱- همراه هنرآموز به محل نگهداری کولتیواتور داشت در واحد ماشین‌های کشاورزی وارد شوید.
- ۲- اجزای ماشین را بررسی و آماده بکار نمایید.
- ۳- تراکتور را پس از بررسی‌های اولیه، روشن کرده و کولتیواتور را به آن متصل و تنظیم‌های اولیه را انجام دهید.
- ۴- تراکتور حامل کولتیواتور را در سر مزرعه از راننده تراکتور تحويل بگیرید.
- ۵- به ترتیبی وارد مزرعه شوید که چرخ‌های تراکتور در بین ردیف‌ها قرار گیرد و به گیاه اصلی صدمه ای وارد نگردد.
- ۶- تنظیم کولتیواتور را بررسی کرده تا از منطبق بودن چرخ‌ها با جوی‌ها، واحدهای عمل کننده با کف جوی و به ویژه یال پشت‌ها مطمئن شوید.
- ۷- از ابتدای یک سوی مزرعه شروع بکار کرده، اقدام به سله‌شکنی و وجین نمایید(شکل ۵۸).
- ۸- توضیحات هنرآموز، مشاهدات، یافته‌ها و عملکرد خود را در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و برای ارایه آماده نمایید.



شکل ۵۸- اجرای کولتیواتور مزرعه (سله شکنی، وجین، خاکدهی پای بوته)

## کنترل فیزیکی علف‌های هرز

برای کنترل فیزیکی علف‌های هرز، از گرما، آتش، مدیریت آب و آفت‌ابدی خاک استفاده می‌شود. (شکل ۵۹) از شعله‌افکن در حاشیه مزارع، بستر و حاشیه نهرها و زمین‌های آیش و نیز به صورت موضعی در مزارع آلوده به سیس، به ویژه در زراعت یونجه البته در دوره رکود نیز استفاده می‌شود.

در استفاده از شعله‌افکن باید توجه داشت که این وسیله فقط قسمت‌های هوایی علف هرز را، که از خاک بیرون است، می‌سوزاند و ریشه‌ها، ریزوم‌ها و قسمت‌های زیرزمینی را از بین نمی‌برد. بنابراین ممکن است ریشه‌ها دوباره جوانه بزنند و سیز شوند.

## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی



شکل ۵۹- کنترل علفهای هرز با استفاده از شعله افکن پشت تراکتوری

### فعالیت



#### کنترل علفهای هرز با استفاده از شعله افکن

ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز: لباس و کفش مناسب کار، دستکش، شعله افکن پشتی موتوری (اتومایزر)، مواد سوختی (نفت یا گازوئیل)، کبریت یا فندک، جعبه کمک های اولیه، دستورالعمل ماشین در مورد این نوع کاربرد.

#### مراحل انجام کار:

- ۱- شعله افکن پشتی موتوری (اتومایزر) را از انبار تحویل بگیرید.
- ۲- دستگاه را بازدید و آماده به کار نمایید.
- ۳- مخزن سم دستگاه را تخلیه و شستشو نمایید.
- ۴- مخزن را از مواد سوختی (نفت یا گازوئیل) پر کنید.
- ۵- شعله افکن را با احتیاط به محل مورد نظر حمل نمایید.

#### دقت کنید:

سر کلاهک آهنی را گرم کنید تا سوخت به راحتی به بخار تبدیل و مشتعل شود.

- ۶- با کشیدن هندل، دستگاه را روشن کنید.

۷- گاز دستگاه را به میزان مورد نیاز تنظیم نمایید.

- ۸- دستگاه را به آرامی و با احتیاط به پشت خود بیندید.

۹- با گرفتن فندک به سرشعله، دستگاه را روشن کنید.

- ۱۰- حاشیه مزرعه و نهرهای آلوده به علف هرز را با احتیاط شعله افکنی نمایید(شکل ۶۰).

- ۱۱- مشاهدات، یافته ها و عملکرد خود را در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و برای ارایه آماده نمایید.



شکل ۶۰- استفاده از شعله افکن پشتی موتوری (اتومایزر) جهت شعله افکنی در کنترل فیزیکی علفهای هرز

دقت کنید: در هنگام کار از خود و محصول اصلی، به دقت موازنیت نمایید تا موجب سوختگی و خسارت نشود.

## ارزشیابی مرحله‌ای

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهی)	نمره
۳	کنترل مکانیکی و فیزیکی علف‌های هرز	تراکتور، کولتیواتور، سمپاش اتومایزر، مزرعه	بالاتر از حد انتظار	پس از تعیین زمان کنترل علف‌های هرز (گاورو بودن و مرحله رشد گیاه) با استفاده از وسایلی مانند کولتیواتور و سمپاش اتومایزر به روش‌های مکانیکی و فیزیکی علف‌های هرز را کنترل کند و روش‌های پیشگیری و کنترل زراعی علف‌های هرز را تجزیه و تحلیل نماید.	
۲			در حد انتظار	پس از تعیین زمان کنترل علف‌های هرز (گاورو بودن و مرحله رشد گیاه) با استفاده از وسایلی مانند کولتیواتور و سمپاش اتومایزر به روش‌های مکانیکی و فیزیکی علف‌های هرز را کنترل کند.	
۱			پایین‌تر از حد انتظار	انجام ندادن عملیات کنترل علف‌های هرز به روش مکانیکی یا فیزیکی	

## کنترل شیمیایی علف‌های هرز

**علف‌کش:** علف‌کش‌ها ترکیبات شیمیایی هستند که برای از بین بردن علف‌های هرز در مزرعه از آنها استفاده می‌شود. مواد شیمیایی ممکن است روی مصرف کننده محصولات، اثرات یا عوارضی داشته باشد. بنابراین بایستی ضمن استفاده کمتر از این روش، بین زمان سمپاشی و مصرف محصول، فاصله زمانی تعیین شده را رعایت نمود. این فاصله را دوره کارنس می‌گویند. به عبارت دیگر دوره کارنس، عبارت از حداقل زمانی است که بین سمپاشی و استفاده از محصول باید رعایت گردد. در این مدت علف‌کش تجزیه شده و باقیمانده آن به حد مجاز می‌رسد. این مدت، در سه مدل مختلف متفاوت است. برای مثال علف‌کش بنتازون، دوره کارنس شش هفته‌ای و گالانت دوره کارنس چهار هفتاهی دارد.

### تقسیم‌بندی علف‌کش‌ها از نظر تأثیر

(الف) علف‌کش‌های عمومی (غیرانتخابی): ترکیباتی هستند که همه نوع گیاه، اعم از محصول اصلی و علف هرز را از بین می‌برند. بنابراین هنگام استفاده از آنها باید مراقب بود که با گیاه اصلی تماس پیدا نکنند، مانند رانداب (گلایفوزیت) و پاراکوات (گراماکسون).

(ب) علف‌کش‌های انتخابی: ترکیباتی هستند که روی علف یا علف‌های هرز خاصی مؤثر هستند و آن‌ها را کنترل می‌کنند. یا این که بجز گیاه اصلی، تعدادی یا تمام گیاهان هرز را از بین می‌برند. بنابر این بر حسب نوع توصیه، مصرف آن‌ها روی گیاه مشکلی ندارد. نمونه این نوع علف‌کش‌ها عبارتند از: ترفلان، تو فوردی برای کنترل پهنه برگ‌ها در زراعت گیاهان باریک برگ و نابواس برای کنترل باریک برگ‌ها در زراعت گیاهان پهنه برگ است.

### تقسیم بندی علفکش‌ها از نظر طرز عمل

(الف) **علفکش‌های تماسی**: ترکیباتی هستند که پس از تماس با قسمت هوایی گیاه در آنها ایجاد سوختگی می‌نمایند. تأثیر این سوموم، مخصوصاً در موقعی که گیاهان مرطوب نباشند، به مراتب بیشتر است، مانند دینوسب و پاراکوات (گراماکسون).

(ب) **علفکش‌های سیستمیک (جدبی)**: علفکش‌هایی هستند که پس از پاشیده شدن روی قسمتی از گیاه، جذب گیاه شده و با جریان یافتن در آوندها، به تمام قسمت‌های گیاه می‌رسند، مانند راندپ (گلایفوزیت)، که از طریق برگ‌ها و تی‌سی‌آ که از طریق ریشه، وارد گیاه می‌شود.

### تقسیم بندی علفکش‌ها براساس زمان مصرف

(الف) **علفکش‌های قبل از کاشت**: این علفکش‌ها قبل از کاشت، به منظور پیشگیری از جوانه زدن بذر علفهای هرز داخل زمین به کار می‌روند و تأثیر فوری دارند، مانند آلاکلر، رونیت و ترفلان (تری‌فلورالین).

علفکش‌های قبل از کاشت، زمانی تأثیر خواهند داشت که خاک دارای رطوبت مناسب باشد.



(ب) **علفکش‌های قبل از سبز شدن**: این علفکش‌ها بعد از کاشت و قبل از رویش گیاه اصلی، مصرف می‌شوند. در نتیجه، علفهای هرز روییده در این فاصله زمانی را از بین می‌برند. این دسته از سوموم در مورد گیاهانی که جوانه زدن آنها کُند است (مانند پنبه، پیاز، جعفری) استفاده می‌گردد. وضعیت خاک در زمان سمپاشی با این سوموم باید دارای رطوبت مناسب باشد.

در زمین‌های خشک، علفکش‌ها قبل از سبز شدن، تأثیر رضایتبخشی روی علفهای هرز سبز شده ندارند.



(پ) **علفکش‌های پس از سبز شدن**: از این علفکش‌ها پس از سبز شدن مزرعه، یعنی هنگامی که محصول اصلی در مزرعه در حال رشد و نمو می‌باشد، استفاده می‌شود، مانند تو فوردی.



## توصیه‌های ضروری در کاربرد علفکش‌ها

- ۱- استفاده درست از علفکش‌ها نیاز به دانش و مهارت کافی دارد، بنابراین کار با آنها صرفاً زمانی ممکن است که شایستگی و گواهی مربوطه کسب شده باشد. علاوه بر آن سعی کنید سطح اجرا را در ابتداء خیلی کم در نظر بگیرید، سپس در صورتی که تجربه کافی و نتایج مطلوب به دست آورده باشد تدریج سطح عمل را افزایش دهید.
- ۲- قبل از مصرف هر نوع علفکش در هر نوع زراعت، برچسب و بروشور آن را به دقت مطالعه و به موارد توصیه شده را عمل نموده و از کاربرد علفکش‌ها در موارد توصیه نشده خودداری نمایید.
- ۳- علفکش‌ها و به طور کلی سموم را فقط در ظروف اصلی آن‌ها به مصرف برسانید، مخصوصاً توجه داشته باشید که قبیل از مصرف حتماً برچسب روی ظرف را به دقت مطالعه کنید تا اسم را اشتباهآیا به غلط مصرف ننمایید.
- ۴- از مصرف سmom کهنه، خصوصاً اگر در شرایط نامطلوب نیز نگهداری شده باشد، خودداری کنید.
- ۵- در انتخاب درست نازل (افشانک)، فشار پمپ سمپاش و سرعت حرکت در شرایط مزرعه، به منظور پاشش یکنواخت حجم معینی از محلول سم، متناسب با سطح مورد سمپاشی، از اهمیت زیادی برخوردار است.
- ۶- از مخلوط کردن علفکش‌ها با یکدیگر به جز در موارد توصیه شده در بروشورهای فنی یا منابع علمی خودداری کنید.
- ۷- از به کاربردن یک نوع علفکش برای چند سال متوالی در مزرعه یا باغ خودداری کنید، زیرا ممکن است مشکلاتی نظیر افزایش جمعیت گونه‌های خاصی از علفهای هرز، به وجود آمدن انواع علفهای هرز مقاوم به علفکش‌ها یا محدودیت کشت محصولات بعدی را به وجود آورد.
- ۸- در هنگام وزش باد، خصوصاً در مورد علفکش‌های هورمونی مثل توفوردی از انجام سمپاشی جداً خودداری نمایید.
- ۹- در هنگام مصرف علفکش‌ها، بر رعایت موازین احتیاطی در هنگام سمپاشی و شناخت پادزهرها و مراجعه فوری به پزشک، در صورت هرگونه ناراحتی و مسمومیت، توصیه و بر آن تأکید می‌شود.
- ۱۰- میزان موفقیت در استفاده از علفکش بستگی زیادی به دانش، آگاهی، تجربه، مهارت و دقت و توجه کشاورز دارد تا بتواند از حداقل میزان سم مصرفی حداکثر استفاده را با کمترین عوارض سوء جنبی به عمل آورد.
- ۱۱- از بو کردن سموم بپرهیزید.
- ۱۲- در هنگام سمپاشی از خوردن و آشامیدن خودداری کنید.

## وسایل ایمنی سمپاشی

- الف) لباس کار مناسب ب) دستکش لاستیکی بدون سوراخ پ) کلاه ضد آب با لبه پهن ت) ماسک تنفسی فیلتردار ث) چکمه‌های پلاستیکی تا زیر زانو ج) عینک مخصوص (شکل ۶۱).

## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی



شکل ۶۱- وسایل و امکانات ایمنی جهت سمپاشی

ایمنی

نکات ایمنی بعد از سمپاشی

- ۱- بعد از سمپاشی استحمام کرده و لباس خود را تعویض کنید.
- ۲- از ظروف خالی سم دوباره استفاده نکنید.
- ۳- ظروف خالی سم را از محدوده زمین زراعی و نهر آب دور نمایید.
- ۴- پس از سم اشی مخزن سمپاش و لوله‌ها را با مواد قلیایی مانند پودر لباس‌شویی بشویید.



## نوع مسمومیت و علائم آن

تنفسی: سوزش، سرفه، خفگی و تنگی نفس

گوارشی: تهوع، استفراغ و اسهال

کلیوی: درد و اختلال در میزان اوره

عصبی: سردرد، سرگیجه، اختلالات رفتاری، افسردگی و تشنجات اغمای

خونی: کم خونی، خستگی و ضعف

پوستی: خارش، سرخی، تورم پوست و چشم

دستگاه تولید مثل: ناباروری و سقط جنین



### نقش عامل رطوبت در تأثیر علف‌کش

ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز: لباس و کفش مناسب کار، دستکش، سمتپاش پشتی موتوری (اتومایزر)، قطعه زمین زراعی، پیمانه‌های مختلف، علف‌کش‌های قبل از کاشت و آب.

#### مراحل انجام کار:

- ۱-قطعه زمین خشکی را به مساحت حدود دو مترمربع انتخاب کنید.
- ۲-زمین را به دو قسمت مساوی تقسیم نمایید.
- ۳-یک قسمت را آبیاری نموده و پس از گاورو شدن با علف‌کش‌های قبل از کاشت، محلول‌پاشی کنید.
- ۴-قطعه دوم را بدون آبیاری با همان علف‌کش، محلول‌پاشی نمایید.
- ۵-هر دو قطعه را با شن‌کش بهم بزنید تا سم با خاک سطحی مخلوط شود.
- ۶-پس از دو هفته، میزان رشد و تراکم علف‌های هرز را در دو قطعه، مقایسه کنید.
- ۷-ارتباط وجود رطوبت در خاک با تأثیر علف‌کش بر روی علف‌های هرز را بررسی کنید.
- ۸-مشاهدات، یافته‌ها و عملکرد خود را در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و برای ارایه آماده نمایید.

## اهمیت کاربرد تلفیقی انواع روش‌های کنترل علف‌های هرز

استفاده از دو یا چند روش برای علف‌های هرز را مدیریت تلفیقی علف‌های هرز می‌گویند. مدیریت تلفیقی علف‌های هرز ترکیبی از روش‌های زراعی، مکانیکی، فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی است. به عنوان مثال، استفاده کمتر از علف‌کش همراه با شخم، تلفیق مناسبی برای بهبود کنترل علف هرز است.

معمولًاً هیچ روشی نمی‌تواند به تنها ی سطح قابل قبولی از کنترل علف‌های هرز را فراهم کند. با تلفیق روش‌ها می‌توان استفاده از علف‌کش‌ها را کاهش داد.

هدف مدیریت تلفیقی علف‌های هرز متوقف کردن تراکم علف‌های هرز در سطح قابل قبول است. به این سطح (آستانه زیان اقتصادی) می‌گویند.

کنترل علف‌های هرز با یک روش خاص این امکان را به علف‌های هرز می‌دهد که بعد از چند سال خود را با این روش‌ها سازگار کرده و مقاوم شوند و همچنان مزاحم محصول باشند ولی ترکیب مجموعه‌ای از روش‌های کنترل این امکان را از آنها سلب خواهد نمود.

در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز، اصراری بر استفاده توأم و مداوم پنج روش بالا نیست بلکه یک مدیر باید بر اساس شرایط موجود، ترکیب مناسبی از این روش‌ها را به کار ببرد (شکل ۶۲).

## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی

پژوهش



در شکل ۶۲ IWM مخفف چه واژگانی بوده و مفهوم کلی آنها چیست؟



شکل ۶۲- کنترل تلفیقی علفهای هرز

فعالیت



### زمان مناسب مصرف علفکش

ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز: لباس و کفش مناسب کار، دستکش، ماسک، عینک، سمپاش پشتی موتوری (اتومایزر)، قطعه زمین زراعی، پیمانه‌های مختلف، علفکش‌های انتخابی و آب  
مراحل انجام کار:

- ۱- با رعایت اصول مراقبت از گیاه اصلی همراه هنرآموز، وارد مزرعه شوید.
  - ۲- قطعه‌ای از مزرعه در حال رویش را در مرحله‌ای که علفهای هرز آن، دو تا چهاربرگی هستند، انتخاب کنید.
  - ۳- قطعه دوم را به ترتیب انتخاب کنید که علفهای هرز آن، در مرحله ۱۰-۱۲ برگی باشند.
- دقت کنید: مساحت دوقطعه، نوع و غلظت سم، روش و شرایط (دما محیط) سم پاشی، نوع علفهای هرز دو قطعه، یکسان باشد.
- ۴- هر دو قطعه را با رعایت اصول بهداشتی و ایمنی با علفکش انتخابی مورد تأیید هنرآموز خود، سم پاشی نمایید.
  - ۵- پس از گذشت بیست روز، عملکرد سم را در قطعات سم پاشی شده، بررسی کنید.
  - ۶- نتیجه تأثیر علفکش روی علفهای هرز را در دو قطعه با هم مقایسه کنید.
  - ۷- مشاهدات و نتایج حاصله را به صورت یک گزارش کار، آماده کرده و در کلاس ارائه دهید.

## آشنایی با انواع سمپاش‌ها

چنانکه در فصل اول مطالعه کردید، سمپاش‌ها انواع مختلفی دارند. ضمن نمایش عکس برخی از انواع رایج (شکل ۶۳)، در این فصل به سمپاش پشت تراکتوری می‌پردازیم.



سمپاش کتابی پشتی اهرمی



سمپاش استوانه‌ای پشتی ساده



سمپاش موتوری پشتی لانس دار



سمپاش موتوری پشتی اتومایزر



سمپاش موتوری چرخ دار (فرغونی)

شکل ۶۳- برخی از انواع سمپاش‌های رایج کشور

سمپاش پشت تراکتوری بومدار: این سمپاش دارای یک شاسی است که مخزن ۴۰۰ لیتری، پمپ، بوم و سایر ضمایم بر آن سوار شده است. فشار در این سمپاش کم و ۲ تا ۴ بار است. در قسمت پشت سمپاش در روی شاسی، بوم نصب می‌شود. طول بوم مورد استفاده در ایران معمولاً ۸ متر است. پس از نصب سمپاش در پشت تراکتور می‌توان با سرعت ۱۲-۱۴ کیلومتر در ساعت در سطح مزروعه حرکت کرده و سمپاشی نمود. واسنجی این دستگاه، هم از اصول و مراحل کار سمپاش بوده با این تفاوت که بر حسب نوع نازل، برابر جدول نصب شده روی دستگاه فشار آن نیز باید تنظیم و در واسنجی داده شود.

## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی

از این نوع سمپاش در ایران برای مبارزه با علفهای هرز مزارع بزرگ استفاده می‌شود(شکل ۶۴).



شکل ۶۴- سمپاش پشت تراکتوری بوم دار در نمای پشت(چپ) و جلو(راست)

### نکات ایمنی در به کار گیری سمپاش ها



- ۱- استفاده از لباس کار مناسب شامل دستکش، کلاه، ماسک، لباس یکسره ضد مواد شیمیایی و کفش کار الزامی است.
- ۲- درب دریچه ریختن سم به مخزن باید کاملاً آب بندی باشد و در اثر حرکت و تکان، محلول از آن خارج نشود.
- ۳- سم را قبل از ریختن در مخزن با آب مخلوط نمایید و سپس با استفاده از صافی دریچه، آن را در مخزن بریزید.
- ۴- محلول سم در مخزن باید کاملاً به هم زده شود و یکنواخت باشد. ماشین، خود همزن دارد لذا ساز و کار همزنی باید در حین عملیات سمپاشی به کار انداخته شود و محلول مدام به هم زده شود. در غیر این صورت ممکن است محلول به صورت غیر یکنواخت در مزرعه پاشیده شود؛ یعنی در قسمتی غلظت سم کم و در قسمتی دیگر زیاد باشد و یا این که در اثر انسداد مجرای (بهویژه در محلول هایی که با گردهای سمی درست می شود) کار پاشش با مشکل مواجه شود.
- ۵- در هنگام سمپاشی، همانند شعله افکن، در خلاف جهت باد حرکت نکنید. جهت باد باید ذرات سم و شعله را از شما دور کند.
- ۶- در هوای طوفانی و هنگام وزش باد نباید سمپاشی نمود. زیرا در این حالت ذرات سم بر روی شاخ و برگ درختان نمی نشینند و خطر مسمومیت هم برای کاربر ماشین سمپاش پیش می آید.
- ۷- از چکه کردن محلول سم از هر قسمت سمپاش که باشد، باید جلوگیری شود. زیرا چکه کردن ضمن به هدر دادن سم موجب آلودگی محیط زیست هم می شود.
- ۸- کمک های اولیه مربوط به مسمومیت های شیمیایی از راه سموم را یاد بگیرید تا بتوانید در صورت لزوم به فرد مسموم کمک کنید.



## واسنجی و تهیه محلول سمی

وسایل و مواد مورد نیاز: دستگاه سمپاش، دستکش، ماسک، عینک، لباس سمپاشی، علفکش و وسایل اندازه‌گیری حجمی، روغن و روان کنندهای مناسب، جعبه ابزار مکانیک عمومی، صافی‌های مختلف مناسب با نوع دستگاه سمپاش، لوازم یدکی، متر، آب مناسب، جعبه کمک‌های اولیه، پارچه تنظیف.



افشانک



صافی



آچارکشی



شکل ۶۵- برخی از اجزای سمپاش بوم‌دار پشت تراکتوری

### مراحل انجام کار:

- ۱- لباس کار مناسب بپوشید و به تجهیزات ایمنی فردی مجهر شوید.
- ۲- همراه با هنرآموز به واحد ماشین‌های کشاورزی وارد شوید.
- ۳- سمپاش بوم‌دار پشت تراکتوری را بازشناسی کرده و از سلامت اجزای آن:

- مخزن
- لوله‌ها
- شلنگ‌ها
- نازل‌ها(افشانک‌ها)
- صافی‌ها(نازل‌ها، پمپ، درب مخزن)
- اتصالات
- گاردان
- فنرهای ضربه‌گیر
- میزان روغن پمپ

مطمئن شوید(اشکال ۶۵).

برحسب مورد اقدام به تمیز، تعویض، ترمیم نموده یا گزارش نمایید.

- ۴- یک دستگاه تراکتور تحويل گرفته، پس از بررسی‌های اولیه، تنظیم چرخ مناسب به مزرعه مورد سمپاشی، با رعایت اصول فنی و ایمنی آن را روشن کنید.
- ۵- سمپاش را به تراکتور نصب کرده و تنظیمات اولیه را انجام دهید.
- ۶- قبل از واسنجی، با افرودن مقداری آب به مخزن، ضمن تمیز کردن مخزن و مجاری، با ساز و کار عملکرد ماشین آشنا شده و تمرین نمایید.
- ۷- سلامت و نحوه عمل کلیه قسمت‌های دستگاه را وارسی کرده و هرگونه نشتی و غیر یکنواختی در پاشش‌ها را رفع یا گزارش نمایید.

کنترل کنید که فشارسنج به درستی عمل کند و خروجی نازل‌ها، همسان باشد.



- ۸- داخل سمپاش مقدار معینی(مثلا ۴۰ لیتر) آب بریزید.

## کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی

- ۹- این مقدار آب را با فشار ثابت و حرکت یکنواخت روی زمین پخش نمایید.
- ۱۰- خط شروع و خط پایان را تعیین کنید، طول و عرض پاشش را اندازه گیری کرده و مساحت زمین آب پاشی شده را محاسبه نمایید.

با تغییر مقدار فشار، نوع افشانک‌ها و سرعت پیشروی، می‌توانید این سنجش را تکرار و تمرین کنید.



- ۱۱- از روی مقدار آب مصرف شده در مساحت واسنجی، مقدار آب مصرفی در هکتار را بدست آورید.
- ۱۲- میزان سم علف کش جهت سمپاشی در هکتار را از هنرآموز خود بپرسید.
- ۱۳- سمپاش را تا حدود نیمه از آب مناسب پر کنید. علف کش توصیه شده را به مقدار محاسبه شده به آب مخزن اضافه کنید.

پاسخ دهید: اگر مقدار سم علف کش توصیه شده برای یک هکتار ۲ لیتر باشد و مقدار آب مصرفی در هکتار بر اساس واسنجی ۶۰۰ لیتر تعیین گردد، مقدار سم قابل افزایش به مخزن ۴۰۰ لیتری چه مقدار خواهد بود؟

۱۴- ضمن فعال کردن سامانه همزن، بقیه حجم مخزن را از آب مناسب پر کنید.

۱۵- محلول سمی شما به این ترتیب آماده است. برای مصرف آن در مزرعه برنامه ریزی کنید.

### فعالیت



#### صرف علف کش با سمپاش پشت تراکتوری بوم دار

ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز: سم پاش با مخزن پر شده از علف کش توصیه شده و آماده به کار، لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی، جعبه کمک‌های اولیه، مزرعه نیازمند به سم پاشی، جعبه ابزار مکانیک عمومی، پارچه تنظیف.

#### مراحل انجام کار:

- ۱- سمپاش با مخزن پر آماده شده در فعالیت قبلی را در ابتدای مزرعه، تحويل بگیرید.
- ۲- از محل مناسبی وارد مزرعه شده و در مجاور یک ضلع در امتداد ردیفهای کاشت و با فاصله‌ای متناسب با عرض کار بوم‌ها از آن ضلع، مستقر شوید.
- ۳- بوم‌ها را باز کنید. ارتفاع بوم‌ها را تنظیم نمایید.

دقت کنید: به منظور یکنواختی پاشش و همپوشانی مناسب ارتفاع افشانک‌ها از بوته حدود ۵۰ سانتی‌متر در نظر بگیرید. تغییر ارتفاع بوم با استفاده از :

■ اهرم بازوهای هیدرولیک تراکتور

■ جابجایی بوم، با استفاده از روزندهای تعییه شده بر روی شاسی آن

- ۴- شیر برگشت را در وضعیت برگشت کامل قرار دهید و با درگیر کردن محور توانده‌ی اجازه دهید پمپ حدود دو دقیقه کار کند تا عمل اختلاط کامل گردد. سپس محور توانده‌ی را خلاص نمایید.

۵- شیر را در مسیر بوم‌ها قرار داده، فشار برابر یافته واسنجی تنظیم کرده و با درگیر کردن محور توانده‌ی در حالت موتور گرد با همان سرعتی که در واسنجی تعیین گردید، شروع به حرکت کرده و سمپاشی نمایید.

۶- در انتهای مزرعه با خلاص کردن محور توانده‌ی، ضمن متوقف کردن پاشش، دور زده در مجاور ردیف رفت و با فاصله‌ای متناسب با عرض کار بوم، قرار بگیرید. با فعال کردن محور توانده‌ی، برگشت نمایید.

**مراقب باشید:** در همه حال ضمن رعایت اصول ایمنی در سم پاشی، مراقب موجودی مخزن و پاشش یکنواخت نازل‌ها باشید. در صورت لزوم اقدام به اصلاح، رفع گرفتگی و پرکردن مخزن نمایید.

۷- پس از پایان کار سم پاشی، اصول ایمنی مربوط به پایان سم پاشی را بکار بسته و ماشین را پس از تمیز و سرویس کردن، تحویل دهید.

۸- از توضیحات هنر آموز، مشاهدات و یافته‌های خود، گزارش تهیه کرده و برای ارایه آماده نمایید.

### سرویس و نگهداری سمپاش تراکتوری

- بعد از اتمام کار سمپاشی، باقی‌مانده محلول سمی را با رعایت اصول ایمنی پس از سمپاشی، از مخزن تخلیه نمایید. محلول باقی‌مانده را برای مدت کوتاهی (کمتر از یک هفته) می‌توان در ظروف مناسب نگهداری و سپس مصرف نمود.
- مخزن را چندبار با آب تمیز بشویید و چندبار تلمبه یا پمپ را با آب تمیز به کار بیاندازید تا محلول سمی داخل پمپ، شیلنگ‌ها و افشارنک هم تخلیه گردد. فاضلاب حاصل از شستشو نبایستی وارد آب‌های جاری و مزرعه شود.
- اگر برای مدت طولانی از سمپاش استفاده نمی‌شود کلیه اجزاء را تا حد امکان باز کرده و خشک نمایید. در صورت لروم و احساس کاهش فشار و دبی سمپاش، تلمبه و پمپ صافی‌ها را بازدید و شستشو دهید. برای شستن کلیه قطعات سمپاش می‌توان از آب داغ ۸۰ درجه و پاک‌کننده‌های معمولی استفاده کرد. نشتی اتصالات را برطرف نمایید.
- در هنگام جمع کردن شیلنگ‌های طویل دقت شود که شیلنگ‌ها خم نشده و نشکند.

### ارزشیابی مرحله‌ای

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهی)	نمره
۳	کنترل شیمیایی علف‌های هرز	زمین زراعی، لباس و کفش مناسب کار، دستکش، سمپاش پشتی موتوری (اتومایزر)، پیمانه‌های مختلف، علف‌کش‌های مختلف، سمپاش، تجهیزات ایمنی فردی، جعبه کمک‌های اولیه، جعبه ابزار	بالاتر از حد انتظار	محلول سم را آماده کند. سمپاش را سرویس و آماده به کار نموده و کالیبره کند. عملیات سمپاشی را به صورت یکنواخت مطابق توصیه کارشناسان انجام دهد. سرویس و نگهداری را پس از سمپاشی انجام دهد. اهمیت کنترل تلفیقی را تجزیه و تحلیل نماید.	
۲		مکانیک عمومی، پارچه تنظیف	در حد انتظار	محلول سم را آماده کند. سمپاش را سرویس و آماده به کار نموده و کالیبره کند. عملیات سمپاشی را به صورت یکنواخت مطابق توصیه کارشناسان انجام دهد. سرویس و نگهداری را پس از سمپاشی انجام دهد.	
۱			پایین‌تر از حد انتظار	عدم تهیه محلول سم یا کالیبره کردن سمپاش	

## ارزشیابی شایستگی کنترل علفهای هرز گیاهان زراعی

**شرح کار:**

۱- مزرعه را پایش نماید. ۲- علفهای هرز را جمع آوری و خشک نماید. علفهای هرز را از جنبه‌های طول مدت زندگی، نوع زندگی و شکل برگ دسته بندی کند. ۳- به روش‌های مکانیکی و فیزیکی علفهای هرز را کنترل کند. ۴- به روش شیمیایی علفهای هرز را کنترل کند. ۵- سرویس و نگهداری تجهیزات را انجام دهد.

**استاندارد عملکرد:**

در شرایط مناسب آب و هوایی مزرعه را مورد پایش قرار دهد. انواع علفهای هرز را دسته بندی کند و پس از تعیین زمان عملیات کنترلی به روش‌های مکانیکی و شیمیایی علفهای هرز مزرعه را کنترل نماید.

**شاخص‌ها:**

۱- علفهای هرز موجود در مزرعه را شناسایی و معرفی کند. ۲- با استفاده از بیل یا بیله علفهای هرز را با قسمتی از ریشه از زمین خارج کند. - نمونه را تمیز کند. - اندام‌های نمونه را گسترده کرده و روی صفحه کاغذ بچسباند. - نمونه را با استفاده از وسایلی مانند روزنامه و تخته پرس خشک کند. - نمونه‌ها را از نظر مدت زندگی، نوع زندگی و شکل برگ دسته بندی کند. ۳- مکانیکی: کولتیواتور را به تراکتور متصل کرده تنظیمات لازم را انجام دهد. - عملیات کنترل را بدون آسیب رساندن به گیاه اصلی با کولتیواتور انجام دهد. - فیزیکی: مخزن سم سمپاش اتومایزر را تخلیه کرده و از مواد سوختی پر کند. - شعله افکن را روشن کرده بدون آسیب رساندن به گیاه اصلی، کنترل علفهای هرز را انجام دهد. ۴- محلول سم را آماده کند. - سمپاش را کالیبره کند. عملیات سمپاشی را به صورت یکنواخت انجام دهد.

**شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:**

شرایط: شرایط جوی بدون نزوالت و بدون وزش باد - مزرعه

ابزار و تجهیزات: تراکتور- سمپاش پشتی - سمپاش بوم دار پشت تراکتوری - گاردان - شعله افکن - زمان سنج - سطل مدرج- ماسک- عینک- لباس سمپاشی

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تعیین انواع علفهای هرز	۱	
۲	کنترل مکانیکی و فیزیکی علفهای هرز	۲	
۳	کنترل شیمیایی علفهای هرز	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: رعایت بهداشت فردی - حفظ محیط زیست			*
میانگین نمرات			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

