

واحد یادگیری ۳

نطفه یابی

آیاتا به حال پی برده اید؟

- ۱ از چه روش هایی برای نطفه یابی تخم مرغ ها استفاده می شود؟
- ۲ چگونه می توان یک دستگاه نطفه یاب ساده ساخت؟
- ۳ آیا می توان از تخم مرغ های کثیف برای جوچه کشی استفاده کرد؟
- ۴ بعد از فرایند نطفه یابی چه اطلاعاتی را باید ثبت کرد؟

هدف از این بخش آماده سازی دستگاه نطفه یاب، تعیین تخم مرغ های نطفه دار، تمیز کردن تخم مرغ های آلوده و ثبت اطلاعات حاصل از آن است. از نطفه سنجی تخم مرغ ها برای شناسایی تخم مرغ های بارور استفاده می کنند. همچنین می تواند برای مشخص کردن اینکه روند باروری تخم مرغ متوقف شده است یا نه، از این دستگاه استفاده شود. روند نطفه سنجی با آشکار سازی داخل یک تخم مرغ مشخص می شود؛ بنابراین شما قادر به دیدن آنچه که در داخل پوسته است، خواهید بود. اگر نطفه داری بالا نباشد بیشتر تخم مرغ هایی که در ماشین جوچه کشی گذاشته شوند به جوچه تبدیل نخواهند شد و دور ریخته شوند. مشخص کردن نطفه داری تخم مرغ اهمیت اقتصادی دارد، زیرا اگر قبل از فساد تخم مرغ بتوان نطفه دار نبودن آن را تشخیص داد می توان آن را در ماشین قرار نداده و در غیر این صورت آنها در ماشین جوچه کشی شروع به فاسد شدن می کنند و در نهایت تخم مرغ های دیگر را با باکتری ها آلوده کرده و ایجاد بوی بسیار بدی نمایند.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که تخم مرغ ها را براساس استاندارد نطفه یابی کنند.

نطفه یابی برای پیگیری چگونگی روند رشد جنین بسیار مفید است. این کار می‌تواند بدون استفاده از نطفه یاب بسیار دشوار باشد. نطفه یاب شامل تاباندن نور به تخمرغ است که اجازه می‌دهد تا شما محتويات آن را ببینید و بررسی کنید که آیا به درستی در حال رشد است یا نه؟



در جوجه‌کشی برخی از تخمرغ‌ها از ابتدا بارور نخواهند بود، در حالی که رشد و توسعه جنین دیگر تخمرغ‌ها ممکن است در طی مراحل جوجه‌کشی متوقف شود. با استفاده از نطفه یاب قادر به شناسایی و حذف تخمرغ‌های نابارور که رشد جنین آنها متوقف شده، در طی فرایند جوجه‌کشی خواهد بود.



تخمرغ آلوده

لازم نیست که تجهیزات نطفه یاب بسیار فانتزی و یا خاص باشند. از تجهیزات نطفه یاب مناسب استفاده کنید. در گذشته این عمل با استفاده از شعله شمع انجام می‌شد. نیاز اصلی برای این کار یک منبع نور روشن (هرچه روشن‌تر بهتر) با قطر کوچک‌تر از تخمرغ مورد بررسی می‌باشد. شما باید بررسی را در یک اتاق بسیار تاریک انجام دهید تا داخل تخمرغ را ببینید.

نطفه‌سنجدی در دو نوع دستی (سنتی) و شانه‌ای (اسکن نوری) موجود است. در نطفه‌سنجدی دستی (سنتی) تخمرغ‌های جوجه‌کشی را یک به یک در روی سوراخ نوری تعییه شده، قرار داده نطفه‌سنجدی می‌شوند؛ در صورتی که در نطفه‌سنجدی شانه‌ای (اسکن نوری) می‌توان ۲۴ یا ۳۶ عدد تخمرغ جوجه‌کشی را به‌طور همزمان نطفه‌سنجدی کرد.



نوربینی (کندلینگ) با استفاده از شعله شمع

انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی


شما می‌توانید دستگاه‌های خاص نطفه‌یاب تخم مرغ را از فروشگاه‌های عرضه ماکیان خریداری کنید. این دستگاه معمولاً مانند چراغ‌قوه کوچک است که با باتری و یا یک پلاتین کار می‌کند.



انواع دستگاه نطفه‌یاب تخم مرغ

دستگاه نطفه‌سنجدی شانه‌ای (اسکن نوری) تخم مرغ

قبل از جوجه کشی و برای حذف تخم مرغ‌های ترک‌دار استفاده می‌شود.



در این قسمت تخم مرغ‌ها نوری‌بینی شده و تخم مرغ‌های ترک‌دار و یا با پوسته نامناسب شناسایی و حذف می‌شوند.



دستگاه اواسکوب

دستگاه اواسکوب (Ova Scope): یک فناوری و ابزاری گران قیمت برای نطفه‌سنجدی تخم مرغ، اواسکوب نامیده می‌شود. این دستگاه یک موضع دوار روی محل قرارگیری تخم مرغ دارد. سپس تخم مرغ توسط یک محفظه پوشیده می‌شود. پس از آن شما می‌توانید تخم مرغ را از طریق یک عدسی مشاهده کنید. در این حالت دستگاه تخم مرغ را کمی بزرگ‌تر نشان داده و بررسی آن را آسان‌تر می‌کند.

دستگاه ازاسکوپ (Ez Scope): با استفاده از این دستگاه کلیه مراحل رشد تخم مرغ را به وسیله مانیتور رایانه به طور واضح و با بزرگ نمایی زیاد می توانید مشاهده کنید.



بررسی مراحل رشد تخم مرغ با دستگاه Ez Scope

فعالیت کارگاهی

روش ساخت دستگاه نطفه یاب

شما می توانید کندلر یا دستگاه نطفه سنجی تخم مرغ را در خانه با قرار دادن یک لامپ ۶۰ وات در داخل یک قوطی قهوه و ایجاد یک سوراخ $\frac{2}{5}$ سانتی متری در بالای آن، بسازید. و یا به جای آن، شما می توانید یک چراغ قوه بسیار روشن را انتخاب کنید و آن را با یک تکه مقوا با یک سوراخ (با قطر $\frac{2}{5}$ سانتی متری) در وسط آن بپوشانید.



عوامل مؤثر در تولید تخم مرغ های بی نطفه را بیان کنید.

تحقيق
کنید

بعدی مفید باشد. همچنین این کار می تواند برای دیدن هرگونه ترک کوچک که با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست مفید باشد. تخم مرغ های شکسته بیشتر از بقیه مستعد ابتلا به باکتری های مضر هستند که این بر توسعه جنین مؤثر است.

ممکن است شما تخم مرغ ها را قبل از اینکه در ماشین جوجه کشی قرار دهید، نطفه سنجی کنید. در این حالت احتمالاً قادر نخواهید بود تا چیزی ببینید، چه برسد به تمایز بین تخم مرغ خوب و بد، اما این کار به شما نشان می دهد که یک تخم مرغ رشد نیافته چطور به نظر می رسد که این هم می تواند برای مقایسه های



فعالیت کارگاهی

را تا روز چهاردهم رها کنید. در این مرحله شما قادر خواهید بود تا هر تخم مرغی که در بار اول در مورد آن ناطمئن بودید دوباره چک کنید و آنهایی را که هنوز هیچ نشانه ای از رشد ندارند، دور بریزید.


۲ شما باید پس از روز شانزدهم یا هفدهم از نطفه سنجی خودداری کنید؛ چرا که در این مرحله تخم مرغ نباید جایه جا شود و یا حتی در روزهای منتهی به جوجه کشی نباید چرخانده شود. علاوه بر این، رشد جنین بسیار زیاد شده و داخل تخم مرغ را پر می کند؛ بنابراین دید شما بسیار کم خواهد شد.

روش کار با نطفه یاب

- ۱ اگرچه برخی از مردم تخم مرغ را به هنگام جوجه کشی هر روز نطفه سنجی می کنند؛ ولی یک ایده بهتر این است که تا حدود ۷ روز صبر کنید؛ دو دلیل برای این کار وجود دارد:
 - (الف) تخم مرغ ها به دما حساس هستند و انتقال مکرر آنها به خارج و داخل ماشین جوجه کشی می تواند بر رشد جنین به خصوص در مراحل اولیه تأثیر گذارد.
 - (ب) قبل از ۷ روز، تخم مرغ رشد زیادی نیافته و تمایز بین تخم خوب و بد دشوار خواهد بود.
- ۲ پس از نطفه سنجی در روز هفتم شما باید تخم مرغ

به تصاویر زیر توجه کنید و در مورد نحوه کار دستگاه اُواسکوب بحث کنید.

گفت و گو
کنید



دستگاه اُواسکوب



نحوه کار با دستگاه Ez Scope: دستگاه را روشن و سیم رابط را به نمایشگر رایانه متصل کنید. تخم مرغ قابل جوچه کشی را در محل مخصوص قرار دهید و با میکروسکوپ بالای آن، محل دید مورد نظر را تنظیم و با بزرگ نمایی بیشتر در نمایشگر سیستم مشاهده کنید.



بخش های مختلف دستگاه ازاسکوپ

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها / داوری / نمره دهی)	نمره
۱	آماده سازی وسیله نطفه باب	دستگاه نطفه باب	۱- آماده سازی صحیح دستگاه ۲- آماده سازی نسبتاً صحیح دستگاه ۳- آماده سازی نادرست دستگاه	شدت نور نامناسب و توزیع نور نامناسب	۳
۲	۱	دستگاه نطفه باب	۱- آماده سازی صحیح دستگاه ۲- آماده سازی نسبتاً صحیح دستگاه ۳- آماده سازی نادرست دستگاه	شدت نور مناسب و توزیع نور مناسب	۲
۳				یکنواخت	۳


فعالیت کارگاهی

قبل از استقرار تخم مرغ روی دستگاه های مختلف به تصاویر زیر دقت کنید.



فعالیت کارگاهی

- ۱ کار با نطفه یاب
- ۲ را بررسی کنید.
- ۳ لباس کار مناسب و تمیز بپوشید.
- ۴ تخم مرغ های نطفه دار را از تخم مرغ های بدون نطفه جدا کنید.
- ۵ تعدادی تخم مرغ را از دستگاه جوجه کشی بیرون بیاورید.
- ۶ در سریع ترین زمان ممکن تخم مرغ های نطفه دار را به دستگاه جوجه کشی بازگردانید.



تصویر مقابل را تحلیل کنید.

اندازه اتاقک هوایی تخم مرغ در روزهای ۱۴, ۱۸ و ۱۸ از دوره جوجه کشی

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری/نمره‌دهی)	نمره
	تعیین تخم مرغ‌های نطفه‌دار (کندلینگ)	دستگاه نطفه‌یاب	۱- تعیین دقیق تخم مرغ‌های نطفه‌دار ۲- تعیین نسبتاً دقیق تخم مرغ‌های نطفه‌دار ۳- تعیین اشتباہ تخم مرغ‌های نطفه‌دار	نطفه‌دار بودن همه تخم مرغ‌های کندلینگ شده	۳
۲				نطفه‌دار بودن نسبی همه تخم مرغ‌های کندلینگ شده	
۱				نطفه‌دار نبودن تعداد زیادی از تخم مرغ‌های کندلینگ شده	

آلودگی و شرایط نامناسب بهداشتی تخم مرغ

موجود روی پوسته به داخل تخم مرغ کشیده می‌شود و موجب تشکیل اتفاقک هوایی می‌گردد. برای جلوگیری از آلودگی باکتریایی تخم مرغ‌های جوجه‌کشی باید سریع تخم مرغ را تمیز کرد.

تمیز کردن تخم مرغ‌ها
تخم مرغ‌های جوجه‌کشی را نباید شست و شو داد. در پوسته تخم مرغ بین ۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ سوراخ ریز وجود دارد بیشتر این سوراخ‌ها با لایه‌ای که به طور طبیعی روی پوسته وجود دارد، پوشیده شده‌اند. این لایه‌ها، در اثر شست و شو از بین می‌رونند و سوراخ‌های پوسته باز می‌شوند در این حالت، میکروب‌ها به راحتی وارد تخم مرغ می‌شوند تمیز کردن تخم مرغ‌های کثیف به وسیله برس نرم، سمباده، کارد، سیم‌های ظرفشویی، هر چند اجرا می‌شود؛ ولی می‌تواند موجب آلودگی تخم مرغ گردد، یک تخم مرغ تمیز تخم مرغی است که هیچ وقت کثیف نشده باشد.

آلودگی‌های باکتریایی به آسانی سبب فساد و خرابی تخم مرغ‌های قابل جوجه‌کشی می‌شوند. برخی از اجرام بیماری‌زا به خصوص سالمونلاها و ویروس‌ها می‌توانند قبل از تشکیل پوسته تخم مرغ به داخل آن انتقال یابند. متدائل ترین راه ورود آلودگی به داخل تخم مرغ از طریق منافذ موجود روی پوسته و بعد از تخم‌گذاری است. عوامل باکتریایی می‌توانند طی مدت ۳ ساعت پس از زمان تخم‌گذاری از طریق این منافذ عبور کنند. در صورتی که پوسته تخم مرغ مرطوب و یا کثیف باشد، ورود باکتری‌ها به داخل تخم مرغ بسیار سریع‌تر انجام می‌گیرد. زمانی که تخم مرغ از بدن مرغ خارج می‌شود، درجه حرارتی برابر با دمای بدن مرغ داشته؛ ولی به سرعت سرد می‌شود. این سردشدن سبب کاهش حجم محتويات تخم مرغ به میزان کمی می‌شود. از آنجا که پوسته تخم مرغ در این حالت دچار انقباض نمی‌گردد، داخل تخم مرغ حالت خلاً ایجاد شده و در نتیجه هوا و باکتری‌ها از طریق منافذ

انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی



به هیچ وجه از کاغذ سمباده زبر استفاده نکنید
برای تمیز کردن پوسته از چاقو و یا تیغه استفاده نشود.



تمیز کردن پوسته با استفاده از سمباده زبر
موجب تخریب کوتیکول می شود.

فعالیت کارگاهی

مراحل انجام کار

- 1 لباس کار مناسب را پوشیده و به تجهیزات اینمنی و فردی مجهز شوید (کلاه، دستکش و...).
- 2 تخم مرغها را درجه بندی کنید.
- 3 تخم مرغهای غیر قابل جوجه کشی را جدا کنید.

مراحل تمیز کردن تخم مرغ های کثیف

- ابزار و وسایل مورد نیاز
■ تخم مرغ ■ برس ■ سمباده نرم ■ شانه به تعداد
موارد نیاز

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها / داوری / نمره دهی)	نمره
۳	تمیز کردن تخم مرغ های آلوده	سمباده نرم - دستمال آلوده	۱- تمیز کردن کامل پوسته تخم مرغ های آلوده	مشاهده تخم مرغ های کاملاً تمیز	۳
			۲- تمیز کردن نسبتاً خوب تخم مرغ های آلوده	مشاهده تخم مرغ های نسبتاً تمیز	۲
			۳- تمیز کردن بد تخم مرغ های آلوده	مشاهده تخم مرغ های کثیف	۱



۴ تخم مرغ‌های کمتر آلوده شده را به وسیله برس نرم یا سمباده نرم تمیز کنید.

۵ اجتناب از تمیز و پاک کردن تخم مرغ‌ها به وسیله دستمال مرطوب و کثیف زیرا این روش به سرعت تخم مرغ‌ها را آلوده می‌کند.

۶ از تمیز کردن تخم مرغ‌های خیلی کثیف خودداری کنید زیرا احتمال آلوده شدن آنها وجود دارد.

رعایت اصول ایمنی و بهداشت

۱ قبل از دست زدن به تخم مرغ‌ها دست‌ها شسته و ضد عفونی شوند.

۲ تا حد امکان از دستکش و ماسک استفاده شود.

۳ تخم مرغ‌های قابل جوجه‌کشی و غیرقابل جوجه‌کشی جداگانه جمع‌آوری شوند (تخم مرغ‌های نامرغوب و غیراستاندارد از قبیل ترک برداشته بی‌رنگ و یا دارای لکه رنگی، خیلی بزرگ و کوچک و زیاد کثیف را در شانه جداگانه جمع‌آوری کنید).

۴ بعد از دست زدن به تخم مرغ‌ها دست‌های خود را با استفاده از آب و ماده شوینده مؤثر به طور کامل شسته و سپس ضد عفونی کنید.

۵ احتمال آلودگی تخم مرغ ترک‌دار بیشتر است بنابراین لازم است این گونه تخم مرغ‌ها به سرعت مصرف شوند. عرق کردن تخم مرغ: در صورتی که تخم مرغ از یک محیط سرد به محیط گرم وارد شود عرق می‌کند و باعث افزایش احتمال آلودگی می‌شود. بنابراین تخم مرغ‌ها را نباید بلا فاصله جایه‌جا کرد.

تولیدکنندگان تخم مرغ مجبور به ارزیابی تخم مرغ‌ها بر اساس نطفه‌داری، اندازه و کیفیت آنها هستند. باید متوسط وزن تخم مرغ‌ها را محاسبه و سپس با استانداردهای نزدی مقایسه کرد. تخم مرغ‌های نامناسب برای جوجه‌کشی (شامل تخم مرغ‌های شکسته، ترک‌دار، پوسته نازک، آهکی و ...) را جداگانه بسته‌بندی کنید. تمام اطلاعات باید به صورت گزارش روزانه نوشته شود.

فعالیت کارگاهی

فرم‌های لازم را با توجه به مطالب بیان شده، تهیه کرده و سپس در کلاس درس در مورد آن بحث کنید.

نوربینی تخم مرغ‌های نطفه‌دار

اغلب جوجه‌کشی‌ها قبل از قرار دادن تخم مرغ‌ها در ستر به منظور حفظ تخم مرغ‌های ترک‌دار، آنها را نوربینی می‌کنند. اگر بخواهیم از این روش استفاده کنیم باید تخم مرغ‌ها، شب قبل از آزمایش سرد نگهداری شوند. به این ترتیب دقت عمل دو برابر خواهد شد.



نوربینی (کندلینگ) تخم مرغ های نطفه دار قبل از جوجه کشی

- مراحل انجام کار**
- ۱ لباس کار مناسب، دستکش و ماسک بپوشید.
 - ۲ یک شانه تخم مرغ را انتخاب کنید.
 - ۳ شانه را به طور مستقیم در برابر نور قرار دهید.
 - ۴ با دقت تخم مرغ ها را نگاه کنید و ترک و ... را بیابید.
 - ۵ همزمان با کار، باید تخم مرغ های مشکل دار را با علامت مشخص کرده و سپس از یافته های خود یادداشت برداری کنید.
 - ۶ تخم مرغ ها را در زمان درجه بندی بررسی کنید.
- ۷** تخم مرغ های انتخابی را بار دیگر بررسی کنید.
- ۸** تخم مرغ های حذفی را شناسایی کنید.
- ۹** این اصول را به خاطر داشته باشید:
- (الف) در یک شانه تخم مرغ انتخابی یک تخم مرغ حذفی وجود دارد.
 - (ب) در یک شانه تخم مرغ حذفی یک تخم مرغ انتخابی وجود دارد.
 - (ج) لباس خود را تعویض کنید و وسایل را سرجای خود قرار دهید.

فعالیت کارگاهی

- نطفه یابی**
- ۱ دوش بگیرید و لباس کار تمیز و مناسب جوجه کشی بپوشید.
 - ۲ کار را در یک اتاق تاریک در مجاورت دستگاه جوجه کشی انجام دهید.
 - ۳ تعدادی تخم مرغ انتخاب کنید.
 - ۴ تخم مرغی را جدا کرده و آن را بین انگشت شست و سبابه خود نگه دارید.
 - ۵ سر پهن تخم مرغ (سمتی که کیسه هوا در آن
- است) را به طور مستقیم در برابر نور قرار دهید.
- ۶** همزمان با کار، باید هر تخم مرغ بررسی شده را با یک علامت مشخص و سپس از یافته های خود یادداشت برداری کنید.
- ۷** قضاؤت کنید: به این ترتیب، شما می توانید نتایج اولین بازبینی خود را با نتایج حاصل از نطفه سنجی دوم خود مقایسه کنید.
- ۸** سعی کنید به سرعت کار کنید؛ اما نه چنان سریع که تخم مرغ در معرض خطر و آسودگی قرار گیرد.

- ۸** به دنبال علائمی که نشان دهنده تخم مرغ نطفه دار است، بگردید. یک تخم مرغ مورد تأیید دارای یک جنین با رشد موفق است. شما می توانید مورد تأیید بودن یک تخم مرغ را با استفاده از نشانه های زیر تعیین کنید:
- (الف) وجود رگه های خونی گسترش یافته از مرکز تخم مرغ به سمت اطراف.
 - (ب) با وسیله نطفه سنج ضعیف تر، شما ممکن است فقط قادر به نطفه سنجی و به اصطلاح دیدن نیمة پایینی تخم مرغ (کیسه هوا) و نیمه تیره تر بالایی تخم مرغ (جنین در حال رشد) باشید.
 - (ج) با یک وسیله نطفه سنجی (کندلر) خوب، شما قادر به دیدن طرح کلی تاریک جنین در مرکز شبکه رگه های خونی خواهید بود.
- ۹** به دنبال نشانه های توقف رشد تخم مرغ بگردید. برخی از تخم مرغ ها رشدشان در یک مرحله ای به گردانید.
- ۱۰** پس از پایان کار، تخم مرغ ها را به دستگاه باز گردانید.
- ۱۱** اگر شما مطمئن نیستید، فعلاً تخم مرغ را دور نریزید. اگر این کار را انجام دهید، ممکن است تخم مرغی سالم را هم دور نریزید.
- ۱۲** به دنبال نشانه های توافق رشد تخم مرغ باز خواهد داشت.

توجه

اخلاق
حرفه ای

در نطفه یابی تخم مرغ ها دقیق و وسوسات داشته باشید تا وقت و نیروی انسانی و سرمایه هدر نرود.

۱۳ لباس های خود را تعویض کنید.**۱۴** در پایان همه وسائل مورد استفاده شده را سر جای خود قرار دهید.بیشتر
بدانیم

نطفه سنجی تخم مرغ قهوه ای یا خال دار با پوسته تیره در زیر نور شفاف مشکل تر خواهد بود.

بهترین زمان برای نور بینی ۵ الی ۶ روزگی می باشد. تخم مرغ های مشکوک را دوباره در روز چهاردهم بررسی کنید. اگر هنوز هیچ نشانه های از رشد وجود نداشت و یا اگر در نهایت یک حلقه خونی تشکیل شد. شما می توانید آنها را دور بیندازید.

تخم مرغ ها را قبل از انتقال به داخل دستگاه و در زمان جوجه کشی نطفه بینی کنید. اگر قبل از قرار دادن در داخل دستگاه جوجه کشی، روی پوسته تخم مرغ هرگونه ترک و شکستگی مشاهده کردید، فوراً آن را جدا کنید و می توانید این تخم مرغ ها را به فروش برسانید.

انتخاب تخم مرغ مناسب جوچه کشی

مواقب باشید: تخم مرغ ناباروری که مدتی داخل ماشین جوچه کشی قرار گرفته است برای خوردن استفاده نکنید و به فروش نرسانید. آنها دیگر تازه نیستند و می‌توانند شما را بیمار کنند.

فعالیت کارگاهی

ثبت اطلاعات تخم مرغ نطفه دار

ابزار و وسائل مورد نیاز ■ امکانات نوشت افزاری ■ جداول مربوط

مراحل انجام کار

- ۱ از انبار نگهداری تخم مرغ در مرغداری هنرستان بازدید کنید.
- ۲ جدول زیر را با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده تکمیل کنید.

میانگین وزن تخم مرغ‌ها	تعداد تخم مرغ‌های غیر قابل جوچه کشی	تعداد تخم مرغ‌های قابل جوچه کشی	تاریخ درجه‌بندی تخم مرغ	محل تهیه تخم مرغ	میزان تخم مرغ ورودی به انبار	تاریخ ورود به انبار

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/ نمره‌دهی)	نمره
۴	مستندسازی	فرم‌های مربوطه	۱- ثبت دقیق آمار ۲- ثبت نسبتاً دقیق آمار ۳- ثبت آمار با دقت پایین	تعداد صحیح تخم مرغ‌ها	۳
				تعداد نسبتاً صحیح تخم مرغ‌ها	۲
				تعداد نادرست تخم مرغ‌ها	۱

ارزشیابی شایستگی نطفه یابی

شرح کار:

- ۱- راهاندازی وسیله نطفه یاب طبق اصول فنی
- ۲- نطفه یابی صحیح
- ۳- تمیز کردن تخم مرغ های آلوده
- ۴- مستندسازی

استاندارد عملکرد:

دقت در نطفه یابی تخم مرغ

شاخص ها:

- ۱- آماده سازی وسیله نطفه یابی
- ۲- انتخاب تخم مرغ قابل جوچ کشی از نظر ظاهری (شکل، وزن و ...)
- ۳- تمیز کردن تخم مرغ های نطفه دار از آلودگی ها به وسیله سمباده فرم
- ۴- ثبت آمار مربوط به تخم مرغ های نطفه دار

شرایط انجام کار:

نطفه یاب

تخم مرغ های نطفه دار

سمباده نرم، نمون برگ های مربوطه

ابزار و تجهیزات:

دستگاه نطفه یابی - سمباده نرم - دستمال - فرم های مربوط به ثبت آمار - کارتنهای بسته بندی تخم مرغ های بدون نطفه و غیر قابل جوچ کشی - شانه پلاستیکی تخم مرغ

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده سازی وسیله نطفه یاب	۱	
۲	تعیین تخم مرغ های نطفه دار	۱	
۳	تمیز کردن تخم مرغ های آلوده	۲	
۴	مستندسازی	۲	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: مسئولیت پذیری، مدیریت مواد و تجهیزات، تفکر انتقادی، رعایت بهداشت فردی، جلوگیری از آسیب فیزیکی به تخم مرغ ها، حفاظت از تخم مرغ ها از هرگونه آلودگی، دفع بهداشتی پسمندها			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			

واحد یادگیری: ۳

درس: تولید و پرورش مرغ

رشته: امور دامی