

واحد یادگیری ۶

درجه‌بندی جوجه یک روزه

آیاتا به حال پی برده‌اید؟

- ۱ جداسازی جوجه‌ها براساس درجه کیفیت به چه صورتی خواهد بود؟
- ۲ چه روش‌هایی برای انتقال جوجه به کارتون وجود دارد؟
- ۳ برای حمل و نقل جوجه‌ها از چه وسایلی استفاده می‌شود؟
- ۴ براساس چه ویژگی‌هایی جوجه‌های واژده را از سالم تفکیک می‌کنند؟
- ۵ چه شاخص‌هایی را باید در فرم گزارش جوجه‌کشی درنظر گرفت؟
- ۶ چه روش‌هایی برای از بین بردن ضایعات کارخانه جوجه‌کشی به کار می‌رود؟

هدف از این بخش درجه‌بندی، شمارش و انتقال جوجه‌ها به کارتون‌های حمل و سپس تعیین جوجه‌های واژده و معده‌سازی پسماندهای حاصل است. سلامت جوجه‌ها در زمان تفریخ می‌تواند بر روی کیفیت جوجه‌ها، مراحل رشد و ویژگی‌های گوشت و تخمرغ آنها تأثیر بگذارد. جداسازی جوجه‌های ضعیف بعد از هج انجام می‌گردد. جوجه‌های سالم را می‌توان با نگاه کردن به هوشیاری آنها، وجود هرگونه جراحت و یا نقص و بررسی وضعیت ناف تشخیص داد. در حال حاضر ارزیابی کیفیت جوجه‌های تفریخ شده با توجه به مشاهدات فردی کارکنان جوجه‌کشی و یا کشن جوجه‌ها جهت نمونه‌برداری از حضور باکتری‌ها در کیسه زرد، صورت می‌گیرد. به جهت افزایش احتمال تولید جوجه‌های قوی، مدیریت خوب کارخانه جوجه‌کشی حیاتی است.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که جوجه‌ها را براساس استاندارد مربوطه درجه‌بندی کنند.

درجه‌بندی جوجه‌ها

برای تعیین کیفیت جوجه‌ها باید استانداردی وجود داشته باشد. جوجه‌هایی که کیفیت پایین‌تر از استاندارد دارند نباید برای خریدار ارسال شوند. استاندارد برای همه نژادها یکسان بوده و در تمام فصول قبل اجرا است.

عملیات ارزیابی و درجه‌بندی جوجه در جوجه‌کشی توسط افراد مجبوب و با تجربه انجام می‌گیرد.

توجه



- ۶ ناف کاملاً بسته و علائمی از زخم و ورم دیده نشود.
- ۷ وزن جوجه‌ها نرمال باشد.
- ۸ دهیدراته نباشد (کاهش شدید آب بدن).
- ۹ بدن جوجه بدون نقص و بد شکلی باشد (در صورت داشتن بدشکلی، نوک طوطی شکل و متقطع، کوری و ... حذف گردد).
- ۱۰ جوجه سرزنه و پاهایش صاف و شفاف باشد و در هنگام لمس، بدن محکم بوده و نباید هیچ به خوبی بتواند باشد.
- ۱۱ کلواک سالم و طبیعی باشد.

علایم برای ارزیابی کیفیت جوجه‌ها

- ۱ رنگ کرک مطابق با رنگ نژاد باشد.
- ۲ چشم‌های پرنده شفاف و براق باشد.
- ۳ کرک‌ها خشک و نرم باشد.
- ۴ بدن جوجه بدشکلی، نوک طوطی شکل و متقطع، علامتی از تورم نشان دهد.

در صورت مشاهده نکردن هر یک از علائم و مشخصات بالا جوجه را حذف کنید.

توجه



در درجه‌بندی جوجه‌های یک روزه با وسوس عمل کنید تا وقت و نیرو و سرمایه هدر نرود و جوجه‌های مشکل‌دار را از چرخه پرورش خارج کنید.

اخلاق حرفه‌ای



فعالیت کارگاهی

مراحل انجام کار

درجه‌بندی جوجه‌ها

- ۱ ابزار و سایل مورد نیاز لباس کار مناسب
- ۲ قبل از ورود به داخل سالن‌های جوجه‌کشی دوش ماسک دفترچه یادداشت کارت حمل جوجه بگیرید و لباس مناسب و تمیز بپوشید. چرا؟

هنگام درجه‌بندی جوجه حتماً از ماسک استفاده شود.

توجه



- ۲** جوجه‌های آماده را به اتاق درجه‌بندی انتقال فلچ، دارای چسبندگی مقعد، نوک متقطع و ...) را از سایر جوجه‌ها سالم و طبیعی جدا کنید.
- ۳** دمای اتاق جوجه باید ۲۲-۲۴ درجه سانتی‌گراد و قرار دهید (در زمستان ۱۰۰ قطعه و در تابستان ۸۰ رطوبت ۶۵-۷۰ درصد باشد).
- ۴** جوجه‌های درجه ۲ (جوجه‌های ضعیف، ورم نافی، قطعه جوجه در هر کارتنه).

توجه

در برخی از واحدهای جوجه‌کشی علاوه بر درجه‌بندی جوجه‌ها، تعیین جنسیت، واکسیناسیون، نوک چینی، قطع بال یا قطع تاج و ... نیز صورت می‌گیرد.



- ۵** کارتنهای را در گاری چیده و در اتاق مخصوص تا زمان تحویل جوجه‌ها نگهداری کنید.
- ۶** در پایان دوش گرفته و لباس‌های خود را تعویض کنید.
- ۷** تعداد جوجه‌های درجه ۱ و ۲ را بشمارید.
- ۸** پس از درجه‌بندی، به طور تصادفی چند کارتنه را وزن کرده و سپس میانگین وزن جوجه‌ها را محاسبه کنید.
- ۹** بعد از اتمام درجه‌بندی، تمام تجهیزات و وسائل



انتقال جوجه‌ها برای درجه‌بندی

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ایزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۱	جدا کردن جوجه‌ها براساس نوع درجه	کارتنهای جوجه یک روزه	۱- جداسازی درست جوچه‌ها	قرار گرفتن جوجه‌های هماندازه در هر درجه تعیین شده	۳
			۲- جداسازی نسبتاً درست جوچه‌ها	قرار گرفتن جوجه‌های نسبتاً هماندازه در هر درجه تعیین شده	۲
			۳- جداسازی نادرست جوچه‌ها	قرار گرفتن جوجه‌های غیر هماندازه در هر درجه تعیین شده	۱

برای تسريع در کار، توصیه می‌شود جوچه‌ها را از سبد هچر تخلیه کرده و به دقت شمارش کنید.

توجه



فعالیت کارگاهی

شمارش جوچه‌ها

مراحل انجام کار

- ۱ ابتدا لباس کار مناسب و تمیز بپوشید و حتماً از ماسک و دستکش استفاده کنید.
- ۲ تمام جوچه‌ها به غیر از آنهایی که به طور واضح دور ریختنی هستند را تخلیه کنید.
- ۳ تعداد تخم مرغ‌های هچ نشده، جوچه‌های مرده و دور ریختنی سبد را بشمارید.
- ۴ با توجه به اینکه تعداد تخم مرغ در هر سبد مشخص است. تعداد تخم مرغ‌های کل را از تعداد (تخم مرغ‌های هچ نشده، جوچه‌های مرده و دور ریختنی) کم کنید تا تعداد جوچه‌های هچ شده مشخص شود.
- ۵ تعداد جوچه‌های هچ شده سبد را در کارت هچر ثبت کنید.
- ۶ تعداد کل جوچه‌های هچ شده را می‌توان با جمع تعداد جوچه‌های ثبت شده روی کارت هر سبد محاسبه کرد.

بیشتر
بدانیم



با توجه به اینکه انجام مراحل بالا در هنگام هچ زمان زیادی می‌برد. اکثر جوچه‌کشی‌ها برای محاسبه

تعداد کل جوچه هچ شده در هر هچر از روش‌های زیر استفاده می‌کنند:

الف) تعداد کارتنهای پرشده از جوچه را شمارش کنید.

ب) با توجه به این مطلب که در تابستان تعداد جوچه گذاشته شده داخل هر کارتنهای ۸۰ و در زمستان

۱۰۰ قطعه است. پس از پایان تخلیه جوچه به کارتنهای، تعداد کارتنهای شمرده شده را در تعداد

جوچه‌های ریخته شده در آن ضرب کنید تا تعداد جوچه هچ شده درجه یک به دست آید.

ج) سپس تعداد جوچه‌های درجه ۲ ریخته شده در کارتنهای دیگر را شمارش کنید.

د) در پایان تعداد جوچه‌های درجه ۱ و ۲ را با یکدیگر جمع کنید تا کل جوچه‌های هچ شده در هر

دستگاه مشخص شود.

برای درجه بندی، جوچه های سالم و قوی را به عنوان جوچه درجه یک و جوچه های ضعیف را به عنوان درجه ۲ مشخص می کنند.

توجه



آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها/ داوری /نمره دهی)	نمره
۲	شمارش جوچه ها	- ماسک - سبد یا ریل خودکار	۱- شمارش دقیق جوچه ها	رضایتمندی مشتری	۳
			۲- شمارش نسبتاً دقیق جوچه ها	رضایتمندی نسبی مشتری	۲
			۳- بی دقت شمردن جوچه ها	عدم رضایت مشتری	۱

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها/ داوری /نمره دهی)	نمره
۳	انتقال جوچه ها به کارتنه	ماسک، کارتنه های جوچه یک روزه	۱- تراکم درست جوچه ها براساس شرایط وسیله نقلیه و آب و هوا	کارتنه های حاوی تعداد مناسب جوچه	۳
			۲- تراکم نسبتاً درست جوچه ها براساس شرایط وسیله نقلیه و آب و هوا	کارتنه های حاوی تعداد نسبتاً مناسب جوچه	۲
			۳- تراکم نادرست جوچه ها براساس شرایط وسیله نقلیه و آب و هوا	کارتنه های حاوی تعداد نامناسب جوچه	۱



معمولًاً کارتون مورد استفاده در جوچه کشی ها به چهار کارتون ها قرار دهید. کارتون های آماده شده را در گاری بچینید و از قرار دادن کارتون ها روی زمین خودداری کنید. وقتی جوچه های تازه هج شده در کارتون ها قرار در فصول گرم سال در صورتی که درجه حرارت بالای ۲۱ درجه سانتی گراد باشد در کارتون ها ۸۰ کامل کرک ندارد و به خوبی قادر به ایستادن نیستند. قطعه جوچه و در صورتی که حرارت از ۲۱ درجه به همین دلیل باید اجازه داد تا بدن جوچه ها سفت سانتی گراد پایین تر باشد ۱۰۰ قطعه جوچه را در شود.



۲. انتقال جوچه ها به کارتون ها با استفاده از نوار نقاله



۱. انتقال جوچه ها به کارتون ها به صورت دستی

حمل و نقل جوچه ها

از وسایل مختلفی مانند هواپیما، قطار، اتوبوس، ماشین های سواری می توان برای حمل جوچه ها استفاده کرد ولی در اغلب مناطق حمل جوچه ها با کامیون صورت می گیرد. دو نوع کامیون برای حمل جوچه ها وجود دارد.

- ۱ کامیون سرپوشیده
- ۲ کامیون های محفظه دار

پس از خروج همه جوچه ها از هجر دوازده ساعت بعد باید جوچه ها را به خریدار تحویل داد تا جوچه ها زمان کافی برای سفت شدن داشته باشند.

نکته مهم



در صورت حمل با هواپیما، زمان تفریخ جوچه ها و حمل و نقل آنها تا حد امکان نزدیک به هم باشد. جوچه ها در قسمتی از هواپیما قرار بگیرند که تهویه مناسب داشته باشد.



کامیون‌های محفظه‌دار

ظرفیت حمل ۵۰۰۰ قطعه یا بیشتر را دارند. در این کامیون بدن و بخش حمل جوچه جدا از هم است.



در زمان حمل جوچه از کارخانه به سالن پرورش، محیط اطراف جوچه باید کاملاً تحت کنترل باشد.

فعالیت کارگاهی

ماشین حدود ۲۴ درجه سانتی‌گراد باشد. اگر از جعبه‌های پلاستیکی برای حمل استفاده می‌شود، درجه حرارت داخل کامیون حمل باید حدود ۲۰ درجه سانتی‌گراد باشد.

۱ استفاده از جعبه‌های پلاستیکی برای حمل جوچه در مقایسه با جعبه‌های مقوایی، احتمال گرمایش گردد یا سرماخوردگی جوچه‌ها را بیشتر می‌کند.

۲ جعبه‌های جوچه باید به درستی در داخل کامیون چیده شود، به طوری که فضای کافی برای برقراری هوای موردنیاز بین جعبه‌ها موجود باشد. جعبه‌های چیده شده در کامیون باید به وسیله یک میله مهار شوند.

۳ رانندگان باید با لباس کار، چکمه مخصوص و ... کار کنند تا آلودگی را انتقال ندهند.

۴ کامیون‌های حمل جوچه باید بعد از هر سرویس تحویل جوچه، به وسیله آب و مواد ضد عفونی کنند، شست و شو و ضد عفونی شوند.

راعیت شرایط محیطی در زمان حمل و نقل جوچه‌ها

مراحل انجام کار

۱ حداقل تهویه مورد نیاز برای تأمین اکسیژن به ازای هر ۱۰۰۰ جوچه در هوای زمستان ۳۴ مترمکعب در ساعت و در تابستان دو برابر این میزان است. تمام کامیون‌های حمل باید به سیستم گرم‌کننده کمکی یا تأمین‌کننده جریان هوای تازه کافی به منظور گرم کردن و یا خنک کردن مجهز باشند. اگر در تابستان درجه حرارت از ۳۰ درجه سانتی‌گراد بالاتر رود باید از سیستم خنک‌کننده استفاده شود.

۲ کامیون حمل جوچه باید مجهز به وسائل نشان‌دهنده درجه حرارت در قسمت بار باشد تا راننده بتواند میزان هوای ورودی را برای خنک کردن جوچه‌ها تنظیم نماید.

۳ درجه حرارت در داخل جعبه‌های جوچه باید حدود ۳۲ درجه سانتی‌گراد و درجه حرارت داخل



نحوه چیدن کارتن‌ها در ماشین‌های حمل



مهار شدن سبد جوجه‌ها در ماشین‌های حمل

مشخصات جوجه‌های درجه ۲ (وازده)

جوجه‌های درجه ۲ یا وازده ممکن است برخی از علائم زیر را داشته باشند که منجر به حذف شدن آنها می‌شود.

- ۱ عدم التیام ناف: این جوجه‌ها غیرفعال بوده و اغلب روی سینه می‌نشینند، دارای شکم متورم و مفصل خرگوشی قرمز رنگ نیز هستند.
- ۲ عفونت کیسهٔ زرد: کیسهٔ زرد بدبو و بذرنگ بوده و در سطح آن رگ‌های خونی دیده می‌شود.
- ۳ از دست دادن آب بدن (دهیدراتاسیون): تجمع جوجه‌ها در مناطق گرم سالن، عدم مصرف آب و دان، عضلات تیره و خشکی پوست و عضلات.
- ۴ چسبندگی مقعد: خشک شدن و چسبیدن مدفوع در ناحیه مقعد که منجر به انسداد آن می‌شود.
- ۵ آب آورده‌گی پرده قلب: عمدتاً به علت کاهش جریان هوا در هچری و در نتیجهٔ کمبود اکسیژن است که با تهویه ضعیف مرغداری تشدید می‌شود.
- ۶ جوجه‌های کوچک و کم وزن بودن جوجه
- ۷ وجود نواقصی نظیر آسیب‌دیدگی متعدد و رنگ پریدگی پاها
- ۸ پنجه‌های خمیده و یا کج در گله به علت نوسانات حرارتی دستگاه خصوصاً درجه حرارت بالا ممکن است مشاهده شود.
- ۹ جوجه‌ای که زودتر تفریخ شده و بند ناف در آنها بهبود نیافته است.
- ۱۰ جوجه‌های چسبناکی که محتويات تخمرغ‌ها به بدن آنها چسبیده است.
- ۱۱ جوجه‌های خشکی که پوسته تخمرغ‌ها به بدن آنها چسبیده است.

توجه

در صورت مشاهده هریک از نشانه‌های فوق جوجه را حذف کنید؛ چرا که وجود این جوجه‌ها در مرغداری موجب کاهش راندمان در طول دوره پرورش خواهد شد.



تحقيق
کنید

- چند درصد از کل جوجه‌های هچ شده در گروه جوجه‌های وازده طبقه‌بندی می‌شوند؟
- با چه کارهایی می‌توان میزان وازده‌گی جوجه‌ها را کاهش داد؟



فعالیت کارگاهی

ورود کرک‌ها به دهان).
۴ قبل و بعد از درجه‌بندی دست‌های خود را ضدغونی کنید.

۵ فقط جوجه‌های عاری از عوامل بیماری‌زا را هج کنید.

۶ از کارتنهای جدید برای حمل جوجه و یا سبدهای پلاستیکی ضدغونی شده استفاده کنید.

۷ جوجه‌کشی فقط یک در ورودی و خروجی برای افراد داشته باشد. یک حوضچه بزرگ همراه با یک برس در مدخل درب ورودی جوجه‌کشی برای تمیز کردن چکمه پرسنل وجود داشته باشد. ماده ضدغونی باید به طور مرتبت تعویض گردد.

۸ مواد زائد جوجه‌کشی باید به طور صحیح حذف و سوزانده شوند تا از انتقال عوامل بیماری‌زا جلوگیری شود.

جداسازی جوجه‌های واژده

مراحل انجام کار

۱ لباس کار، ماسک و دستکش مناسب بپوشید.

۲ جوجه‌ها را با دقیق در دست گرفته و بررسی کنید.

۳ در صورت مشاهده هر یک از نشانه‌های زیر جوجه را حذف کنید.

۴ جوجه‌های واژده را در کارتنهای جداگانه بریزید و به روش اصولی معدهای کنید.

۵ دست‌های خود را ضدغونی کنید

۶ دوش بگیرید و لباس‌های خود را تعویض کنید.

۷ همه پرسنل قبل از ورود به جوجه‌کشی دوش گرفته و از لباس، کفش و کلاه تمیز استفاده کنند.

۸ در هنگام درجه‌بندی جوجه‌ها حتماً از ماسک، دستکش و کلاه استفاده کنید (برای جلوگیری از شود).

علت واژدگی جوجه‌های زیر چیست؟ این فرد کدامیک از اصول ایمنی را رعایت نکرده است؟

گفت و گو
کنید





از بین بردن ضایعات کارخانه جوجه‌کشی

در یک کارخانه جوجه‌کشی با متوسط جوجه‌درآوری ۸۵ درصد، حدود ۱۵ درصد از تخممرغ‌ها فاقد نطفه و یا دارای جنین تلف شده هستند. این دسته از تخممرغ‌ها به همراه پوسته تخممرغ‌های باقیمانده پس از خروج جوجه‌ها و همچنین تخممرغ‌های نوک‌زده و جوجه‌های واژده به عنوان ضایعات کارخانه جوجه‌کشی محسوب می‌شوند. در برخی از کشورها استفاده از این مواد در کارخانه‌های تهیه پودر مازاد واحدهای جوجه‌کشی به دلیل احتمال انتقال عوامل بیماری‌زا منوع شده است. از آنجایی که مضرات استفاده از پودر ضایعات جوجه‌کشی بیش از مزایای آن است؛ بنابراین در اغلب واحدهای جوجه‌کشی ضایعات مذکور را معذوم می‌کنند.

۱ تخممرغ‌های هچ نشده باقیمانده در سینی باید به منظور از بین بردن هرگونه جنین خارج‌نشده خرد و پرس شوند. تخممرغ‌های نوک‌زده و جوجه‌های واژده نیز به وسیله گاز دی‌اکسیدکربن و یا هر وسیله مجاز دیگری باید در جوجه‌کشی معذوم شوند.

۲ تمام مواد پرس شده و ضایعات باید به وسیله اوگر به یک تریلی و یا مخزن مخصوص منتقل شوند و یا توسط پمپ مکش وارد مخازن سرپوشیده مخصوص گردند. این مواد باید با توجه به موقعیت و قوانین محلی معذوم شوند که شامل این موارد است.

- الف) سوزانیدن در کوره ۶۰۰ درجه (سوزاندن مواد هچری بهترین راه است).
- ب) تبدیل به فراوردهای فرعی هچری که یکی از منابع مورد استفاده در خوراک طیور است.
- ج) دفن کردن ضایعات توسط بیل مکانیکی در چاله‌هایی به عمق ۲ متر.
- د) دفع از طریق فاضلاب.



برای پایین نگهداشتن هزینه‌ها، مدیر باید بعد از هر هج، هر هفته و در پایان هر ماه و هر سال آماری داشته باشد.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۱	معدهم نمودن جوچه‌های واژده	آب و هوا	۱- دفع به روش درست در محل مناسب ۲- دفع به روش نسبتاً درست ۳- دفع به روش نادرست	عدم مشاهده ضایعات در واحد	۳
۲	معدهم نمودن جوچه‌های واژده	آب و هوا	۱- دفع به روش درست در محل مناسب ۲- دفع به روش نسبتاً درست ۳- دفع به روش نادرست	مشاهده مقدار کمی ضایعات در واحد	۲
۳	معدهم نمودن جوچه‌های واژده	آب و هوا	۱- دفع به روش درست در محل مناسب ۲- دفع به روش نسبتاً درست ۳- دفع به روش نادرست	مشاهده مقدار زیادی ضایعات در واحد	۱

گزارش مسئول جوچه کشی

بلافاصله بعد از هر هج، مسئول جوچه کشی باید گزارشی تهیه و تنظیم کرده و تحويل مدیر دهد. این گزارش باید شامل کارهای رایج در جوچه کشی، بازده دستگاه‌ها، درصد هج جوچه‌ها، درصد جوچه‌های هج شده فروخته شده به خریدار، قیمت جوچه فروخته شده و ... باشد. تمام موارد به‌طور کامل در فرم آمده است.

فعالیت کارگاهی

برای ثبت اطلاعات و گزارش عملکرد جوچه کشی فرم‌های مطابق نمونه فرم صفحه بعد تهیه کنید.

نمونه فرم گزارش مسئول جو چه کشی

فعالیت کارگاهی



اطلاعات لازم برای تکمیل فرم تهیه شده در این صفحه را جمع آوری کنید.

نحوه ثبت فرم‌ها

- ۱ فرم‌ها را به طور کامل مطالعه کنید.

۲ از زمان ورود تخم مرغ به انبار تا زمان تحویل جوجه کلیه مراحل را ثبت کنید.

۳ با دقیق کاملاً و داشتن اطلاعات کافی، فرم‌ها را با

صحت کامل پر کنید.

- ۴ از نتایج این فرم‌ها برای برنامه‌ریزی‌های بعدی شامل: بررسی مسائل مدیریتی، حمل جوچه، جوچه کشی و بررسی گله مادر استفاده خواهد شد.

فعالیت کارگاهی

اطلاعات به دست آمده را در فرم تهیه شده ثبت کنید.
مسئول جوچه کشی باید تمام فرم‌های قبل را با دقت مطالعه کند، سپس در طول دوره بعدی هج بآ دقت فراوان و به طور کامل ثبت کند. در پایان هرماه گزارشی از هزینه اداره جوچه کشی و عوامل مؤثر در قابلیت جوچه کشی تهیه کند، همچنین باید یک گزارش جمع‌بندی سالیانه داشته باشد.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۱	مستندسازی	فرم‌های مربوطه	۱- ثبت دقیق آمار و اطلاعات ۲- ثبت نسبتاً دقیق آمار ۳- ثبت آمار با دقت پایین	تعداد صحیح جوچه‌های یک‌روزه	۳
				تعداد نسبتاً صحیح جوچه‌های یک‌روزه	۲
				تعداد نادرست جوچه‌های یک‌روزه	۱

ارزشیابی شایستگی درجه‌بندی جوچه‌های یک‌روزه

شرح کار:

- ۱- شمارش جوچه‌ها
- ۲- درجه‌بندی جوچه‌ها
- ۳- انتقال جوچه‌ها به کارتون
- ۴- معدوم‌سازی جوچه‌های واژده
- ۵- مستندسازی

استاندارد عملکرد:

تعیین درجه جوچه‌ها با دقت و سرعت

شاخص‌ها:

- ۱- تعیین تعداد جوچه‌ها
- ۲- تقسیم جوچه‌ها براساس نوع درجه
- ۳- کارتون‌های حاوی تعداد مناسب جوچه
- ۴- معدوم‌سازی جوچه‌های واژده به صورت بهداشتی
- ۵- تکمیل نمون برق‌های مربوطه

شرایط انجام کار:

جوچه‌های درجه ۱ و ۲ و ۳

کارتون‌های حمل جوچه یک روزه

نمون برق‌های مربوطه، چاه تلفات یا کوره لاشه‌سوز، سبدهای نگهداری جوچه

ابزار و تجهیزات:

فرم‌های مربوط به ثبت آمار - سبدهای نگهداری جوچه - کارتون‌های جوچه

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	شمارش جوچه‌ها	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱			۱	
۲	جدا کردن جوچه‌ها براساس نوع درجه		۲	
۳	انتقال جوچه‌ها به کارتون		۱	
۴	معدوم نمودن جوچه‌های واژده		۲	
۵	مستندسازی		۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:				
تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری، حفظ سلامتی فرد حین انجام کار، حفظ سلامتی فرد در زمان درجه‌بندی جوچه‌ها، دفع بهداشتی ضایعات جوچه‌کشی، معدوم کردن صحیح جوچه‌های واژده، امانت داری، صداقت، آسایش پرنده				
میانگین نمرات				
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.				

واحد یادگیری: ۶

درس: تولید و پرورش مرغ

رشته: امور دامی