

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات

شاخه کارداش

گروههای تحصیلی امور زراعی - امور باغی

رشته‌های زراعت - باگبانی

شماره شناسایی ۱۰-۹/۷۹-۱

شماره درس ۷۰۶۴-۷۰۶۵

۱۳۹۴	متون درسی شاخه کارداش گروههای تحصیلی امور زراعی - امور باغی، رشته‌های زراعت - باگبانی.
۱۳۹۴	برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی رشته زراعت دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش وزارت آموزش و پرورش.
۱۳۹۴	۱. تناوب زراعی. ۲. فرآورده‌های زراعی- برداشت. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش.
۱۳۹۴	دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش. ب. عنوان. ج. فروست.

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و
حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoecd.sch.ir

پیام نگار(ایمیل)

www.tvoecd.sch.ir

وب‌گاه(وب سایت)

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب مهارتی : آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات - ۵۹۸/۲

مؤلف : عزت الله مقیمیان

شماره شناسایی : ۹۰-۱-۷۹۱۰/ک

شامل پیمانه‌های مهارتی :

۱- برداشت محصولات / ۷۹-۱-۱۰-۹-۱

۲- سیلو کردن محصولات / ۷۹-۱-۱۰-۹-۲

۳- نگهداری محصول در انبار / ۷۹-۱-۱۰-۹-۳

۴- آیش بندی / ۷۹-۱-۱۰-۹-۴

۵- تناوب / ۷۹-۱-۱۰-۹-۵

آماده‌سازی و نظارت بر جاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۶۱-۹۱۶۱-۹، دورنگار : ۰۹۶۶-۸۸۳۰، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت : www.chap.sch.ir

صفحه‌آرا : خدیجه محمدی

طراح جلد : محمدحسن معماري

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاذه مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش)

تلفن : ۰۹۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار : ۰۹۶۶-۴۴۹۸۵۱۶۱، کد پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : خجستگان

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ دوازدهم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی(ره)

فهرست

۱	پیمانه مهارتی یک برداشت محصولات
۲۶	پیمانه مهارتی دو سیلو کردن محصولات
۳۸	پیمانه مهارتی سه نگهداری محصول در اتبار
۵۵	پیمانه مهارتی چهار آیش بندی
۶۸	پیمانه مهارتی پنج تناوب
۸۶	منابع و مأخذ

مقدمه

رشد روزافزون جمعیت و محدود بودن منابع اصلی تولید موادغذایی کره زمین یعنی آب و خاک موجب گردیده تا توجه به افزایش بهره‌وری از امکانات موجود، در سرلوحهٔ فعالیتهای بخش کشاورزی جوامع مختلف قرارگیرد. به همین دلیل است که امروزه کشاورزی به عنوان محور فعالیتها، بخش مهمی از فعالیتهای علمی، تخصصی، برنامه‌ریزی و تحقیقات را در دنیا به خود اختصاص داده است و حتی رشد علوم و فناوری بیشتر برای بهره‌گیری در این بخش مدنظر می‌باشد.

در حال حاضر با اصلاح بذور، به کارگیری تکنولوژی و روشهای بهزراعی، براساس نتایج حاصل از تحقیقات گستره‌ده، موجبات افزایش محصول در واحد سطح را به نحو مؤثری فراهم نموده است اما متأسفانه به دلیل عدم رعایت بهره‌برداری صحیح از اراضی و ضایعات محصول در موقع برداشت و حمل و نگهداری، حمله آفات و بیماریها، درصد قابل ملاحظه‌ای از محصول در مراحل مختلف از بین می‌رود و روزبه‌روز، در نتیجهٔ کمبود موادغذایی عدهٔ بیشتری از جمعیت جهان در معرض گرسنگی و در نتیجهٔ بیماری و مرگ قرار می‌گیرند.

شاید عمدت‌ترین دلیل بروز ضایعات و کاهش محصول در فقر آموزش و به کارگیری کاربردی اصول علمی و فنی در فعالیتهای کشاورزی باشد. این موضوع در جوامعی که کشاورزی به صورت سنتی و با استفاده از روشهای قدیمی و غیرعلمی اداره می‌شود نمودی عینی و مشهود دارد. اکنون که به لطف خدا، در کشور عزیزان امکان آموزش کاربردی اصول و مهارتهای کشاورزی، در قالب آموزش کار و داشت برای نسل جوان و جایگزینی نیروی سنتی فراهم آمده است، در تدوین کتب درسی نیز توجه به آموزش کاربردی و کسب مهارت برای افزایش بهره‌وری مدنظر قرار گرفته است تا نه تنها داشت آموزان رشته‌های کشاورزی بلکه دست‌اندر کاران باسوس بخش کشاورزی بتوانند از این کتب استفاده عملی داشته باشند.

مجموعهٔ حاضر شامل مهارت‌آیش، تناوب، برداشت محصول، انبار و سیلو کردن محصول است که به صورت کاربردی، اساسی‌ترین نکات و مهارتهای موارد فوق را برای افزایش بهره‌وری و حفظ محصول در بردارد و انشاءالله در قالب مطالعه و تکرار در آموزش عملی بتواند با تربیت و تأمین نیروی متخصص و ماهر در بخش کشاورزی موجبات افزایش محصول و رسیدن به خودکفایی و موفقیت را در این بخش به دنبال داشته باشد. از آنجا که عدم رعایت اصول و به کارگیری این مهارتها موجب کاهش تولید محصول می‌شود اهمیت آموزش کاربردی صحیح این مهارتها نمود بیشتری می‌باشد که امید است این مجموعه بتواند در این زمینه مؤثر و مورد استفاده مطلوب باشد. بدیهی است تدوین کتب مهارتی در اولین تجربه‌های آموزشی کشور نمی‌تواند عاری از نقص و کمبودها باشد که انشاءالله در حين آموزش و با رشد و پیشرفت دانش کشاورزی و تکنولوژی در آینده به صورت پیوسته و مداوم نیاز به بازنگری و تکمیل خواهد داشت که در این زمینه خصوصاً نیاز به اعلام نظر و رهنمود هنرآموزان، هنرجویان عزیز و صاحب‌نظران وجود دارد که انشاءالله مورد عنایت قرار خواهد گرفت.

پیمانه مهارتی شماره یک

برداشت محصولات

هدف کلی

فراگیر زمان و نحوه برداشت محصولات عمدہ را شناخته، بتواند آنها را به نحو صحیح برداشت نماید.

هدفهای رفتاری: فراگیر پس از گذراندن این پیمانه مهارتی باید بتواند:

- ۱- زمان برداشت محصولات را با توجه به شرایط رسیدن محصول، شرایط جوی، اقتصادی و اجتماعی مشخص نماید.
- ۲- عوامل تلفات یا ضایعات محصول را در ضمن برداشت توضیح دهد.
- ۳- ابزار و وسایل برداشت سنتی را شناخته، بتواند آنها را به کار گیرد.
- ۴- کاربرد ماشین آلات برداشت محصولات زراعی و باگی را توضیح دهد.

مهارتها و اطلاعات مورد نیاز

● سرویس و نگهداری و اتصال ادوات به تراکتور

● کنترل آفات و امراض

زمان (ساعت)	
عملی	تئوری
۳۶	۱۲

آزمون ورودی

۱- گاو رو شدن خاک یعنی چه؟

الف: خشکی مطلق در خاک

ب: وجود حداکثر رطوبت در خاک

ج: موقعی که خاک دارای رطوبتی است که به ادوات کشاورزی نمی‌چسبد.

د: زمانی که فقط چسبندگی رطوبت برای دام وجود دارد.

۲- تفاوت گیاهان بهاره و پاییزه را شرح دهید.

۳- برای هر کدام از موارد زیر حداقل ۲ مثال ذکر نمایید.

الف: گیاهان بهاره

ب: گیاهان پاییزه

ج: گیاهان علوفه‌ای غلات (گرامینه)

د: گیاهان علوفه‌ای لگومینوز

ه: غلات ریزدانه

۴- عوامل اقلیمی مؤثر در رشد و نمو گیاهان مزروعی را ذکر نمایید.

۵- کدام یک از گیاهان زراعی زیر با بذر (دانه) تکثیر می‌شود؟

الف: گندم ب: برنج ج: سیب زمینی

د: چغندر قند ه: نیشکر و: نخود

۶- روش‌های مختلف کاشت بذر را ذکر نمایید.

۷- میزان بذر برای کاشت، به منظور برداشت دانه و علوفه چگونه است؟

الف: در دانه‌ای کمتر است.

ب: در دانه‌ای بیشتر است.

ج: مساوی است.

د: در دانه‌ای مساوی و یا بیشتر است.

۸- عملیات داشت شامل چه مواردی است؟ آنها را نام ببرید.

۹- عواملی را که در زودرسی یک گیاه مؤثرند، ذکر نمایید.

۱۰- چرا پای بوته سیب زمینی خاک داده می‌شود؟ دلایل را ذکر نمایید.

۱۱- هدف از کاشت محصولات زیر، بیشتر تولید چه قسمتی از اندام گیاهی است؟

الف: گندم و جو ...

ب: سیب زمینی ...

ج: چغندر قند ...

د : نیشکر ...

ه : یونجه ...

و : سورگوم ...

۱۲- اصطلاحات و جین، تنک کردن و واکاری را شرح دهید.

۱۳- کدام کود اثر بیشتری در تولید شاخ و برگ و دیررسی دارد؟

الف: ازت ب: فسفر ج: پتاس د: آهک

۱۴- کدام کود شیمیایی موجب تشکیل گل بیشتر، تلقیح و زودرسی می‌گردد؟

الف: آهک ب: پتاس ج: فسفر د: ازت

۱۵- منظور از ورس در گیاه چیست و چه اثری در برداشت به همراه دارد؟ توضیح دهید.

موادغذایی از گیاه به درون دانه انجام می‌شود. در این زمان رنگ برگها و اندامها زرد است.

۲- چنانچه زراعت به منظور مصرف شاخه و برگ آن در تعییف دام انجام شده باشد پس از اطمینان از بالا بودن میزان پروتئین و وزن شاخه و برگ، اقدام به برداشت می‌شود.

۳- در گیاهان غده‌ای مانند سیب‌زمینی که هنوز غدد ریز مجددًا تشکیل شده باشد، موقعی که محصول حداکثر کمیت و کیفیت را داشته و برگها زرد شده باشد، برداشت انجام می‌شود.

۴- محصولات مصرفی بازارهای محلی یا کارخانجات نسبت به محصولات صادراتی یا انبار شونده در مرحله رسیده تری برداشت می‌شوند.

۵- در برداشت محصول به منظور استفاده بذری باید دقت شود که رشد فیزیولوژیکی گیاه کامل شده و جنبین سالم و دوره بلوغ را طی نموده باشد. برای این منظور، غلات در مرحله رسیدن سخت؛ جبوهات در موقعی که غلافها کامل شده و تغییر رنگ داده باشند (عموماً زردرنگ)؛ یونجه موقعی که اکثر نیامها رنگ قهوه‌ای دارند؛ سیب‌زمینی و چغندر قند در مرحله رشد کامل و موقعی که اندامها زردرنگ شده‌اند، برداشت و در محیط‌های مناسب از نظر نور، رطوبت و حرارت نگهداری می‌شوند.

۶- محصول، قبل از عرضه به بازار درجه‌بندی و حتی الامکان بسته‌بندی شود زیرا تمیزی و یکنواختی مورد استقبال مصرف کننده می‌باشد.

۷- با توجه به محدودیت زمانی برداشت محصول، مقدمات لازم فراهم شود تا برداشت در زمان مناسب به سرعت انجام گیرد. تأخیر و تعجیل در برداشت، موجب ضایعات و تلفات محصول خواهد شد.

۸- قبل از برداشت، وضعیت عرضه و یا نگهداری محصول مشخص شود تا محصول برداشت شده مدت زیادی در مزرعه باقی نماند زیرا شرایط مزرعه معمولاً برای نگهداری محصول برداشت شده برای مدت زیادی مناسب نیست و موجب تلفات محصول خواهد شد.

رسیدگی و برداشت محصول

پس از انجام عملیات کاشت و داشت، نوبت به برداشت محصول خواهد رسید که زمان و چگونگی آن بستگی به نوع گیاه و نحوه مصرف آن دارد. برداشت سبزیجات، میوه‌ها، غلات، بیانات صنعتی، گیاهان علوفه‌ای و ... به دلیل تفاوت در نوع محصول و شکل مصرف، متفاوت می‌باشد. بعضی از این محصولات مستقیماً و به صورت تازه به مصرف انسان می‌رسد و بعضی دیگر، پس از تغییر و تبدیل و یا انجام عملیاتی محصول مخصوص بروی آنها مثل گندم، چغندر قند، نیشکر، پنجه و ... قابلیت استفاده پیدا خواهند کرد و تعدادی دیگر به صورت غیرمستقیم مثل گیاهان علوفه‌ای تبدیل به فرآورده‌های دامی شده سپس مصرف خواهند شد و بالاخره بعضی از محصولات پس از برداشت باید با شرایط خاصی انبار شوند تا قابل مصرف گردند. برداشت ممکن است از شاخ و برگ، ساقه، میوه، گل، اندامهای زیرزمینی و ... گیاه انجام گیرد اما به طور کلی جمع‌آوری محصول را در زمانی که از بیشترین کمیت و کیفیت برخوردار باشد «برداشت» می‌گویند. برداشت به موقع و رعایت نکات و اصول فنی مربوط به آن از نکات حساس تولید محصولات کشاورزی است. زیرا :

- برداشت به موقع باعث بالا بودن کیفیت محصول و ارزش تجاری آن می‌گردد.
- عملکرد محصول در برداشت به موقع بیشتر است.
- وسایل و ماشین آلات در برداشت به موقع، کارآیی بیشتری دارد.

- حمل، نگهداری و انبارداری محصولات به نحو بهتری انجام می‌شود.

اصول برداشت محصولات

برداشت بسته به اینکه محصول را به چه منظور کشت کرده باشند متفاوت است. مثلاً :

۱- اگر کشت به منظور ایجاد دانه (غلات و جبوهات) صورت گرفته باشد پس از کامل شدن دانه و توقف حرکت

<p>پیمانه مهارتی: برداشت محصولات شماره شناسایی: ۹۱۰۷۹/ک</p>	<p>مهارت: آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات شماره شناسایی: ۹۱۰۷۹/ک</p>
---	--

جدول ۱-۱- علائم رسیدن بعضی از گیاهان زراعی

ملاحظات	علام رسیدن	گیاه مزروعی	منظور از زراعت
<p>به خصوصیات رقم کشت شده از قبیل زودرسی توجه گردد. امکان خشک کردن محصول در بعضی موارد و برداشت زودتر وجود دارد.</p>	<p>گیاه رشد کافی کرده، حرکت مواد غذایی از گیاه به درون دانه متوقف و دانه سخت گردیده باشد. برگها زرد شده باشد، غلاف حبوبات زرد و یا قهوه‌ای شده باشد.</p>	<p>گندم، جو، ذرت، ارزن، برنج، حبوبات</p>	<p>دانه</p>
<p>در جمع آوری، به آمادگی انبار و حمل و نقل بوته‌ها به گل رفته و ارتفاع محصول خوب باشد. سرمای پاییزه وجود دارد ذرت در مرحله شیری برداشت شود.</p>	<p>در یونجه، شبدر و اسپرس، حدود ۲۰ درصد در ذرت علوفه‌ای دانه شیری به خمیری تبدیل شده باشد.</p>	<p>یونجه، شبدر، اسپرس، ذرت علوفه‌ای به منظور سیلو</p>	<p>شاخ و برگ</p>
<p>فاصله بین دو برداشت رعایت شود.</p>	<p>ساقه هنوز سبز، تویر و قوی باشد. آزمایش، میزان قند را حداقل از ۱۰ تا ۱۲ درصد نشان دهد.</p>	<p>نیشکر</p>	<p>ساقه</p>
<p>پس از برداشت، کالله‌ها باید در محل سروپوشیده و سایه (دور از تابش آفتاب) خشک شود.</p>	<p>موقعی که گلها ظاهر می‌شوند. پس از باز شدن اولین گلها و شکفتن آنها برداشت کالله‌ها و گلها انجام می‌شود. شادابی گلها ۴ تا ۵ روز بیشتر نیست.</p>	<p>زعفران</p>	<p>گل</p>
<p>برداشت در چند چین صورت می‌گیرد.</p>	<p>برگها از پایین شروع به زرد شدن کرده باشد. بوی توتون به مشام برسد.</p>	<p>تونون و تباکو</p>	<p>برگ</p>
<p>در صورت وجود خطر سرمای پاییزه، برداشت زودتر انجام شود.</p>	<p>به حداکثر رسیده باشد. برگها زرد شده و در چندر قند درصد قند در حداکثر باشد و در سیب زمینی هنوز غدد ریز تشکیل نشده باشد.</p>	<p>چغندر قند، سیب زمینی</p>	<p>رشه و اندامهای زیرزمینی</p>
<p>برداشت در چند چین صورت می‌گیرد.</p>	<p>باز شدن غوزه‌ها، کاهش رطوبت و شرک شفافیت خاص پنبه آشکار شده باشد.</p>	<p>پنبه</p>	<p>میوه</p>

شرایط جوی زمان برداشت

شرایط جوی زمان برداشت، اثر مستقیمی بر کمیت و کیفیت محصول دارد. در شرایط مناسب از نظر رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد، شدت تابش و بارندگی، ضایعات محصول در حداقل خواهد بود و کیفیت محصول نیز به نحو مؤثری محفوظ باقی خواهد ماند اما هر قدر این شرایط از حالت طبیعی فاصله داشته باشد بازدهی دچار کاهش پیشتری خواهد شد. در برداشت ماشینی رعایت این نکات ضرورت پیشتری دارد.

کار عملی

با بازدید از ایستگاههای هواشناسی با چگونگی اندازه‌گیری رطوبت نسبی، شدت باد، جهت باد و تعیین درجه حرارت آشنا شوید.

شرایط جوی مناسب در برداشت غلات: از برداشت غلات در مواقعي که رطوبت هوا خیلی بالاست و یا شبنم به مقدار زیادی روی نبات قرار گرفته است باید خودداری شود. بنابراین در مناطق مرطوب که حداقل شدت رطوبت نسبی بین ساعت ۲۲ تا ۴ صبح است و این اندازه به بیش از ۸۵ درصد نیز می‌رسد برداشت در شب مناسب نخواهد بود. بهترین زمان برداشت بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ و حداقل ساعت برداشت بین ۹۰ تا ۲۰ می‌باشد.

– در صورت ریزش باران در موقع برداشت، لازم است حداقل به مدت ۲۴ ساعت از برداشت محصول خودداری شود تا رطوبت باران از سطح گیاه تبخیر شده، اندامهای گیاه خشک شوند.

– شدت تابش نور در برداشت مؤثر است. در مناطق گرم و خشک برداشت از ساعت ۶ صبح شروع شده، تا ساعت ۱۲ ادامه خواهد داشت. از ساعت ۱۲ به بعد برداشت به دلیل شدت تابش مشکل و دارای ضایعات خواهد بود.

– در مناطق معتمد و با رطوبت نسبی پایین، محدودیت زیادی برای برداشت در ساعات مختلف وجود نخواهد داشت.

– در مواقعي که جریان باد شدت داشته باشد امکان برداشت

تفاوت رسیدن فیزیولوژیکی و تجاری

در رسیدن فیزیولوژیکی، رشد طبیعی محصول کامل است و دیگر به وزن خشک آن اضافه نمی‌شود. بسیاری از محصولات کشاورزی پس از رسیدن فیزیولوژیکی قابل برداشت و استفاده هستند مثل انواع غلات و حبوبات و اکثر گیاهانی که از دانه آنها به عنوان بذر استفاده می‌شود (چون رشد جنین در دانه کامل شده است).

اما باید توجه داشت که بعضی از محصولات در زمان رسیدن فیزیولوژیکی بازار مناسبی ندارند و در مرحله قبل و یا بعد از آن ارزش اقتصادی و تجاری پیشتری دارند. از قبیل :

- ۱- میوه‌هایی با بافت گوشتی آبدار (خیار و بادمجان)
- ۲- میوه‌هایی با بافت گوشتی کم آب (نخود سبز، لوبیای سبز و ذرت شیرین) که قبل از رسیدن فیزیولوژیک برای عرضه به بازار مصرف مناسب می‌باشند.

۳- در بعضی دیگر از محصولات مثل سیب، مرکبات، موز، گوجه فرنگی و خرما بین پایان یافتن مراحل رشد و شروع رسیدن برای مصرف فاصله کم و پیش طولانی به نام بلوغ دیده می‌شود تا محصول آماده و مطلوب مصرف باشد. میوه موز و خرما در مرحله بلوغ، دارای مزه مناسب نیستند و قابل مصرف نمی‌باشند ولی بعد از مدتی دارای طعم و ترکیبات مناسب قابل مصرف می‌گردند که در این زمان رسیدن تجاری و قابلیت عرضه به بازار را پیدا می‌کنند.

پس آموختیم که در رسیدن فیزیولوژیکی رشد اندامها کامل است و پس از آن به وزن خشک محصول چیزی اضافه نمی‌شود اما در رسیدن تجاری محصول قابل عرضه به بازار بوده، ممکن است این زمان مصادف با رسیدن فیزیولوژیکی نباشد.

کار عملی

بازدید از مزارعی که گیاهان آن در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی و تجاری است.

<p>پیمانه مهارتی: برداشت محصولات شماره شناسایی: ۹۱۰۱۷۹ ک</p>	<p>مهارت: آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات شماره شناسایی: ۹۱۰۱۷۹ ک</p>
--	---

- ۳- هزینه ماشین آلات برداشت؛
- ۴- بازار مصرف خصوصاً عرضه و تقاضا؛
- ۵- راههای ارتباطی و دوری و نزدیکی محل تولید تا مصرف؛
- ۶- وسایل حمل و نقل؛
- ۷- وجود کارخانجات صنایع غذایی مربوط؛
- ۸- وسایل بسته‌بندی و بازاریابی.

فکر کنید

– چند عامل دیگر را شما ذکر نمایید.

به سؤالات زیر با تحقیق و بررسی پاسخ دهید.

- ۱- برخی عوامل موجب تسریع در برداشت حتی قبل از رسیدن محصول می‌شود. آنها را با ذکر دلیل شناسایی و معرفی نمایید.
- ۲- تعدادی از عوامل اقتصادی باعث تأخیر در برداشت و حتی از بین رفتن قسمتی از محصول می‌شوند. با ذکر دلیل آنها را مشخص و معرفی نمایید.
- ۳- تأثیر عوامل اقتصادی را در برداشت هر مورد تحقیق نمایید.

شرایط اجتماعی

- ۱- سلیقه مصرف کنندگان مثل استفاده از محصول در حالات مختلف رسیدگی در جوامع مختلف (لوبیای سبز یا دانه لوبیا)؛
- ۲- وجود نیروی انسانی؛
- ۳- آداب و سنتها مثل لزوم استفاده از محصول در مراسم، اعیاد، جشنها و عزاداریها؛
- ۴- لوکس گرایی یا تجمل گرایی مثل استفاده از میوه‌های خارج از فصل؛
- ۵- خبرگی نیروی انسانی در برداشت محصول؛
- ۶- بحرانهای اجتماعی مثل جنگ و انقلاب؛
- ۷- ... عوامل دیگر را شما مشخص نمایید.

به دلیل ریش دانه، شکسته شدن ساقه‌ها و ... وجود نخواهد داشت.
شرایط جوی مناسب برداشت گیاهان علوفه‌ای:
۱- چنانچه محصول بسیار خشک باشد و قصد انتقال محصول را داشته باشید باید در صبح زود برای استفاده از رطوبت صحیحگاهی برای برداشت محصول اقدام نمایید.
۲- در صورت مرطوب بودن محصول، باید پس از برطرف شدن شبیم و رطوبت صحیحگاهی برداشت را انجام دهید.
۳- در هنگامی که جریان باد از شدت زیادی برخوردار است از برداشت محصول اجتناب نمایید.

شرایط جوی مناسب برای برداشت گیاهان صنعتی:
۱- در پنهان، برداشت پس از ساعت ۱۰ صبح و در هوای آفتابی و هنگامی که شبیم یا رطوبت روی محصول از بین رفته باشد انجام می‌شود. در هنگام بارندگی باید از برداشت خودداری شود. برداشت در ساعات و مواقع مرطوب، باعث کاهش شدید کیفیت، از جمله تغییر رنگ الیاف و در نتیجه کاهش قیمت و ارزش محصول خواهد شد.
۲- در چغندر قند و سیب زمینی در موقع برداشت در صورت سفت بودن زمین، رطوبت برای گاور و شدن خاک ضروری است اما رطوبت زیاد محیط برای توده‌های محصول جمع آوری شده مناسب نیست.

شرایط اقتصادی و اجتماعی برداشت

شرایط اقتصادی و اجتماعی، عواملی هستند که در زمان و چگونگی برداشت مؤثراند و حتی در کاهش و توسعه سطح زیر کشت و موفقیت در زراعت نقش عمده‌ای را به عهده دارند. شناسایی این عوامل می‌تواند کمک بسیار زیادی برای برنامه‌ریزی در تعیین زمان برداشت، استفاده از ارقام مناسب، تهیه امکانات و حصول موفقیت برای تولیدکننده به همراه داشته باشد.

شرایط اقتصادی

- ۱- میزان سرمایه؛
- ۲- مزد کارگر؛

پیمانه مهارتی: برداشت محصولات شماره شناسایی: ۱۰-۹-۱-۷۹/ک	مهارت: آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات شماره شناسایی: ۹-۱-۷۹/ک
---	---

۴- پوسیدگی و کپک زدن محصول در مراحل برداشت و انبار کردن.

به سوال زیر با تحقیق و بررسی پاسخ دهید.
تعدادی از عوامل اجتماعی مؤثر در برداشت خارج از فصل محصول را با ذکر دلیل مشخص نماید.

کار عملی

بازدید از مزارع و محصولاتی که به دلیل تعجیل در برداشت زیان دیده اند.

تلفات ناشی از تأخیر در برداشت:

۱- کاهش محصول به دلیل ریزش دانه در اکثر محصولات؛

۲- ضایعات ناشی از خسارت آفات مثل گنجشک در غلات؛

۳- کاهش کیفیت محصول؛

۴- کاهش ارزش غذایی مثل کاهش پروتئین و ویتامینها و خشبي شدن گیاهان علوفه‌ای یا کاهش عیار قند در چغندرقند.

کار عملی

بازدید از مزارعی که به دلیل تأخیر در برداشت با ریزش دانه و محصول مواجه شده اند.

تلفات ناشی از خبره نبودن برداشت کننده:

۱- ریزش محصول در مراحل مختلف؛

۲- باقی ماندن قسمتی از محصول در مزرعه؛

۳- طولانی شدن دوره برداشت و افزایش ضایعات ناشی از تأخیر در برداشت؛

۴- کاهش کیفیت محصول مثل خرد یا ریز شدن آن.

تلفات ناشی از تنظیم نبودن ماشین آلات:

۱- برداشت نشدن قسمتی از محصول؛

۲- ریزش محصول در هنگام برداشت؛

۳- باقی ماندن محصول در کاه و کلش و اندامهای گیاهی (جداسازی نامطلوب محصول از بقایای گیاهی)؛

۴- کاهش کیفیت محصول به دلیل خالص نبودن (وجود مواد جامد و بقایای گیاهی در محصول)؛

وضعیت خاک در موقع برداشت

در موقع برداشت محصول، وضعیت خاک بر حسب نوع گیاه و فصل برداشت متفاوت خواهد بود. اما به طور کلی:

۱- برای برداشت محصولات مختلف رطوبت خاک باید به حدی باشد که مزاحمتی برای ماشین آلات یا نیروی انسانی برداشت کننده ایجاد نکند.

۲- برای برداشت اکثر گیاهان زراعی مثل غلات، حبوبات و نباتات صنعتی باید سطح خاک خشک باشد.

۳- به هنگام برداشت گیاهان غده‌ای و ریشه‌ای برای خارج کردن محصول از زمین باید خاک دارای رطوبت مناسبی در حد گاورو بودن باشد.

۴- در صورت برداشت ماشینی، باید سطح خاک هموار، پستی و بلندیها مثل انهر آبیاری از بین برده شود تا امکان برداشت مطلوب فراهم آید.

تلفات یا ضایعات محصول در ضمن برداشت

عوامل مختلفی از قبیل تعجیل در برداشت، تأخیر در برداشت، خبره نبودن برداشت کننده، تنظیم نبودن ماشین آلات و عدم رعایت ساعت برداشت، موجب بروز تلفات یا ضایعات در محصول هنگام برداشت می‌گردد.

تلفات ناشی از تعجیل در برداشت:

۱- کاهش محصول به دلیل عدم رشد و تکامل گیاه خصوصاً در گیاهان علوفه‌ای؛

۲- در برداشت ماشینی غلات، دانه‌ها در اثر فشار داخلی دستگاههای ماشین برداشت به صورت خمیر درآمده، محصول از بین می‌رود؛

۳- کاهش کیفیت محصول؛

روش کار و نکات ایمنی

- ۱- در موقع کار باید از لباس کار استفاده شود. خصوصاً به کفش مناسب نیاز است.
- ۲- اتصال دسته بیل به کاسه بیل باید به خوبی انجام شده باشد.
- ۳- از بیل مناسب (نوك تیز) برای برداشت استفاده نمایید.
- ۴- کار را به صورت ایستاده انجام دهید تا از خستگی و فشار به ستون فقرات جلوگیری شود. برای این کار دسته بیل باید بلند و مناسب باشد.

کار عملی

قسمتی از محصول یک مزرعه (سیب زمینی، پیاز، سیر، چغندر، هویج و ...) را بدون ایجاد ضایعات به دقت برداشت نمایید و بازدهی برداشت را تعیین کنید. تحقیق نماید آیا یک نفر قادر است بیشتر از ۵۰ متر مربع زمین را با کار متعارف روزانه برداشت نماید.

- ۵- کاهش محصول به دلیل خرد، ریزو له شدن محصول در مراحل برداشت.

کار عملی


بازدید از تلفاتی که در اثر تنظیم نبودن دستگاه برداشت ایجاد شده است.

تلفات ناشی از رعایت نکردن ساعات برداشت:

- ۱- در مواقع مرتبط بودن محیط و یا اندامهای گیاهی، امکان له شدن ساقه ها و درو نشدن کامل محصول وجود خواهد داشت.
- ۲- محصول مرطوب در خرمکوب ایجاد اشکال می نماید و دانه ها به خوبی از ساقه و خوشه جدا نمی شود.
- ۳- رطوبت، موجب ایجاد فساد در محصول جمع آوری شده می گردد.
- ۴- در مواقع خیلی گرم و خشک، ساقه ها شکننده شده، سبب ریزش دانه می شود.

ابزار و وسائل برداشت سنتی

بیل: بیل از یک دسته چوبی و یک صفحه فلزی تشکیل شده است. دو نوع مهم آن شامل بیل شخم و بیل ساختمانی است. در بیل شخم، صفحه فلزی ذوزنقه ای شکل و دارای نوك تیز می باشد و در روی دسته بعضی از آنها زایده ای برای قرار دادن پا و فشار بیشتر وجود دارد. اما بیل ساختمانی دارای صفحه مربع مستطیل یا تقریباً قلبی شکل با کمی فرورفنگی است از بیل ساختمانی برای تسطیح، مرزبندی و آبیاری استفاده می شود. ولی از بیل شخم یا بیل نوك تیز، برای زیر و رو کردن خاک در موقع شخم و یا برداشت محصول (گیاهان غده ای و ریشه ای) استفاده می شود. هر چند که کیفیت برداشت محصول با بیل می تواند مناسب باشد اما بازدهی برداشت پایین است.



شكل ۱-۱- انواع بیل


چنگک و چهارشاخ: وسایلی هستند شبیه بیل یا یبلچه که به جای صفحه یا کاسه بیل دارای ۳ یا ۴ دندانه به طول حدود ۳۰ سانتیمتر می‌باشند و دندانه‌ها ممکن است به صورت مستقیم یا کمی خمیده قرار گیرند و یا از وسط به صورت زاویه قائمه خم شوند.



شکل ۲-۱- چنگک و چهارشاخ



شکل ۲-۲- دو نوع داس غاله



شکل ۲-۳- داس شامیله با گهواره



شکل ۲-۴- داس شامیله با گهواره

از چنگک برای برداشت محصولات غده‌ای، پیازی و ریشه‌ای مثل چغندر، سیب زمینی، پیاز، سیر و ترب، در سطوح کوچک به دلیل پایین بودن بازدهی کار استفاده نمایید.

از چهارشاخ که عموماً جنس سبکتری دارد برای زیر و رو کردن و حمل محصولات علوفه‌ای، باد دادن خرمن و ... استفاده کنید.

داس: در برداشت سنتی، بخصوص برداشتِ غلات و گیاهان علوفه‌ای، از انواع داس برای درو استفاده می‌شود. داس دارای دو نوع دسته کوتاه و دسته بلند است و علاوه بر دسته از یک تیغه منحنی فلزی برای برش (درو) تشکیل شده است. دسته عموماً چوبی است.

کار با داس دسته کوتاه به صورت نشسته انجام می‌شود. بازدهی کار با این داس کم است و یک نفر به طور متعارف حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع را روزانه می‌تواند برداشت نماید (شکل ۲-۳).

برای سرعت عمل و سهولت در حرکت از داس دسته بلند استفاده می‌شود (شکل ۲-۴) که کارگر به صورت ایستاده با این داس کار می‌کند. بازدهی داس دسته بلند بیشتر و حدود ۴۰۰۰ متر مربع در روز (۸ ساعت کار) می‌باشد (شکل ۲-۵).



شکل ۲-۵- انواع وسایل دستی


ماشین‌آلات برداشت

دروگرها در نوع ماشینی به ۳ صورت (دامی، تراکتوری و موتوردار) وجود دارند.

دروگرها (موورها)
دستگاههایی که برای درو علوفه یا غلات مورد استفاده قرار می‌گیرند دروگر (موور) نامیده می‌شوند.



شکل ۱-۶— انواع ماشین‌آلات برداشت محصول در حال کار



شکل ۱-۷- دروگر دامی



شکل ۱-۸- دروگر شانه‌ای تراکتوری



شکل ۱-۹- طرز کار دروگر شانه‌ای

دروگر دامی

به وسیله دام کشیده می‌شود و دارای ۲ چرخ حامل آهنی بزرگ است. نیروی لازم برای حرکت رفت و برگشتی تیغه با حرکت یکی از چرخها تأمین می‌گردد. تیغه‌ها به صورت دندانه و از جنس فلز است. به دلیل پایین بودن بازدهی، در حال حاضر این نوع دروگرها کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل ۱-۷).

دروگرهای تراکتوری

این دروگرها به وسیله تراکتور حمل می‌شوند و نیروی رفت و برگشتی و محرک تیغه‌های برش با بی‌تی او تراکتور تأمین می‌شود و به دو دسته شانه‌ای و دوار (بشقابی) تقسیم می‌شوند. که از این دروگرها نوع شانه‌ای ذیلاً توضیح داده می‌شود.

دروگرهای شانه‌ای

این دروگرها از قسمتهای زیر تشکیل شده‌اند: (شکل ۱-۸)

۱- دستگاه انتقال حرکت (شامل تسممه، چرخ دندانه، چلاق دست، گاردان و ...):

۲- کفش و کفسکهای داخلی و خارجی:

۳- صفحه و میله ردیف‌ساز:

۴- قسمتهای برش دهنده:

۵- ضامن اینمی اتصال ۳ قطعه:

۶- قاب دستگاه.

نحوه اتصال به تراکتور: (شکل ۱-۹)

۱- ابتدا بازوی چپ و سپس بازوی راست، به تراکتور وصل می‌گردد.


۲- در مرحله بعد گاردان به شفت پی‌تی او وصل و تراز می‌شود.

۳- کنترل حرکت جانبی به وسیله زنجیرهای بغل انجام می‌شود.


- ۲- در صورت تراکم زیاد علوفه و یا ناهموار بودن زمین سرعت را کاهش دهید.
- ۳- از ضامن ایمنی (در صورت موجود بودن) برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه استفاده نمایید. (در صورت گیر کردن علوفه بین تیغه ها و یا وجود مانع سخت در مقابل دستگاه شانه آزاد می شود و با حرکت به عقب، مانع از وارد آمدن خسارت به دستگاه می گردد) (شکل ۱-۱).

طرز کار: دروگر شانه ای حرکت را از بین تیغه ها او گرفته، با حرکت منتقل شده به تیغه ها و رفت و برگشت آنها، علوفه بریده و درو می شود. علوفه درو شده با عبور از روی شانه در قسمت پشت دروگر روی زمین قرار می گیرد. صفحه جدا کننده، علوفه را به صورت نوار درمی آورد.

۱- برای کار با دستگاه، سرعت تراکتور را بین ۵ تا ۸ کیلومتر در ساعت تنظیم کنید.



شکل ۱-۱۰- قطعات تشکیل دهنده شانه یک دروگر شانه ای



شکل ۱-۱۱


تنظیمات دستگاه

الف - تنظیم تطابق: تیغه اره را طوری تنظیم نمایید تا در مرحله رفت و برگشت، خط وسط هر تیغه با خط وسط انگشتیها منطبق باشد.

ب - تنظیم نگهدارنده تیغه: اگر فاصله تیغه با نگهدارنده آن زیاد باشد تیغه لق می زند و اگر این فاصله کم باشد تیغه خمیده می شود و در هر دو حال عمل برداشت به خوبی صورت نمی گیرد. برای تنظیم نگهدارنده از دو روش استفاده می شود یا از راه خم کردن نگهدارنده (بیشتر در دروگرهای سبک) و یا با اضافه و کم کردن فاصله انداز که بیشتر در دروگرهای سنگین قابل اجراست (شکل ۱-۱۱).

ج - تنظیم تقدم شانه برش: (شکل ۱-۱۲) در موقع کار، شانه برش باید با چلاق دست در یک خط و عمود بر جهت حرکت قرار داشته باشد. از آنجا که در موقع برداشت مقاومت و فشار محصول تیغه را به عقب می‌راند، قبل از شروع کار باید تیغه کمی به طرف جلو قرار داشته باشد تا موقع کار با عقب آمدن، تیغه کاملاً به صورت عمود بر جهت حرکت قرار گیرد.

طرز تنظیم:



شکل ۱-۱۲ - تنظیم تقدم شانه برش

۱- تراکتور را به صورت خاموش و بدون حرکت همراه با دروگر روی زمین مستطحی تراز نمایید.

۲- انتهای بیرون شانه را به عقب بکشید تا لقی آن از بین برود.

۳- تیرک یا خط چوب مستقیمی را در جلوی چرخهای تراکتور قرار دهید. اختلاف فاصله ابتدا و انتهای شانه را تا تیرک بدهست آورید. این اختلاف باید به ازای هر 5° سانتیمتر طول شانه یک سانتیمتر باشد.

د - تنظیم ارتفاع برش: برای تنظیم ارتفاع برش، از بالا و پایین بردن شانه برش استفاده نمایید.

برای تغییر ارتفاع شانه برش، از تغییر ارتفاع بین کفش و کفشک که با چند پیچ بهم متصل هستند، استفاده کنید.

دقت شود هر دو کفش به یک ارتفاع از سطح زمین تنظیم شود (شکل ۱-۱۳).



شکل ۱-۱۳ - دروگر شانه‌ای در حین کار



شكل ۱۴-۱- دروگر دوار

سرویس و نگهداری دروگرهای شانه‌ای:

- ۱- دروگر را پس از کار روزانه تمیز کنید.
- ۲- یاتاقانها را بررسی نموده، در صورت نیاز گرسکاری یا تعویض نمایید.
- ۳- صفحات انگشتی، انگشتیها، تیغه‌ها و گیره‌ها را بازدید کرده، قسمتهای آسیب‌دیده را مرمت یا تعویض نمایید.
- ۴- تسمه فلکه را بازدید و در صورت معیوب بودن (ترک خوردن) تعویض نمایید.
- ۵- گرس خورها را تمیز کرده، در صورت نیاز تعویض نمایید.

۶- پیچ و مهره‌ها را در صورت نیاز سفت نمایید. قسمتهای پرچ شده در صورت نیاز باید تعویض گردد.


دروگرهای دوار

در این دروگرهای محصول به وسیلهٔ لبه تیغه که دارای حرکت دورانی است درو و برش می‌شود. دروگرهای دوار به دو نوع عمودی و بشقابی تقسیم می‌شوند (شکل ۱۴-۱).

الف- دروگر دوار عمودی: در این دروگر، تیغه‌ها روی یک محور دوار قرار گرفته‌اند و مجموعاً تیغه‌ها و محور، داخل یک محفظه قرار دارند. از این پوشش و محفظه برای حفاظت تیغه‌ها و جلوگیری از پخش شدن علوفه برباد شده استفاده می‌شود (شکل ۱۵-۱).



شكل ۱۵-۱- دروگر دوار در
حال کار



شکل ۱۶-۱- تنظیم دروگر دور

ب- دروگر دور افقی: در این دستگاه تیغه‌ها به صورت بشقابی هستند و هر یک دارای یک محور جداگانه می‌باشند. سرعت حرکت بشقابها زیاد و حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه می‌باشد. افزایش تعداد دور به وسیله چرخ دنده و تسمه (از ۵۴۰ تا ۱۰۰۰ دور بی‌تی او به ۳۰۰۰ دور) انجام می‌گردد. روی تیغه‌ها یک پوشش عموماً بزرگی برای جلوگیری از پخش شدن علوفه قرار دارد.

تنظیم: تنظیم اصلی این دروگر مربوط به قرار گرفتن روی زمین می‌باشد و به دلیل سادگی دستگاه، معمولاً نیاز به تنظیمات دیگری ندارد. برای تنظیم تراز کردن از بازوی رابط و بازوی سوم استفاده نمایید (شکل ۱-۱۶).

سرویس و نگهداری: قسمتهای گریس خور بازدید و گریس کاری شود. تیغه‌ها بازدید و در صورت کند بودن تیز شوند و تیغه‌های شکسته تعویض گردد.

قسمتهای معیوب، برای جلوگیری از زنگ زدن به رنگ یا روغن آغشته گردد.

دروگرهای موتوردار

این دروگرهای دارای موتور مستقل برای حرکت دستگاه و حرکت تیغه بشش هستند و در انواع مختلف دو چرخ، سه چرخ، چهار چرخ و به صورت پایه کوتاه و پایه بلند وجود دارند. جلوبرندی این دستگاهها عموماً قابل تعویض برای برداشت غلات یا علوفه می‌باشد. در بعضی از این دروگرهای دستگاه بسته‌بند علوفه نیز وجود دارد (شکل ۱-۱۷).



شکل ۱۷-۱- دروگر موتور بایندر



الف



ب

بازدهی کار این دروگرها در روز ۳ تا ۵ هکتار است، اما این مقدار، در انواع دو چرخ، کمتر است.

تنظیم: در اکثر موارد، همانند دروکنهای تیغه ارها تراکتوری انجام می شود.

سرویس و نگهداری:

۱- بعد از هر ۲۴ ساعت کار، روغن موتور را تعویض نمایید.

۲- هواکش را پس از هر ۸ ساعت کار با بنزین تمیز کنید.

۳- فیلتر گازوئیل، پس از مصرف چهار باک سوخت با بنزین یا گازوئیل تمیز و در پایان هر فصل کار تعویض شود.


۴- گریس خورها را گریس کاری نمایید.

۵- سرویس دروکنهای تیغه ای تراکتوری بر روی این دروگرها نیز انجام شود.

شکل ۱۸-۱- انواع مووربايندر

کمباین غلات

ماشین برداشت کامل غلات «کمباین» نام دارد که شامل چهار قسمت دروکن، خرمنکوب، بوجاری و تمیزکن می‌باشد. برای کار کردن با کمباین به مهارت در رانندگی و شناخت قسمتهای مختلف کمباین نیاز است (شکل ۱-۱۹).



یک کمباین از چهار قسمت اساسی: دروکن، خرمنکوب، بوجاری و تمیزکن ساخته شده است.

شکل ۱-۱۹—قسمتهای داخلی کمباین

تنظیمهای مهم کمباین

- ۱—سرعت معمول ۳ تا ۵/۵ کیلومتر در ساعت می‌باشد.
- ۲—ارتفاع چرخ فلکه باید آنقدر باشد که پایین‌ترین نقطه آن تقریباً زیر خوشها قرار گیرد.
- ۳—چرخ فلکه باید دارای سرعتی باشد که خوشها به آرامی به طرف دروگر رانده شود.
- ۴—در خرمنکوب اگر دانه‌ها شکسته و خرد می‌شوند سرعت دوران زیاد است و اگر از خوشه جدا نمی‌شوند سرعت کوبنده کم است.

سرعت را تنظیم نمایید (از دفترچه راهنمای کمباین نیز می‌توانید استفاده کنید) (شکل ۱-۲۰).



شکل ۱-۲۰—کمباین غلات در حال کار

سرویس و نگهداری کمباین

- ۱- تیغه شانه بش را در صورت معیوب بودن تعویض نمایید.
- ۲- گریس خورها را روزانه گرسکاری کنید.
- ۳- تسمه نقاله اگر از نوع زنجیری است روغن کاری نمایید.
- ۴- سرویس و نگهداری قسمت تمیزکن را انجام دهید.
- ۵- کلیه تسمه فلکه ها را بررسی کرده، آنها را محکم کنید و اگر ترک خورده بود، تعویض نمایید.
- ۶- تایرها را بررسی، تنظیم و قسمتهای گریس خور را از گریس پر نمایید.

فاصله کوبنده تا نیم کوبنده نیز باید مناسب باشد تا از شکسته شدن دانه ها و یا جدا نشدن آنها جلوگیری نماید.
۵- قسمت بوخاری و حرکت رفت و برگشت کلش بر باید تنظیم شود. اگر دانه ها همراه کلش از کمباین خارج می شوند سرعت حرکت زیاد است و اگر مقدار زیادی کاه و کلش وارد تمیزکن می شود سرعت کم است (از کتابچه راهنمای توانید برای تنظیم سرعت استفاده نمایید).
۶- در قسمت تمیزکن سرعت باد بادبزن را مطابق نوع محصول تنظیم نمایید.




شكل ۱-۲۱- کمباین

قسمت اساسی زیر تشکیل شده است (شکل ۱-۲۲).

- ۱- قطعات عامل (کوبنده و ضد کوبنده)؛
- ۲- قطعات پاک کننده (بادبزن و غربالها)؛
- ۳- قسمتهای محرک و مولد (تراکتور، موتور، سسمه و پولی).

خرمنکوبهای ماشینی عمدتاً از دو نوع تراکتوری و موتوردار (تیلر) تشکیل شده‌اند. اساس کار دستگاههای تراکتوری یا موتوری (تیلر) تقریباً مشابه است و ساختمان خرمنکوبها از سه



شکل ۱-۲۲- ساختمان خرمنکوب



شکل ۱-۲۳- خرمنکوب با موتور تیلر در حال کار

کاربرد و استفاده از خرمنکوبها: استفاده از خرمنکوبها، با رعایت نکات اینمی به سهولت انجام می‌شود.

- ۱- ابتدا خرمنکوب به نیروی محرک تراکتور یا موتور تیلر وصل می‌شود.

- ۲- نیروی محرک پس از انتقال به خرمنکوب، موجب شروع به کار خرمنکوب خواهد شد. (در تراکتور، بی‌تی او نیرو را منتقل خواهد کرد).
- ۳- از محل ورود خوشة محصول به داخل خرمنکوب ریخته می‌شود (شکل ۱-۲۳).

تنظیم خرمنکوب

- ۱- سرعت کوبنده برای لوبیا و دانه‌های روغنی، کم و برای گندم و جو، بیشتر است.
- ۲- فاصله کوبنده و ضد کوبنده براساس، توضیحات کتابچه راهنمای تنظیم شود تا از شکستگی دانه‌ها جلوگیری به عمل آید.
- ۳- سرعت بادبزن باید تنظیم شود به صورتی که دانه با کاه

و کلش از خرمنکوب خارج نشود و داخل دانه‌ها نیز کاه و کلش وجود نداشته باشد.

سرویس و نگهداری

- تسمه‌هارا کنترل و در صورت معیوب بودن تعویض نماید.
- غربالها را بررسی و در صورت نیاز، آنها را تعمیر یا تعویض کنید.
- قسمتهاي کوبنده و ضد کوبنده را بازدید و در صورت نیاز تعمیر و یا تعویض کنید.
- روغن کاری قسمتهاي محرک را بموقعاً انجام دهید.

غده کنها

غده کنها، دارای انواع مختلفی هستند. بعضیها فقط غده را از زیر خاک خارج می‌کنند و برداشت محصول خارج شده به وسیله دست ادامه خواهد یافت. در انواع نیمه خودکار و یا خودکار محصول پس از خارج شدن از زمین به وسیله دستگاه از اندامهای گیاهی جدا شده، حتی در کماینهای برداشت، غده تمیز و درجه‌بندی نیز می‌شود. بجز بعضی از کماینهای کامل بقیه ماشینهای غده کن از نیروی محرک تراکتور استفاده می‌کنند (شکل ۲۴-۱).

نحوه اتصال غده‌کنها به تراکتور: این دستگاهها عموماً کششی هستند. اگر دستگاه دارای سه نقطه اتصال باشد ابتدا بازوی سمت چپ و سپس بازوی سمت راست متصل می‌شود. پس از اتصال بازوی وسط، اتصال گاردان به شفت پی‌تی او انجام می‌شود. در غده‌کنهاي معمولی که فقط زمین یعنی پسته‌های کاشت را در زراعت ردیفی زیورو می‌کنند گاردان وجود ندارد.


تنظیم غده‌کنها

۱- تنظیم عمق کار: عمق کار دستگاه هیدرولیک یا چرخ تنظیم را به گونه‌ای تنظیم کنید که عمیق‌ترین محصول از خاک خارج شود.

۲- تنظیم حرکت تراکتور: پیش روی و حرکت تراکتور (شکل ۲۵-۱) باید به صورتی باشد که تیغه‌ها در جهت ردیف محصول قرار داشته باشد.




شکل ۲۴-۱- غده کن (سیب‌زمینی کن)



شکل ۲۵-۱- تنظیم فاصله چاقو تا چرخ کنگره‌دار

بالا بیندید که فقط شاخ و برگ و قسمت کمی از تاج را ببرد (شکل ۱-۲۶).


۳- در غده کهای چندر در صورت کامل بودن دستگاه:
الف: اگر ماشین دارای چاقوی دوار باشد آن را آنقدر



شکل ۱-۲۶- تنظیم فلکه انگشتی

باید حدود ۷ تا ۱۰ میلیمتر باشد (شکل ۱-۲۷).
د: در چندر کن فاصله عقب تیغه ها حدود ۳۸ میلیمتر است (شکل ۱-۲۷).

ب: فلکه انگشتی را آنقدر پایین بیندید که نوک انگشتی تقریباً با سر چندر تماس داشته باشد.
ج: در دستگاه چندر یاب، فاصله چاقو و چرخ کنگره دار



ته تیغه باید کاملاً تراز باشد مگر در زمینهای مرطوب که بهتر است کمی به طرف بالا متمایل شود.

فاصله قسمت عقب برای چندرهای متوسط ۳۸ میلیمتر ولی برای چندرهای خیلی بزرگ، باید بیشتر باشد.

شکل ۱-۲۷- تنظیم تیغه چندر کن

قاله را زیاد کنید.
ج: تراز کردن دستگاه در اتصال سه نقطه ای با بازو های رابط و بازوی هیدرولیک و در نوع کششی به وسیله چرخها انجام شود.

۴- در سیب زمینی کهای باید تنظیم به گونه ای انجام شود که:
الف: به کمک صفحه ردیف کننده، مانع از پخش شدن سیب زمینیها شود.
ب: اگر گل و خاک به سیب زمینی چسبیده فاصله تیغه تا

د: تنظیم روی ردیف به صورتی است که فاصلهٔ تیغه و انگشتیها از وسط چرخ تراکتور، مساوی نصف فاصله دو ردیف باشد (شکل‌های ۱-۲۸ و ۱-۲۹).



شکل ۱-۲۸- سیب‌زمینی کن در حال کار



شکل ۱-۲۹- نوع دیگر غده کن در حال کار

سرویس و نگهداری غده کنها

- ۱- روغن جعبه دنده را در هر فصل کاری تعویض نمایید.
- ۲- گریس خورها و یاتاقانها را روزانه گریسکاری و روغن کاری کنید.
- ۳- در صورت نیاز تیغه‌ها را تعویض نمایید.
- ۴- در فصل غیرکار دستگاه را سرویس کنید و قسمتهای لازم را با ضدزنگ بیوشانید.
- ۵- فشار فنر کلاچ جفجغه و کشش زنجیر نقاله را بازرسی و تنظیم نمایید.
- ۶- آچارکشی را به صورت دائم انجام دهید.

پیمانه مهارتی: برداشت محصولات شماره شناسایی: ۱۰-۹-۱۰-۷۹/ک	مهارت: آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات شماره شناسایی: ۹-۱۰-۷۹/ک
--	--

آزمون نهایی

- ۱- تفاوت رسیدن فیزیولوژیکی و تجاری را توضیح دهید.
- ۲- کدام یک از محصولات زیر، قبل از رسیدن فیزیولوژیکی برای عرضه به بازار مصرف مناسب هستند؟
- الف: موز ب: خرما ج: بادمجان د: گندم
- ۳- شرایط جوی مؤثر در کمیت و کیفیت محصول در موقع برداشت را فقط نام ببرید.
- ۴- در مناطق گرم و خشک بهترین زمان برداشت گندم در چه ساعاتی از شبانه روز است؟
- الف: ۶ تا ۱۲ ب: ۱۲ تا ۱۸ ج: ۱۸ تا ۲۴ د: ۱۲ تا ۲۴
- ۵- مورد از عوامل اقتصادی مؤثر در برداشت محصول را ذکر نماید.
- ۶- کدام عوامل اقتصادی موجب تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی می‌شود؟
- ۷- تلفات ناشی از تأخیر در برداشت محصولات کشاورزی را ذکر نماید.
- ۸- تلفات ناشی از خبره نبودن برداشت‌کننده را ذکر نماید.
- ۹- بازدهی کار داس دسته بلند با ۸ ساعت کار روزانه چه مقدار است؟
- الف: ۲۰۰ تا ۴۰۰ متر مربع ب: ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ متر مربع ج: ۴۰۰۰ متر مربع د: ۱۰۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ متر مربع
- ۱۰- قسمتهای مختلف دروگرهای شانه‌ای را نام ببرید.
- ۱۱- اگر فاصلهٔ تیغهٔ نگهدارندهٔ تیغه زیاد باشد تیغه... و اگر فاصلهٔ تیغهٔ نگهدارندهٔ تیغه کم باشد تیغه ... (در دروگرهای شانه‌ای)
- ۱۲- به هنگام کار با دروگرهای شانه‌ای، شانه‌برش با چلاق دست، باید الف: در یک خط و عمود بر جهت حرکت قرار داشته باشد.
- ب: به صورت عمود برهم قرار داشته باشد.
- ج: به صورت عمود برهم و در جهت حرکت قرار داشته باشد.
- د: در یک خط و در جهت حرکت قرار داشته باشد.
- ۱۳- انواع دروگر دوار را نام برد و توضیح دهید که از محفظهٔ یا پوشش روی قاب در این دستگاهها به چه منظوری استفاده می‌شود؟
- ۱۴- انواع دروگرهای موتوردار را ذکر کرده، بازدهی کاری آنها را در یک روز بنویسید.
- ۱۵- سرعت معمول کمباین برای برداشت چه میزان است؟
- الف: ۱ تا ۳ کیلومتر در ساعت ب: ۳ تا ۵/۵ کیلومتر در ساعت ج: ۵/۵ تا ۷/۵ کیلومتر در ساعت د: ۷/۵ تا ۱۰ کیلومتر در ساعت
- ۱۶- در صورت خرد شدن دانه‌ها در کمباین، اشکال مربوط به کدام قسمت است؟
- الف: سرعت کمباین کم است. ب: ارتفاع چرخ فلکه کم است.

ج : سرعت بادبزن زیاد است. د : فاصله بین کوبنده و ضدکوبنده کم است.

۱۷- در دروکنهای موتوردار روغن، هواکش و فیلتر گازوئیل پس از چه مدت کار تعویض یا تمیز می شود؟

۱۸- در تنظیم خرمنکوبها سرعت کوبنده برای لویا و دانه های روغنی... و برای گندم و جو... است.

۱۹- نحوه اتصال غده کنها به تراکتور را توضیح دهید و چگونگی عمق کار را بنویسید.

۲۰- در تنظیم سیب زمینی کنها کدام مورد غلط است؟

الف : با تنظیم صفحه ردیف کن از پخش شدن سیب زمینیها جلوگیری می شود.

ب : تنظیم روی ردیف به صورتی است که فاصله تیغه و انگشتیها از وسط چرخ تراکتور مساوی نصف فاصله دو ردیف باشد.

ج : تراز کردن دستگاه اتصال سه نقطه ای با بازو های رابط و بازوی هیدرولیک و در نوع کششی به وسیله چرخها انجام می شود.

د : اگر گل و خاک به سیب زمینی چسبیده، فاصله تیغه تا نقاله را کم کنید.

پیمانه مهارتی شماره دو

سیلو کردن محصولات

هدف کلی

سیلو کردن محصولات مهم و اساسی زراعی و باگی

هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این پیمانه مهارتی باید بتواند :

- ۱- انواع سیلوها را از نظر ساختمانی و هوادهی نام بيرد.
- ۲- خصوصیات فنی سیلوها را توضیح دهد.
- ۳- سیلوهای کوچک و ساده را ایجاد نماید.
- ۴- با چگونگی سیلو کردن محصولات زراعی و باگی آشنا شده، بتواند سیلو کردن محصولات را انجام دهد.
- ۵- اصول سیلو کردن محصولات زراعی و باگی را توضیح دهد.


زمان (ساعت)	
عملی	تئوری
۳۵	۴

آزمون ورودی

- ۱- گیاهان علوفه‌ای را دسته‌بندی نموده، آنها را نام ببرید.
- ۲- برداشت ذرت علوفه‌ای در چه موقعی انجام می‌شود؟
 - الف : قبل از تشکیل گل
 - ب : موقع تشکیل گل
 - ج : موقع شیری شدن دانه‌ها
 - د : موقع سفت شدن دانه
- ۳- رطوبت دانه‌گندم موقع برداشت در چه حدودی است?
 - الف : ۱۴ درصد
 - ب : ۲۵ درصد
 - ج : ۳۰ درصد
 - د : ۳۵ تا ۴۰ درصد
- ۴- تعجیل در برداشت گندم چه معایبی دارد؟
- ۵- تأخیر در برداشت محصولات مختلف چه معایبی دارد؟
- ۶- وجود آفات و بیماریها در محصول برداشت شده چه ضایعاتی را ممکن است به همراه داشته باشد؟
- ۷- کدام قسمت از اندام گیاهان زراعی زیر به عنوان محصول برداشت می‌شود?
 - الف : گندم ...
 - ب : سیب زمینی ...
 - ج : سورگوم
 - د : چغندر
- ۸- ذرت به چه صورتهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- ۹- چگونگی برداشت گیاهان علوفه‌ای را توضیح دهید.
- ۱۰- اندامهای کدام یک از گیاهان زراعی به مصرف تغذیه دام می‌رسد؟ (حداقل ۶ مورد را ذکر نمایید.)
- ۱۱- ۶ مورد از گیاهان زراعی را که از خود یا فرآورده‌های آن در طول سال مورد مصرف انسان قرار می‌گیرد نام ببرید.
- ۱۲- در چه شرایطی امکان فاسد شدن دانه غلات وجود دارد؟ موارد را ذکر نمایید.

آشنایی با انواع سیلوها از نظر ساختمانی

سیلوها مخازن نگهداری محصولات کشاورزی است و باید دارای شرایطی باشند که کیفیت محصول را به نحو مطلوبی حفظ نمایند.



شکل ۲-۱



سیلوها از نظر وضعیت ساختمانی به ۳ گروه زمینی، سطحی و هوایی تقسیم می‌شوند.

أنواع سيلو از نظر ساختمانی


سیلوهای زمینی: این سیلوها در عمق زمین در مناطقی که سطح آب زیرزمینی پایین و بیشتر از ۶ تا ۷ متر باشد ایجاد می‌شود و از نظر جنس دیوارهای و بدنه به سه گروه زمینی خاکی، ساده یا کلشی و مدرن (پتونی) تقسیم می‌شوند.

در سیلوهای زمینی خاکی و ساده یا کلشی اتلاف محصول به دلیل آلودگی با خاک و نامناسب بودن شرایط زیاد است و در حال حاضر کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورت استفاده از این روش با ریختن کاه بر روی دیوار (کلشی) تا حدود زیادی از میزان تلفات کاسته می‌شود.

سیلوهای زمینی مدرن یا خندقی: این سیلوها در داخل زمین به صورت ذوزنقه‌ای ایجاد و با استفاده از مصالح ساختمانی مثل آجر و سیمان و بتن ساخته می‌شوند. عمق این سیلوها حدود ۲ تا ۳ متر و از یک طرف و یا هر دو طرف دارای شیب برای حمل و برداشت محصول می‌باشد. عرض سیلوها حدود ۳ تا ۱۰ متر (معمولًاً ۴ متر) و در قسمت بالا حدود یک متر بیشتر از کف است. طول سیلوها مطابق نیاز و حداکثر ۲۵ تا ۳۰ متر در نظر گرفته می‌شود. در کف سیلو کanal جمع آوری آب اضافی به ابعاد حدود ۱۰ سانتیمتر عمق و ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر عرض و یک چاه به عمق چند متر ایجاد می‌گردد. این سیلو باید در مناطق مرتفع ایجاد گردد و حتی الامکان دیوارهای بالایی از کف زمین بلندتر باشد (شکلهای ۲-۱ و ۲-۲ و ۲-۳).



شکل ۲-۲



نمای سنگ بلوک چینی

شکل ۲-۳- سیلوی سطحی (وانی)

سیلوی سطحی	به ظرفیت ۵ تن
عرض داخلی	۱/۵ متر
ارتفاع	۱ متر
طول	۵ متر
عرض در	۱ متر
حجم	۷/۵ مترمکعب
ضخامت دیوارها	۲۵ سانتیمتر
شیب کف	۵-۶ درصد


باید دارای شیب ملایمی برای حمل و تردد تراکتور باشد. در کف سیلو، ایجاد کanal یا شیب مناسب برای خارج کردن رطوبت ضروری است (شکل ۲-۴).

سیلوی سطحی: این سیلوها در مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالاست به منظور نگهداری محصولات کشاورزی خصوصاً علوفه در سطح زمین مانند سیلوی زمینی خندقی (مثل وان) با همان اندازه‌ها ایجاد می‌شود. ارتفاع دیواره‌ها از طرفین



شکل ۲-۴- تهیه سیلوی تفاله مرکبات همراه با کاه برنج در سیلوی سطحی

گاهی، ذخیره سیلوی محصولاتی مثل سیب زمینی در سطح زمین (مطابق شکل ۲-۵) انجام می گیرد.



شکل ۲-۵- مقطع سیلوی سیب زمینی و محصولات مشابه

سیلوهای هوایی: به سیلوهایی که ارتفاعی بیشتر از ۳ متر دارند گفته می شود. جنس این سیلوها از چوب یا فلز یا بتن می باشد. سیلوهای چوبی و فلزی دارای ظرفیت کمتر و معمولاً قابل انتقال و جابجایی هستند. از این سیلوها برای انواع محصولات استفاده می شود.

نوع بتنی پر حجم و مدرن این سیلوها برای استفاده غلات در حال حاضر در دنیا مورد استفاده می باشد. این سیلوها دارای دو قسمت اساسی برج کار و انبار ذخیره هستند.

الف-برج کار: گندم پس از انجام مراحل اولیه آماده سازی، به وسیله تسمه نقاله هایی بی انتهاء به برج کار منتقل می شود. در مجاورت پیپ مکش غلات بداخل برج یک هواکش برای گرفتن گرد و خاک نصب شده است تا ناخالصی های فیزیکی پاک شود. سپس در برج کار، گندم بوخاری، به مخازن ذخیره فرستاده می شود. گفتنی است که برج کار، به همین منظور ساخته شده است.

ب-انبار ذخیره: انبار ذخیره به تناسب ظرفیت سیلو، از تعدادی کندوهای گرد و ستاره ای شکل تشکیل شده که محل نگهداری محصول می باشد. ظرفیت نگهداری این مخازن به بیش از ۱۰۰ هزارتن نیز می رسد (شکل ۲-۶).



شکل ۲-۶- سیلوی غلات

کanal حفر شود.

۳- در صورت عدم امکان بازدید از فیلم و اسلاید آموزشی استفاده نمایید.

آشنایی با چگونگی سیلو کردن

آماده کردن محصولات برای سیلو

برای نگهداری محصولات مختلف در سیلو، باید ابتدا نسبت به آماده کردن محصول اقدام شود تا از بروز مشکلات و ضایعات بعدی جلوگیری شود.

آماده کردن غلات: محصول در مرحله رسیدن کامل و دارای رطوبت ۱۴ درصد و یا کمتر باشد. محصول خالص شود و از مواد خارجی مثل سنگ و خاک و دانه‌های شکسته عاری باشد. محصول بوخاری شده و عاری از بذور علفهای هرز باشد.

در صورت وجود آفت پیشتر از حد مجاز با استفاده از سوم شیمیایی و قرنطینه، محصول آفت زدایی شود. محصولات فاسد و آلوده جدا شود و از ورود آنها به سیلو ممانعت بعمل آید.

کار عملی

در گروههای ۳ تا ۵ نفره حداقل ۵۰ کیلوگرم از یک نوع غله را برای سیلو کردن آماده نمایید. از نحوه آماده کردن غلات در سیلوها نیز بازدید کنید.

آماده کردن گیاهان علوفه‌ای برای سیلو شدن: گیاهان علوفه‌ای از نظر سهولت سیلو شدن به دو گروه زیر تقسیم می‌شوند:

انواع سیلو از نظر هوادهی

سیلوها از نظر هوادهی به دو گروه با تهویه و بدون تهویه تقسیم می‌شوند:

۱- در سیلوهای دارای تهویه: از لوله‌های مشبک هوادهی در کف سیلو، هوکشهای قوی برای مکیدن هوا از مخزن به بیرون و یا یک هوا دهنده قوی برای دمیدن هوا از قسمت پایین به داخل مخزن استفاده می‌شود. از هوکشهای دو منظوره نیز برای دمیدن و مکیدن هوا در سیلوها استفاده می‌شود.

۲- در سیلوهای فاقد تهویه: در صورت نیاز برای هوا دادن، محصول با استفاده از نقاله از مخزن خارج و در معرض هوای شدید قرار داده می‌شود و سپس به قسمت دیگری منتقل می‌گردد. در این روش هزینه و ضایعات زیاد است.

کار عملی

۱- با توجه به آنچه در ساختمان سیلوها ارائه شد از انواع سیلوهای موجود در منطقه بازدید نموده، خصوصیات فنی آنها را بررسی و مقایسه نمایید (گزارش کار را ارائه کنید).

۲- ابعاد یک سیلو را در سطحی کوچک مثلاً به نسبت ۵۰ درصد ابعاد یک سیلوی زمینی طراحی و نسبت به ساخت آن به صورت گروهی اقدام نمایید و حتی الامکان یک نوع محصول را براساس آنچه بعداً فرا خواهید گرفت سیلو نمایید.

توجه داشته باشید در ساخت سیلوی زمینی، شبک کف از طرفین به سمت وسط باشد و کانالی با ابعاد مناسب برای جمع‌آوری آب اضافی ایجاد گردد و چاه تخلیه در گودترین محل کف



شکل ۲-۷- برداشت و آماده کردن گیاهان علوفه جهت سیلو



شکل ۲-۸



شکل ۲-۹- چگونگی اضافه کردن مواد غذایی

۱- گروهی از گیاهان مثل ذرت علوفه‌ای، سورگوم،
تفاله چندر و برگ چندر علوفه‌ای، به دلیل بالا بودن مقدار
مواد کربوهیدراته در آنها بسهولت سیلو می‌شوند (شکل
۲-۷).

۲- دسته دیگری از گیاهان علوفه‌ای مثل علوفه‌های هرز،
گیاهان چمنی، علوفه مرتعی مخلوط با لگومینوزها مانند شبدر (از
مرحله گلدھی) برای سیلو نمی‌شود. در دسته اول مشکلی از
نظر سیلو شدن وجود ندارد اما برای گروه دوم باید از مواد مکمل
و افزودنی برای تهیه سیلو استفاده شود (شکلهای ۲-۸ و ۲-۹).

زمان مناسب برداشت گیاهان علوفه‌ای برای سیلو شدن:
گیاهان مختلف، هر کدام در یک مرحله خاص از رشد دارای
مناسبترين شرایط برای سیلو شدن هستند. برای مثال یونجه و
شبدر، در مراحل اولیه گل کردن؛ بقولات دانه‌ای، در زمان تشکیل
دانه؛ علفهای خانواده گندمیان، در موقع ظهرور خوشه‌ها؛ ذرت،
سورگوم و سودانگراس، در موقع شیری شدن دانه‌ها.
به طور کلی در موقع برداشت باید رطوبت علوفه برای سیلو
شدن کمتر از ۷۰ درصد باشد (رطوبت ۶۰ تا ۷۰ درصد مناسب
است).

کار عملی



شکل ۲-۱۰- برداشت محصول

طرز تشخیص موقع برداشت: علوفه را در دست گرفته، در مشت فشار دهید. اگر در دست خود، رطوبتی مشاهده کردید و قطعات محصول به صورت فشرده در دست شما باقی ماند، هنوز موقع برداشت برای سیلو فرا نرسیده است. عدم مشاهده رطوبت و باز شدن تدریجی قطعات محصول، نشانه خوبی برای مناسب بودن زمان برداشت و سیلو کردن محصول بشمار می‌آید.

برداشت و حمل محصول: محصول را در برداشت به قطعات چند سانتیمتری تقسیم نموده، بلا فاصله به محل سیلو حمل نمایید. برای این کار از چاپر استفاده کنید.



شکل ۲-۱۱- قرار دادن محصول در سیلو



شکل ۲-۱۲

چگونگی قرار دادن محصول در سیلو

با فرا رسیدن زمان برداشت باید نسبت به برداشت و خرد کردن محصول به قطعات کوچک و چند سانتیمتری اقدام شود. سپس محصول برداشت شده به محل سیلو حمل گردد و به صورت یک لایه به ارتفاع حدود ۲۰ سانتیمتر در داخل سیلو ریخته شود. در پایان، عمل فشرده شدن لایه و خارج کردن هوا به وسیله غلتک زدن با استفاده از تراکتور یا غلتکهای بشکه‌ای انجام می‌شود و ریختن محصول تا زمانی که سیلو پر شود (شکلهای ۱۱-۲ و ۱۲-۲) به همین شکل ادامه خواهد یافت. برای جلوگیری از تجمع آب باران و نفوذ رطوبت به داخل سیلو، باید ترتیبی اتخاذ گردد که ارتفاع توده سیلو شده در وسط از کناره‌های آن بیشتر باشد (شکل گرده ماهی) در مرحله آخر با پوشیدن سطح فوقانی روی سیلو با کاه و ورقه‌های پلاستیکی و قرار دادن حصیر یا کاه‌گل روی پلاستیک، عمل سیلو شدن خاتمه پیدا می‌کند.

نوع، مقدار و چگونگی افزایش مواد افزودنی به سیلو شدت تخمیر و درنتیجه عمل آمدن سیلو، بستگی به میزان کربوهیدراتها دارد. اگر مقدار کربوهیدراتها در مواد سیلو شونده کم باشد باید از مواد قندی مثل ملاس به میزان ۳ تا ۵ درصد وزنی به سیلو افزوده شود.

در صورت دسترسی نداشتن به ملاس، از دانه غلات نیز می‌توان استفاده کرد. در سیلوی بقولات به نسبت ۱۰ درصد وزنی، در سیلوی مخلوط علفهای خانواده گرامینه و بقولات به نسبت ۷ درصد و در سیلوی خانواده گندمیان به نسبت ۵ درصد وزنی، دانه غلات به سیلو اضافه می‌شود.

نحوه اضافه کردن مواد افزودنی: همراه با پر کردن سیلو روی لایه‌ها به نسبت تعیین شده ملاس و دانه غلات افزوده می‌شود.

نحوه محاسبه: مثلاً در یک سیلو به حجم ۱۰ تن محصول حدود ۳ تن از وزن محصول سیلو را ملاس تشکیل خواهد داد.

کار عملی

مرحله اضافه نمودن مواد افزودنی را در سیلو انجام دهید و یا بازدید و نمایش فیلم به نحو مطلوب مهارت لازم را کسب نمایید.

چگونگی پوشاندن سطح سیلوها پس از پر کردن
پس از پرشدن سیلو از محصول موردنظر، توأم با دقت در کوبیدن و غلتک زدن برای فشرده شدن محصول و خارج شدن هوای داخل توده، محصول برای ایجاد یک محیط غیر هوایی (در محیط غیر هوایی به دلیل فعالیت موجودات غیرهوایی تخمیر حاصل می‌شود و در غیر این صورت در محیط دارای هوا شرایط برای رشد موجودات هوایی و فساد محصول مستعد می‌گردد) لازم است برای جلوگیری از نفوذ آب و هوا به داخل محصول، روی سیلو بخوبی پوشانده شود. برای این عمل بهتر است ارتفاع محصول در وسط بیشتر باشد و شکل گرده ماهی به خود بگیرد. برای پوشاندن محصول، ابتدا از یک لایه کاه به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر روی سطح فوچانی استفاده می‌شود و بعد از آن روی کل سیلو، از یک پوشش نایلونی یا پلاستیکی (با وسعت کمی بیشتر از سطح فوچانی) استفاده می‌شود. برای جلوگیری از حرکت این پوشش یا ایجاد شکاف پارگی و ترک خوردگی در آن، روی آن را با خاک و سنگ و یا کاه گل می‌پوشاند (شکل ۲-۱۳).



شکل ۲-۱۳- محصول پر شده در سیلوی خاکی

کار عملی

با بازدید و یا به کمک فیلم از چند سیلو، کیفیت را از نظر سلامت و یا فاسد بودن مشخص نمایید.

نحوه برداشت سیلو


- ۱- در هنگام برداشت، ابتدا پوشش فوقانی به اندازه مصرف روزانه کنار زده می‌شود و قسمتهای کپک‌زده از محصول جدا و دور ریخته می‌شود.
- ۲- برداشت به صورت یک لایه عمودی انجام می‌شود.
- ۳- پس از برداشت از یک ورقه پلاستیکی برای پوشاندن باقیمانده محصول تا مصرف بعدی استفاده می‌شود.
- ۴- لایه‌های کپک‌زده و فاسد در داخل محصول جدا و دور ریخته می‌شود (شکل ۲-۱۴).

کار عملی

براساس آنچه آموخته اید به صورت عملی سیلو کردن، پوشاندن سطح سیلو را (دست کم برای یک محصول) انجام دهید.

زمان و چگونگی برداشت سیلو

سیلوی نباتات علوفه‌ای در یک زمان ۴۵° روز بخوبی آماده برداشت است. در صورتی که مراحل سیلو شدن و مراحل تخمیر بخوبی انجام شده باشد کیفیت علوفه در حد مطلوب و مناسبی باقی خواهد ماند. در سیلوی نباتات علوفه‌ای سبز مثل ذرت علوفه‌ای رنگ سبز زیتونی و مایل به قهوه‌ای روشن همراه با بوی خوش و مطبوع (اسیدلاتیک) نشانه سلامت سیلو است در حالی که سیاه بودن رنگ توده و بوی سوختگی و بوی آمونیاک، دلیل بر فاسد شدن توده محصول سیلو شده می‌باشد.



شکل ۲-۱۴- بش عرضی یک سیلوی پر شده

کار عملی

- کوتاهتر باشد اتلاف علوفه در مزرعه کمتر خواهد بود.
- ۲- سیلوها بسرعت و در زمان کوتاهی پر و بسته شود. هرچه این زمان طولانی‌تر باشد نفوذ هوا به داخل توده بیشتر و درنتیجه اتلاف محصول زیادتر خواهد بود.
 - ۳- بر حسب حرارت محیط، سه نوع تخمیر زیر در سیلو وجود می‌آید:

برداشت روزانه از سیلو را انجام دهید. سپس دقت کنید که در سیلو کردن علوفه رعایت نکات و اصول زیر ضروری است:

- ۱- برای کاهش تلفاتِ محصول مزرعه حتی الامکان محصول در یک روز درو و به سیلو حمل شود. هرچه این مدت

<p>پیمانه مهارتی: سیلو کردن محصولات شماره شناسایی: ۲-۹-۱۰-۷۹/ک</p>	<p>مهارت: آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات شماره شناسایی: ۹-۱۰-۷۹/ک</p>
--	--

ا تلاف محصول خواهد شد.

۴- رطوبت محصول در موقع سیلو شدن باید کمتر از ۷ درصد باشد و گرنه در اثر کوییدن و غلتک زدن مقدار زیادی از شیره داخل گیاه حاوی قندها، ترکیبات ازته محلول، موادمعدنی و اسیدهای حاصل از تخمیر از داخل محصول خارج می شود که کلاً دارای ارزش غذایی زیادی است. در صورت ورود آب باران و رطوبت از خارج به داخل سیلو نیز عمل شسته شدن و حمل مواد غذایی در سیلو انجام خواهد شد. در سیلو شدن، میزان رطوبت سیلو باید کنترل و مورد دقت باشد.

الف - تخمیر سرد: در درجه حرارت ۸ تا ۳۰ درجه بوجود می آید و موجب ثبات، پایداری و مرغوبیت محصول می شود.

ب - تخمیر گرم: در درجه حرارت ۳۵ تا ۵۰ درجه بوجود می آید که موجب کاهش قابلیت هضم پروتئین می شود.

ج - تخمیر داغ: در درجه حرارت بیش از ۵۰ درجه حاصل می شود که با اتلاف زیاد محصول همراه است و مناسب نمی باشد. مناسبترين سیلو در تخمیر سرد بدست می آید و زمانی که سیلو سریع و با فشار زیاد تهويه شود این گونه تخمیر حاصل می شود. در صورت بی دقتی در انباست و ورود هوای زیاد به داخل توده محصول سیلو شده، درجه حرارت افزایش یافته، موجب

آزمون نهایی

- ۱- سیلو را تعریف نموده، انواع آن را از نظر ساختمانی نام ببرید.
 - ۲- سیلوی سطحی در چه مناطقی ایجاد می شود و از نظر ساختمانی به چه شکلی است؟
 - ۳- اختلاف عرض در سیلوی خندقی در قسمت کف و بالای سیلو چه مقدار است؟
- الف : حتی الامکان یک اندازه ب : ۱ متر ج : ۲ تا ۳ متر د : ۵ متر
- ۴- ساختمان سیلوهای هوایی غلات را به اختصار توضیح دهید.
 - ۵- سیلوی خندقی به چه شکلی ایجاد می شود؟
- الف : استوانه ب : مکعب مستطیل ج : ذوزنقه د : کندویی
- ۶- ساختمان سیلوی ساده یا کلشی را به اختصار توضیح دهید.
 - ۷- سیلوها از نظر هوادهی به ... گروه.... تقسیم می شوند.
 - ۸- هوا دادن در سیلوهای فاقد تهويه چگونه انجام می شود؟
 - ۹- انواع سیلوهای زمینی (خندقی) را نام برد، توضیح دهید کدام یک در حال حاضر بیشتر مورد استفاده می باشد؟
- ۱۰- حداقل ۴ نوع از گیاهانی را که بسهولت سیلو می شوند نام ببرید.
 - ۱۱- ملاس و دانه غلات به چه منظوری به سیلو اضافه می شود؟
- الف : بهدلیل افزایش شدت تخمیر
- ب : بهدلیل زیاد بودن کربوهیدراتها

- ج : برای افزایش چسبندگی محصول
د : برای استفاده از سیلو در غذای طیور
- ۱۲ - کدام یک از گیاهان زیر برای سیلو شدن، در موقع شیری شدن دانه‌ها برداشت می‌شود؟
الف : بقولات دانه‌ای
ب : علوفه خانواده گندمیان
ج : ذرت
د : یونجه
- ۱۳ - ارتفاع لایه‌های محصول ریخته شده در سیلو برای غلتک زدن چه مقدار است?
الف : ۱۰ سانتیمتر
ب : ۲۰ سانتیمتر
ج : ۵۰ سانتیمتر
د : ۱۰۰ سانتیمتر
- ۱۴ - سیلوهای علوفه چگونه پر می‌شوند؟
الف : بسرعت و در زمان کوتاه
ب : بتدریج و طولانی
ج : بتدریج و روزانه توأم با دقیق زیاد
د : هر روز یک لایه ۲۰ سانتیمتری
- ۱۵ - رطوبت سیلوی غلات در مناطق مرطوب و در مناطق خشک می‌باشد.
- ۱۶ - نحوه پوشیدن سطح سیلوها را به اختصار توضیح دهید.
- ۱۷ - رنگ توده سیلو همراه با بوی دلیل بر فاسد شدن محصول سیلو شده می‌باشد.
- ۱۸ - برداشت از سیلوی علوفه چگونه انجام می‌شود؟
الف : از سطح
ب : از عمق
ج : به صورت افقی
د : به صورت عمودی
- ۱۹ - تخمیر سرد در سیلو را توضیح دهید.
- ۲۰ - تخمیر داغ در سیلو به چه دلیلی ایجاد می‌شود؟

پیمانه مهارتی شماره سه نگهداری محصول در انبار

هدف کلی

شناخت اصول انبارداری و انبار کردن محصولات زراعی و باگی

هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این پیمانه مهارتی باید بتواند:

- ۱- اصول انبارداری محصولات زراعی و باگی را بشناسد و محصول را برای انبار شدن آماده نماید.
- ۲- با خصوصیات انبارها آشنا شده، درجه حرارت و رطوبت انبار را تنظیم نماید.
- ۳- انبار را به طرق مختلف ضدغونی نماید.
- ۴- آفات انباری و روش‌های کنترل آنها را توضیح داده و آنها را کنترل کند.
- ۵- انبار را با سموم موردنظر توصیه شده با استفاده از سمپاشها، ضدغونی و سمپاشی نماید.

مهارتها و اطلاعات مورد نیاز

- آشنایی با مهارتهای کاشت، مراقبتهای ویژه داشت، مهارت برداشت
- آشنایی با کنترل آفات و امراض

زمان (ساعت)	
عملی	تئوری
۳۵	۴

آزمون ورودی

- ۱- چه محصولاتی در طول ایام سال مورد مصرف دام و انسان هستند؛ از هر کدام چهار مورد را نام ببرید.
 الف: انسان ۱-۴
 ب: دام ۱-۴
- ۲- تفاوت رسیدن فیزیولوژیکی و تجاری را توضیح دهید.
- ۳- رطوبت زیاد و وجود اندامهای سبز و نارس در محصول چه معایبی را به همراه خواهد داشت؟
- ۴- چرا بعضی از محصولات زراعی بلا فاصله پس از برداشت به بازار عرضه نمی‌شوند؟ دلایل مهم را ذکر نماید.
- ۵- تأثیرات وجود آفات و بیماریها در محصول برداشت شده را توضیح دهید.
- ۶- از انواع گیاهانی که دانه و غده یا ریشه آنها به عنوان محصول برداشت می‌شود از هر کدام چهار نمونه ذکر نماید.
- ۷- قوه نامیه چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۸- اثر حرارت در واکنشهای حیاتی گیاه را شرح دهید.
- ۹- روش کترل شیمیایی آفات را به طور مختصر شرح دهید.
- ۱۰- ضد عفونی بذر به چه منظوری و چگونه انجام می‌گردد؟

بحranهای طبیعی و غیرطبیعی (مثل خشکسالی و جنگ)

- ۷- (شما نیز دلایل دیگری را شناسایی و اضافه نمایید).
- ۸- محصولات برداشت شده، موجودات زنده‌ای هستند که واکنشهای حیاتی از جمله تنفس، تولید انرژی، تغییرات فیزیکی و شیمیایی جوانه زدن و رشد در آنها انجام می‌گیرد و به همین دلایل، بسهولت در معرض حمله آفات و بیماریها و فساد قرار دارند که می‌باید برای حفظ کمیت و کیفیت محصول عوامل فاسد‌کننده محصول را تا حد ممکن کاهش داد و محدود کرد. از عواملی که بلا فاصله بعد از برداشت و تا مراحل بعدی موجب فساد محصول می‌شود و می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ۱- رطوبت
- ۲- حرارت
- ۳- دانه‌های شکسته محصول
- ۴- بذور علفهای هرز

آماده کردن محصول برای انبار کردن

قسمت عمده محصولات تولیدی زراعی و باغی در حال حاضر به دلایل مختلف بلا فاصله پس از تولید به مصرف نمی‌رسد و تا موقع مصرف می‌باید در محل مناسبی ذخیره و نگهداری شوند. بعضی از این دلایل عبارتند از:

- ۱- محدودیت فصل تولید (تولید در یک فصل و عرضه در طول سال برای تأمین مصارف روزمره انسان و دام)
- ۲- عرضه محصول به بازار در خارج از فصل تولید
- ۳- محدودیت وسایل برای انتقال محصول از مراکز تولید به مراکز مصرف

۴- نگهداری قسمتی از محصول به عنوان بذر برای فصول کاشت آتی

- ۵- نگهداری محصول برای عرضه تدریجی به کارخانجات صنایع غذایی
- ۶- ذخیره استراتژیک محصولات برای استفاده در



شکل ۱-۳-۱. یک نوع دستگاه بوجاری

۵- محصول آخشته و آلوده به حشرات و امراض برای کنترل رطوبت و حرارت قبل از انبار کردن می‌توان با برداشت موقع، هوا دادن و حمل موقع محصول تا حدود زیادی شرایط مساعد را فراهم نمود.

اما برای حذف قسمتهای زاید و اضافی فیزیکی (سنگ‌ریزه، شن) و بیولوژیکی (دانه‌های خرد، اندامهای سبز گیاهی، بذر و علفهای هرز) از عملیات بوجاری برای خالص کردن محصول استفاده می‌شود. در بوجاری به روش ساده از الک و غربال و در بوجاری مکانیزه از دستگاههای بوجاری بهره‌گیری می‌شود. اساس کار این دستگاهها مبتنی بر عبور دانه از تمیزکننده‌های غربالی مجهری به جریان باد است که طی این فرایند، علفهای هرز، دانه‌های شکسته و اندامهای گیاهی غیرمحصول، ذرات جامد سنگ‌ریزه و گرد و خاک از محصول جدا می‌شود (شکل ۳-۱).

کار عملی

- ۱- به روش ساده و دستی با استفاده از غربال و الک، یک کيسه محصول برداشت شده را بوجاری نمایید.
- ۲- خلوص یک نمونه محصول را تعیین کنید. باید دانست بذر خالص به بذری گفته می‌شود که عاری از مواد بی‌صرف و زاید خارجی باشد.

راهنمایی: برای این کار می‌توانید در محصولات درشت دانه (مثل لوپیا) ۵۰۰ گرم و در محصولات ریزدانه (مثل شبدر و یونجه) ۱۰۰ گرم محصول را انتخاب و عوامل ناخالص را از آن جدا نمایید.

$$\text{برای بذور دانه درشت} \quad \frac{A}{500} \times 100 \quad . \quad (1)$$

$$x \cdot 100 \cdot \text{درصد خلوص بذر} \quad (2)$$

$$x \cdot 100 \cdot \text{درصد خلوص بذر} \quad .$$

برای بذور دانه ریز جهت تعیین خلوص بذر استفاده کنید.
در این رابطه‌ها A، وزن مواد ناخالص و x، درصد ناخالصی است.

- ۱- مقداری از یک محصول را انتخاب کرده، وزن آن را بدقت تعیین کنید. برای بذور ریز مثل چند قند نیاز به آرد کردن نیست و دانه‌های روغنی درشت مثل آفتابگردان را (به دلیل اکسیداسیون و تبخیر مواد حاصل) برای این آزمایش نباید آرد کرد.
- ۲- بذرهای درشت مثل ذرت را آرد و خرد کنید. برای این آزمایش آمده شده فوق را به مدت ۳ تا ۴ ساعت در اتوو با ۱۰۵ درجه سانتیگراد حرارت قرار دهید.
- ۳- محصول آمده شده فوق را به مدت ۳ تا ۴ ساعت در اتوو با ۱۰۵ درجه سانتیگراد حرارت قرار دهید.
- ۴- محصول را از اتوو خارج کرده، پس از سرد شدن مجدداً بدقت وزن نمایید.
- ۵- اختلاف وزن محصول قبل و بعد از خارج شدن از اتوو مربوط به میزان رطوبت است.
- ۶- با استفاده از رابطه $\frac{100 \times x}{a}$. درصد آب موجود در بذر، درصد رطوبت محصول را تعیین نمایید. a، میزان محصول اولیه قبل از قرار دادن داخل اتوو و x، میزان رطوبت محصول است.

۳- علاوه بر انجام عملیات فوق در کلاس و آزمایشگاه از مراکز انجام بوجاری بازدید به عمل آورید.

رساندن رطوبت محصول به حد مجاز
همانگونه که قبلاً گفته شد رطوبت، یکی از مهمترین عوامل فساد محصولات انباری است که توأم با گرمای مناسب، موجب افزایش آفات و بیماریها، تجزیه و تخریب محصول، ازدیاد تنفس و کاهش محصول، رشد و جوانه زدن دانه‌ها و در نهایت فساد و از بین رفتن محصول می‌شود.

برای مثال، رطوبت گندم در موقع انبار کردن باید کمتر از ۱۶ درصد باشد و در انبار و سیلو این رطوبت باید بیشتر از ۱۶ درصد باشد.

چگونگی اندازه‌گیری رطوبت محصول
ساده‌ترین روش اندازه‌گیری رطوبت محصول، خشک کردن به کمک گرماست و روش عمل به ترتیب عبارت است از :

جدول ۱-۳- رطوبت مناسب ذخیره‌بی خطر بعضی از محصولات دانه‌ای

نوع دانه	رطوبت مطلوب ذخیره (بر حسب درصد)	رطوبت نسبی هوا در حرارت ۲۵ درجه سانتیگراد که دانه با آن در حال تعادل می‌باشد. (بر حسب درصد)
گندم	۱۲-۱۴	۶۵-۷۳
برنج	۱۳	۷۱
ذرت و یولاف	۱۲-۱۳	۶۰-۶۱
ذرت خوش‌های	۱۲	۶۵
نخود و لوبیا	۱۶-۱۸	۷۶-۸۴
لوبیایی روغنی	۱۱	۶۸

پیمانه مهارتی: نگهداری محصول در انبار شماره شناسایی: ۳_۹_۱۰_۷۹ ک	مهارت: آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات شماره شناسایی: ۹_۱۰_۷۹_۱_ک
---	--

- ۱- کم یا زیاد بودن رطوبت در موقع حمل (ریزش یا له شدن دانه)
- ۲- عدم تناسب بین وسیله حمل و نقل و نوع محصول (پخش شدن محصول در شرایط حمل رو باز و...)
- ۳- وضعیت نامناسب راهها (خاکی بودن، دست انداز داشتن)
- ۴- طولانی شدن زمان حمل
- ۵- چیدن نامناسب محصول در وسیله نقلیه
- ۶- بسته‌بندی نکردن محصول در موقع حمل
- ۷- تداخل و مخلوط قرار گرفتن محصولات مختلف
- ۸- حرارت و دیگر شرایط نامساعد جوی در موقع حمل
- ب - تلفات ناشی از شرایط نامساعد انبار: عوامل زیان‌آور انباری که موجب تلفات محصول می‌شود عمدهاً به دو دسته، عوامل غیرزنده و عوامل زنده تقسیم می‌شوند.
- تلفات ناشی از عوامل غیرزنده به‌طور عمده شامل محیط فیزیکی انبار (وضعیت ساختمانی)، گرمای، رطوبت و تهویه می‌باشد. پوشش و وضعیت نامناسب انبار موجب آلودگی محصول می‌شود و محیط را برای دیگر عوامل فاسد کننده آماده می‌سازد. با افزایش گرمای و رطوبت، واکنشهای حیاتی محصول افزایش پیدا کرده، باعث کاهش کیفیت محصول می‌شود. در اثر تنفس و تبخیر، وزن محصول نیز در انبار کاهش می‌یابد (مثلاً در غلات ۳ تا ۴ درصد در یک سال).
- وجود تهویه مناسب و ورود هوای خشک و تازه موجب کاهش درجه حرارت و رطوبت و واکنشهای حیات گیاه می‌شود. از طرفی هوای خصوصاً سرد در انبار موجب کاهش خسارت دیگر عوامل زیان‌آور می‌شود.
- ج - تلفات ناشی از عوامل زنده (آفات انباری): عوامل زنده‌ای که در انبار موجب تلفات محصول می‌شوند، عمدهاً شامل میکروارگانیسمها، حشرات، جوندگان، پرندگان و کنه‌ها می‌باشد. میکروارگانیسمها: موجودات بسیار ریز ذره‌بینی مثل

خشک کردن محصول

پس از اندازه‌گیری، در صورتی که رطوبت محصول از حد مجاز برای انبار شدن بیشتر باشد باید با انجام عملیات موردنیاز، رطوبت به حد مجاز رسانیده شود. برای این‌منظور از خشک کردن محصول به دو روش طبیعی و مصنوعی استفاده می‌شود.

۱- خشک کردن طبیعی: در این روش از گرمای خورشید و جریان هوا استفاده می‌شود که محصول را بر روی بستری مناسب و تمیز به ضخامت کم و حدود ۵ سانتی‌متر پهنه کرده، هرچند ساعت یک‌بار عمل هوادادن را با زیر و رو کردن محصول انجام می‌دهند. در عمل زیر و رو کردن باید دقت کرد تا به محصول آسیبی وارد نشود.

۲- خشک کردن مصنوعی: در این روش، از جریان هوای گرم به صورت مصنوعی برای خشک کردن محصول در اتاق‌کهای مخصوص استفاده می‌شود. عملیات خشک کردن می‌تواند ۳ تا ۳۰ روز به طول انجامد. باید توجه داشت در صورتی که درجه حرارت توده محصول حتی برای مدت کوتاهی زیادتر از حد متعادل گردد موجب پایین آمدن قوه نامیه بذر شده، تأثیر نامطلوبی روی خواص دانه باقی خواهد گذاشت. دانه‌های مرطوب در این زمینه حساس‌ترند. به‌طور کلی، درجه حرارت در موقع خشک کردن با هوای گرم حدوداً باید ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از درجه حرارت دانه باشد.

کار عملی

عملیات خشک کردن را با یک محصول انجام دهید و یا از نحوه خشک کردن محصولات بازدید نمایید.

آشنایی با ضایعات محصول پس از برداشت

الف - ضایعات ضمن حمل و نقل: پس از برداشت محصول تا انبار کردن آن، در اثر حمل و نقل ممکن است قسمتی از محصول به دلایل مختلف از بین رفت، محصول از نظر کمی و کیفی دچار نقصان شود. عمده این موارد عبارت است از:

موادغذایی فاسد مورد مصرف انسان و دام، موجب بروز مسمومیت و حتی مرگ مصرف‌کننده می‌شود. بعضی از قارچها مثل افلاتوکسین علاوه بر مسمومیت، سرطان‌زا نیز هستند. مصرف محصولات کپک‌زده موجب بروز ناراحتی کبدی، کلیوی، گوارشی و عصبی شده، خصوصاً تلفات وسیع دام و طیور را بهمراه دارد.

باکتریها و قارچها هستند که در شرایط مساعد و مناسب شروع به رشد و فعالیت نموده، در مدت کوتاهی موجب تجزیه و فساد محصولات انباری می‌گردند. شدت خسارت بر روی بعضی از قسمتهای محصول بیشتر است مثلاً: گندم، آسیب قوئه رویشی، جو؛ آسیب کیفیت مالت؛ دانه‌های روغنی، افزایش اسیدهای چرب؛

جدول ۲-۳- مقدار گرما و رطوبت نسبی لازم برای فعالیت بعضی از قارچها

رطوبت نسبی	گرما و رطوبت مناسب	رطوبت نسبی (%)	درجه گرما (C)		نام علمی قارچها
			حداکثر	حداقل	
۹۳	۲۴	۷۲	۲۸	۵	Aspergillusruber
۹۴	۳۰	۷۰	۴۲	۱۰	A . amstelodami
۹۹	۳۵	۸۰	۴۵	۱۲	A . flavus
۹۹	۴۰	۸۳	۵۲	۱۲	A . fumigatus
۹۹	۳۵	۷۷	۴۵	۱۰	A . niger
۹۹	۲۴	۸۰	۳۲	۵	penicillium martensii

جدول بالا مقدار گرما و رطوبت لازم برای فعالیت بعضی از قارچها را نشان می‌دهد. (اقتباس از کتاب روش‌های مبارزه با آفات انباری قرنطینه‌ای)

خصوصیات انبارها

خصوصیات ساختمانی انبارها: حداقل شرایط ساختمانی انبارها عبارت است از:

- ۱- کف انبار باید از مصالح مناسب پوشش داده شود تا از نشت رطوبت به داخل محصول جلوگیری به عمل آید.
- ۲- کف، دیوارها و سقف باید بدون درز و شکاف باشد.
- ۳- سقف انبار باید مانع نفوذ رطوبت، آفات و شرایط نامناسب جوی به داخل انبار باشد.

عوامل مؤثر در رشد میکروارگانیسمها شامل محیط گرم و مرطب، بوجاری نشدن محصول خصوصاً وجود دانه‌های شکسته و اکسیژن کافی می‌باشد که با رشد سریع قارچها موجب فساد محصول می‌گردد.


دیگر عوامل زنده مهم شامل انواع سوسکهای دانه و آرد، شپشکها، مورچه، موس و ... می‌باشد که انواع مهم آن در آشنایی با آفات انباری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



شکل ۲-۳-یک نوع انبار



شکل ۳-۳-نوع دیگر انبار



شکل ۳-۴-چگونگی خراب شدن غلات در اثر تغییرات گرما در انبار،
جا به جایی رطوبت در انبار و طرز انتقال حشرات و قارچها از یک نقطه به
 نقطه دیگر توده غله.

۴- انبار باید از استحکام و ابعاد مناسب برخوردار و دارای اینمی مطلوب باشد.

۵- نگهداری و دسترسی به محصول سهولت امکان پذیر باشد(شکل ۳-۲).

تهویه انبار: امر وظیه، برای نگهداری مطلوب محصولات از انبارهای تهویه دار استفاده می شود. تهویه، برای کاهش درجه حرارت، جلوگیری از آلوده شدن به حشرات و فساد میکروبی در انبارها ضرورت دارد. در انبارهای فاقد سیستم تهویه از جریان هوا دادن در روزها و شبها سرد و خشک به وسیله باز کردن پنجره ها و راههای ورودی استفاده می شود.

در انبارهای دارای سیستم تهویه، بیشتر از لوله های سوراخ دار در کف یا طول مخزن انبار برای ورود هوا و یک هوکش قوی برای مکیدن هوا استفاده می شود.

در هوای گرم تابستان و سرد زمستان، باید ورود هوا از قسمت پایین و خروج آن از قسمت بالای انبار انجام شود تا هوای گرم زیر سقف، در تابستان و رطوبت نسبی بالا در زمستان داخل محصول نشود (شکل ۳-۳).

رطوبت نسبی انبار: در انبارها بین رطوبت نسبی محیط و مقدار آب موجود در محصول همواره تعادلی برقرار است که به آن «تعادل رطوبتی» می گویند.

اگر هوای انبار خشک باشد تبادل رطوبتی از محصول به محیط انجام می شود و برعکس، در صورت زیاد بودن رطوبت هوای جذب رطوبت توسط محصول تا رسیدن به تعادل انجام می شود. باید توجه داشت که درجه تعادل رطوبتی به درجه حرارت محیط نیز بستگی دارد. در صورت کم شدن رطوبت دانه از میزان محصول کاسته خواهد شد و با زیاد شدن رطوبت، فساد در محصول به وجود خواهد آمد (شکل ۳-۴).

برای اندازه گیری رطوبت دانه از روش خشک کردن یا انواع رطوبت سنجها استفاده می شود و برای تعیین رطوبت نسبی فضای انبار نیز می توان از رطوبت سنج یا رطوبت نگار استفاده نمود.

کار عملی

- ۱- حرارت انبار مخصوصاً داخل توده‌های محصول را اندازه‌گیری نمایید.
- ۲- در صورت زیاد بودن درجه حرارت (بیشتر از ۲۰ درجه) ضایعات محصول را بررسی کنید.
- ۳- تأثیر درجه حرارتهای متفاوت را در روی محصولات انباری با انجام آزمایشات متوالی تحقیق نمایید.
نور: در انبار، وجود نور محدود و کم، مناسبتر است. بعضی از محصولات مثل سیب زمینی نسبت به نور زیاد حساسیت بیشتری دارند. زیرا نور باعث ایجاد لکه‌های سبزرنگ در غده‌هایی که حاوی ماده سولانین هستند می‌شود. به طور کلی، انبارها باید در تاریکی مطلق و یا از نور بسیار ضعیف برخوردار باشند. کاهش تعداد پنجره‌ها یا پوشانیدن شیشه‌ها موجب کاهش نور در انبار می‌شود.
- نظافت انبارها: برای حفظ سلامت محصول و جلوگیری از فساد و تلفات آن، باید انبارها کاملاً تمیز بوده، نسبت به نظافت آن اقدام شود. مهمترین عملیات برای نظافت انبار عبارت اند از:
 - ۱- کلیه درزها، شکافها و سوراخهای انبار با مصالح مناسب مسدود گردد.
 - ۲- رطوبت جمع‌آوری شده در انبار تخلیه گردد.
 - ۳- دانه‌های شکسته، خرد و ضایعات محصول بلا فاصله از انبار خارج گردد.
 - ۴- با عایق‌بندی و کنترل درب و پنجره‌ها از ورود گرد و خاک و عوامل نامساعد محیطی و موجودات زنده به داخل انبار جلوگیری شود.
 - ۵- کانونهای آلوده از محصول جدا و از انبار خارج شود.
 - ۶- در صورت بروز فساد و آلودگی، عوامل زیان‌آور شناسایی و نسبت به ایجاد شرایط مطلوب در انبار اقدام شود.
 - ۷- از ورود محصول فاسد و آلوده به انبار ممانعت به عمل آید.

کار عملی

- ۱- در یک انبار، رطوبت نسبی را اندازه‌گیری نمایید.
- ۲- استفاده از تهویه و دستگاههای خشک کن برای رسیدن به تعادل رطوبت را بررسی کنید.
- ۳- وضعیت انبار را از نظر مناسب بودن رطوبت نسبی مورد بررسی قرار دهید.
- ۴- از یک انبار مناسب بازدید نموده، با روش و نحوه اندازه‌گیری رطوبت نسبی آشنا شوید.
- درجه حرارت انبار: حرارت باعث افزایش شدت تنفس دانه، کاهش محصول، افزایش فعالیت آفات و بیماریها و در نهایت فساد و تلفات محصول می‌گردد. برای نمونه در تغییرات مختلف درجه حرارتی، وضعیت تعدادی از این عوامل عبارت است از:
 - ۱- بیشتر کپکها در حرارت کمتر از ۲۰ درجه سانتیگراد فعالیت خیلی کمی دارند و یا اصلاً فعالیت ندارند.
 - ۲- تولید مثل حشرات در حرارت کمتر از ۱۵ درجه متوقف می‌گردد و غالب حشرات در حرارتهای کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد دیر یا زود از بین می‌روند.
 - ۳- در حرارتهای خیلی زیاد (بیشتر از ۴۰ تا ۶۰ درجه) فعالیت موجودات کاهش پیدا می‌کند اما قوه رویشی دانه‌ها در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرد.
 - ۴- به ازای هر ۱۰ درجه افزایش دمای انبار، شدت تنفس دانه‌ها دوبرابر می‌شود و هرچه تنفس شدیدتر باشد سوخت و ساز دانه‌ها نیز افزایش می‌یابد و از وزن محصول بیشتر کاسته می‌شود. پس مشاهده می‌شود که هر قدر حرارت انبار کمتر باشد ضایعات محصول نیز کمتر است.
 - توده غلاتی مثل گندم نباید دارای حرارت بیشتر از ۱۸ درجه سانتیگراد باشد و حتی الامکان باید حرارت توده ۱۰ درجه و کمتر باشد. در صورت افزایش درجه حرارت از تهویه برای خنک کردن و استفاده از هوای بیرون به شرطی که حرارت بیرون ۵ تا ۸ درجه کمتر از حرارت انبار باشد استفاده خواهد شد.

ظرف مدت ۳ روز تصحیح شده، آفات انباری را از بین می‌برند (شکل ۳-۵).

۸- قبل از انبار کردن محصول، ابتدا با قیمانده محصولات قبلی از انبار خارج شود؛ کف انبار جارو و در و پنجره، سقف و دیوارها بدقت تمیز شود.

کار عملی

نظافت یک انبار را به طور کامل انجام دهید.

آشنایی با ضدغونی انبارها
ضدغونی انبارها از طرق مختلف مثل دود دادن، حرارت دادن و سمپاشی انجام می‌شود.

۱- دود دادن: برای پیشگیری و مبارزه علیه حشرات و جوندگان در انبار می‌توان از روش دود دادن به وسیله گازهای سمی استفاده کرد. گوگرد، مخلوط اکسیداتیلن و گاز کربنیک یا کلروپیکرین یا مخلوط برومور دو متیل با دی برومواتان از جمله ترکیباتی است که در انبارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش دود دادن:

۱- سوم ضدغونی، مناسب با حجم و فضای انبار تهیه شود.

۲- دُز و غلظت سم مشخص شود. سوم هرگز بیشتر از مقدار مجاز مورد استفاده قرار نگیرد، چون برای انسان و محصول خطرناک است.

۳- برای استفاده از سوم، معمولاً از یک تشتک و یا پارچه آخسته به سوم در قسمت بالای انبار استفاده می‌شود تا بتدریج سوم در فضا پخش شده، با نشستن روی محصول ضدغونی لازم را انجام دهد. گاهی با استفاده از بادبزن می‌توان سرعت انتشار سوم را افزایش داد.

۴- در انبارها از ترکیبات هیدروژن فسفره مثل قرصهای فستوکسین نیز می‌توان استفاده نمود. در انبارهای سرپوشیده و یا زیر چادرهای پلاستیکی به ازای هر تن محصول مثل گندم، جو، برنج و ... ۳ تا ۶ قرص کافی است این قرصها سرعت و حداقل



شکل ۳-۵- سوند فستوکسین برای قرص‌گذاری در داخل توده‌غله

در حال حاضر با توصیه کارشناسان حفظ بیانات استفاده از سمومی مثل مالاتیون برای غلات و حبوبات بجز مواد آردی بلامانع می‌باشد.

روش استفاده:

۱- در سطح وسیع، از مایع پاشی سموم به غلظت مجاز قبل از ورود به انبار روی محصول استفاده می‌شود که در این صورت برای جلوگیری از افزایش رطوبت در توده محصول ذخیره شده مقدار آب نباید از $2/5$ لیتر در یک تن محصول بیشتر باشد.

۲- در سطوح کوچک، از مخلوط کننده‌ای بشکه‌ای استفاده می‌شود. بدین صورت که محصول را داخل بشکه قرار داده و مقدار سم لازم را روی آن ریخته و با بستن دریچه و چرخاندن بشکه اختلاط سموم و محصول انجام می‌گیرد. برای ضد عفنونی محصول با قارچ کشته‌ای گردی (غیر مایع) نیز از این روش استفاده می‌شود.

۵- در هر حال باید توجه داشت که اکثر این سموم برای انسان خطرناک است و در محیط‌های مسکونی نباید مورد استفاده قرار گیرد.

۲- حرارت دادن: حرارت دادن عموماً به وسیله

شعله‌افکن انجام می‌شود. برای این منظور، معمولاً قبل از انبار کردن محصولات، کلیه درزها، شکاف دیوارها، کف و سقف انبار که محل زیست آفات انباری است حرارت داده می‌شود تا عوامل آلودگی در اثر حرارت از بین برده شود.

۳- سمپاشی با سموم تهیه شده شیمیایی: در برخی

موارد برای مبارزه با آفات انباری، از سمپاشی مستقیم روی محصول نیز استفاده می‌شود. باید توجه داشت که محصولات آغشته شده به سموم برای مصرف کنندگان مضر است و استفاده از این روش باید زیر نظر کارشناسان ماهر انجام شود و تنها برای محصولاتی که به مدت طولانی در انبار نگهداری می‌شوند مورد استفاده قرار گیرد. برای ضد عفنونی انبار، قبل از ورود محصولات نیز می‌توان از سموم شیمیایی استفاده نمود.



شکل ۶-۳- گونیهای بادام زمینی و طرز پوشانیدن آنها به وسیله چادر پلاستیکی برای مبارزه با آفات در هوای آزاد (J. R. Cutler)

کار عملی

در انبار محصولات کشاورزی، به یکی از سه شیوه مذکور،
عملیات ضدغونی را انجام دهید.




شکل ۷-۳- شبشه گندم

آشنایی با آفات انباری
 مهمترین آفات انباری شامل انواع شبشه‌ها، سوسکهای انباری، پروانه‌ها، موشها و جوندگان انباری و ... می‌باشند که در این قسمت تعدادی از آفات شایع و پرمیعت معرفی می‌شود.
۱- شبشه گندم: حشره کامل به رنگ قهوه‌ای و به طول ۳/۵ تا ۴ میلیمتر است.

فاقد بالهای ریز است و قادر به پرواز نمی‌باشد. تخم ریزی خود را داخل دانه گندم در حفره‌هایی به عمق ۱/۵ میلیمتر و داخل هر حفره یک تخم انجام می‌دهد. و دهانه حفره را با مایعی می‌بوشاند. این آفت ۴ تا ۵ نسل دارد (شکلهای ۳-۷ و ۳-۸). این آفت علاوه بر گندم از جو، چاودار، ذرت، ارزن و برنج نیز تغذیه می‌کند.

خسارت موجب کاهش محصول، کاهش کیفیت، ازبین رفتن بذر و کاهش ارزش نانوایی می‌شود.



شکل ۸-۳- خسارت آفات روی محصول

۲- شپشه برنج: حشره کامل به رنگ قهوه‌ای مایل به سیاه و به طول ۲/۵ تا ۴ میلیمتر است. دارای بالهای ریز و قادر به پرواز است (شکل ۳-۹).



الف - لارو شپشه برنج



ب - شپشه برنج

شکل ۳-۹


بیشترین علاوه این آفت به برنج است اما از دیگر غلات نیز استفاده می‌نماید. ارزش غذایی برنج را از بین می‌برد و بعضی مواقع حتی محصول را غیرقابل استفاده می‌نماید.



شکل ۳-۱۰ - شپشه دندانه‌دار

۳- شپشه دندانه‌دار: به رنگ قهوه‌ای است و به اندازه ۳/۵ تا ۴/۵ میلیمتر که دارای ۴ تا ۶ نسل در سال است و تخم‌ریزی حشره ماده روی مواد غذایی و شکاف دانه انجام می‌شود. در مناطق گرم و مرطوب بیشتر وجود دارد (شکل ۳-۱۰).

خسارت این آفت در درجه اول متوجه دانه و آرد غلات است اما به خشکبار مثل کشمش، بادام، گردو و میوه خشک نیز خسارت وارد می‌نماید.



الف - لارو شپشه آرد

ب - شپشه آرد

شکل ۳-۱۱

۴- شپشه آرد: سوسکی است کوچک به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز تا قهوه‌ای تیره و به اندازه ۴/۵ میلیمتر، تخم ریزی آفت، گستردۀ است و هر حشره ماده در روز ۲ تا ۳ عدد و در طول زندگی ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ عدد تخم می‌گذارد. تخمها چسبنده‌اند و با محصول و حتی کيسه‌ها جایجا می‌شوند (شکل ۱۱-۳).

حدوده فعالیت این آفت در ۱۲ تا ۳۵ درجه حرارت است. لاروها پوست اندازی دارند و پوسته‌ها و فضولات حشره، باعث کاهش کیفیت محصول می‌شود.

خسارت در درجه اول متوجه مواد نرم مثل آرد و سبوس غلات است و علاوه بر آن به دانه‌های کتان، کنجد و بادام زمینی نیز خسارت می‌زند.



۵- ریزوپرتا: سوسکی است به طول ۲/۵ میلیمتر و دارای رنگ قهوه‌ای مایل به عنابی برآق دارای چند نسل در سال و بیشتر در نواحی گرمسیری فعالیت دارد (شکل ۳-۱۲).

لاروهای جوان این حشره، به دانه‌های شکسته و آسیب دیده در اثر حمله دیگر آفات خسارت وارد می‌کنند اما در سنین بالا بیشتر از دانه‌های سالم تغذیه می‌کنند.

این آفت به دانه غلات و حتی نان و بیسکویت نیز خسارت وارد می‌نماید.

شکل ۳-۱۲- ریزوپرتا



شکل ۳-۱۳

۶- سوسکهای نخودفرنگی و باقلاء: سوسکهایی هستند سیاه تا قهوه‌ای به اندازه ۴ تا ۵ میلیمتر که زمستانها در انبار حبوبات مثل نخودفرنگی و باقلاء و لوبيا زندگی می‌کنند. سوسک نخودفرنگی منحصرًا از دانه این محصول استفاده می‌کند (شکل ۳-۱۳).

تخم ریزی آفت بیشتر در مزرعه و روی غلافهای محصول که تازه تشکیل شده انجام می‌شود و لاروها پس از خارج شدن از تخم وارد دانه می‌شوند.

۷- سوسک لوبيا: حشره كامل به رنگ خاکستری و به طول ۲ تا ۴/۵ ميليمتر است. در اواخر زمستان در انبارها ظاهر می شود. تخمریزی اين حشره بیشتر در انبار صورت می گيرد. لاروها پس از تغذیه محصول و تبدیل حشره كامل به مزارع نیز حمله کرده، موجب خسارت می شوند (شکل ۳-۱۴) در سال قادر به تولید چند نسل است. اين آفت در درجه اول به لوبيا خسارت می زند اگر لوبيا موجود نباشد به سایر دانه های حبوبات حمله می کند.



ب - طرز خسارت سوسک لوبيا

شکل ۳-۱۴



شکل ۳-۱۵

۸- جوندگان (موس): موش مهمترین آفت انباری در دنیا به حساب می آيد. خسارت موشها از نظر کمی (استفاده از محصول)، کیفی (آلوده کردن محصول به فضولات، ادرار، موهای بدن)، صنعتی (جویدن کابلهای برق و مخابرات، ایجاد کanal زیر بی و تأسیسات) و بهداشتی (بروز بیماریها مثل طاعون، تیفوس، حصبه و ...) ابعاد گسترده ای دارد.

۲۰۰ عدد موش در طی ۲۴ ساعت، ۷ کيلوگرم محصول مصرف کرده؛ ۱۴۰۰ فضله و معادل ۴/۰ لیتر ادرار و تعداد غیرقابل شمارشی موی بدن خود را در محصول پخش می کنند. موشها دو تا سه برابر دانه تغذیه کرده را آلوده و غیرقابل مصرف می سازند. موشها دارای انواع مختلفی هستند.

موس خانگی: موش کوچکی است به طول بدن ۷/۵ و طول دم حدود ۷ سانتيمتر؛ دارای دم بلند و بدون مو. در منازل و انبارها وجود دارد.

موس انباری: شبیه موش خانگی ولی بزرگتر است و تقریباً دو برابر موش خانگی است. بیشتر در انبارها وجود دارد (شکل ۳-۱۵).

آشنایی با روش‌های پیشگیری و کنترل آفات انباری
علاوه بر روش‌های قبلی مثل دود دادن، سمپاشی و حرارت دادن، در کنترل آفات از طعمه مسموم نیز استفاده می‌شود.

چگونگی تهیه و کاربرد طعمه مسموم: در کنترل آفات، خصوصاً موش در انبار، از طعمه مسموم به شیوه‌های زیر استفاده می‌شود.

۲۰ گرم + ۱۰۰ گرم فسفر دوزنگ + ۱ کیلوگرم گندم روغن کتان

+ ۵۰ تا ۶۰ گرم فسفر دوزنگ + ۱ کیلوگرم دانه ذرت یا خربزه ۲۰ گرم روغن کتان

۵۰ یا ۱۰۰ گرم + ۱ کیلوگرم سیب زمینی یا هویج یا چغندر قند فسفر دوزنگ

طرز تهیه: گندم یا ذرت یا دانه خربزه را در ظرفی ریخته روغن کتان را بتدريج روی آن برزيده و با چوب بهم بزنيد تا دانه‌ها به طور يکنواخت به روغن آغشته گردد. سپس بتدريج فسفر دوزنگ را روی دانه‌ها برزيده به طوری که دانه‌ها به سم آغشته گردد و بلا فاصله طعمه را برای کنترل مورد استفاده قرار دهيد (شکل ۳-۱۶).

موش مهاجر: در منازل و باغچه‌های اطراف منزل زندگی می‌کند و موش کوچکی است با دم کوتاه، تقریباً از موش خانگی کوچکتر است.


موش ورامین: به رنگ خرمایی مایل به خاکستری دارای دم بلند و بدون مو (دو برابر طول بدن). لاله گوش مشخص و بیرون از مو. خسارت این جونده غالباً متوجه مزارع و ریشه درختان است.

موش معان: موشی نسبتاً کوچک با دم بسیار کوچک و به اندازه $\frac{1}{4}$ بدن به رنگ زیتونی روشن؛ به مزارع غلات خسارت وارد می‌کند.

در انبارها آفات دیگری مثل سوسزیها، پروانه‌های مختلف که بيشتر لارو آنها به محصولات خسارت وارد می‌کند، کنه‌ها و پرندگان موجب بروز خسارت به محصولات انباری می‌شوند که می‌توانند آنها را شناسایی نمایند. در این زمینه از هنرآموزان و کتب آفات استفاده کنید.

کار عملی

کلکسیونی از آفات انباری تهیه، شناسایی و ارائه نمایید. در این کلکسیون، مراحل مختلف زندگی آفات مثل تخم لارو و شفیره، حشره کامل می‌تواند وجود داشته باشد.



شکل ۳-۱۶ - طعمه آماده مصرف «کلت» به صورت‌های پلت (PELLET)، مکعبهای روغنی (WAX BLOCK) و ... برای استفاده در شرایط مختلف مناسب می‌باشد.

آب و هوایی بیرون، کمتر در انبار تأثیر بگذارد.

۳- پنکه‌های لازم برای انجام تهویه در انبار تعییه شده باشد.

۴- قبل از استفاده از انبار، انجام نظافت و ضد عفونی قسمتهای مختلف ضروری است.

ب - مراقبت از محصول:

۱- بازرسی و کنترل محصول قبل از ورود به انبار از نظر فساد، آلودگی، خلوص، میزان رطوبت و ممانعت از ورود محصولات غیراستاندارد در این زمینه‌ها

۲- برای نگهداری محصول بیشتر از کیسه استفاده می‌شود و چیدن کیسه‌ها روی هم در ردیفهای منظم با اختصاص راهرو برای دسترسی و جابجایی هوا ضروری است.

۳- در صورت نگهداری محصول به صورت توده و باز در انبار، باید توجه داشت که محصول در قشری کم عمق روی هم ریخته شود و عمل هوادادن و زیر و رو کردن محصول فراموش نگردد.

۴- درجه حرارت و رطوبت نسبی و نور انبار به طور مرتب کنترل و متعادل گردد.

۵- کنترل آفات انباری به روش‌های مختلف و مناسب، به طور مستمر انجام گردد.

۶- از مخلوط کردن محصولات مختلف در انبار جداً خودداری شود.

۷- محصولات فاسد شده و زاید بلا فاصله از انبار خارج شود و عوامل فساد سریعاً شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام گردد.

برای محصولات آبدار مثل هویج، چندر و سیب‌زمینی، آنها را به قطعات کوچکی به اندازه یک حبه قند تقسیم نمایید و سپس سم را روی آنها پاشیده و با یک قطعه چوب هم بزنید.

با این طعمه‌ها (هر مورد حدود ۲۰۰ لانه طعمه‌گذاری می‌شود. برای جوندگان بزرگتر و درشت‌تر، مقدار فسفر دوزنگ ۲ برابر (حدود ۱۰۰ گرم) استفاده می‌شود. از سبوس نیز برای تهیه طعمه مسموم استفاده می‌شود.

۶ گرم گامکسان + ۴ لیتر آب + ۱۰ کیلو سبوس. ابتدا سم در آب حل شده و سپس روی سبوس ریخته و هم زده می‌شود. از این طعمه برای مبارزه با سوسکهای انباری و کنه‌ها نیز استفاده می‌شود.

طعمه‌های آماده با استفاده از موادغذایی و انواع سموم مثل کلریت نیز به صورت تجاری موجود است که با خاصیت ضدانعقادی موجب ازبین رفتن موشها می‌شود.

کار عملی

با توجه به دستورالعمل فوق مقداری طعمه مسموم تهیه نمایید.

اصول انبارداری محصولات مزروعی و باغی

الف - از نظر ساختمانی:

۱- انبارهای ذخیره‌دانه باید بلندتر از محیط اطراف و دیوارهای آن سیمانی و نفوذناپذیر باشد تا از ورود آب، جوندگان و موریانه‌ها در امان باشد.

۲- تبادل حرارتی دیوارها و سقف انبار کم باشد تا تغییرات

پیمانه مهارتی: نگهداری محصول در انبار شماره شناسایی: ۳-۹-۱۰-۱-۷۹ ک	مهارت: آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات شماره شناسایی: ۹-۱۰-۱-۷۹ ک
---	--

آزمون نهایی

- ۱- از دلایل انبار کردن محصولات کشاورزی حداقل ۵ مورد را ذکر نمایید.
- ۲- عوامل فاسد کننده محصولات کشاورزی را نام بیرید.
- ۳- برای حذف ناخالصیهای فیزیکی و بیولوژیکی محصولات قبل از انبار کردن، از چه روشی استفاده می شود؟
- الف : سلکسیون ب : بوخاری ج : هیبریداسیون د : خرمنکوبی
- ۴- برای تعیین درجه خلوص بذر، میزان بذر نمونه در محصولات درشت دانه و ریزدانه به ترتیب عبارت است از :
- الف : ۵ کیلو و ۱ کیلو ب : ۵۰۰ گرم و ۱۰۰ گرم
- ج : ۲/۵ کیلو و ۵۰ کیلو د : ۵۰ کیلو و ۱۰ کیلو
- ۵- در خشک کردن مصنوعی محصول، درجه حرارت هوای گرم نسبت به درجه حرارت دانه چگونه است؟
- الف : ۱۵ تا ۲۰ درجه بیشتر ب : ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر ج : ۳۵ درجه بیشتر د : ۳۵ درصد بیشتر
- ۶- عوامل زیان آور انباری را که موجب تلفات محصول می شود ذکر نمایید.
- ۷- خسارت عمده میکروارگانیسمها در انبار بر روی کدام قسمت یا ترکیبات محصولات زیر انجام می شود؟
- الف : گندم ب : دانه های روغنی
- ۸- عوامل مؤثر در رشد میکروارگانیسمها را ذکر نمایید.
- ۹- در انبارهای فاقد سیستم تهویه، هوادادن محصول چگونه انجام می شود؟
- ۱۰- از نظر ساختمانی دیوارها و سقف انبار چه شرایطی را باید دارا باشد؟
- ۱۱- بیشتر کپکها در حرارت کمتر از فعالیت خیلی کمی دارند و یا می باشد.
- ۱۲- به ازای هر درجه افزایش دمای انبار، شدت تنفس دانه ها برابر می شود.
- ۱۳- نور زیاد چه تأثیری در نگهداری سیب زمینی در انبار دارد؟
- الف : تیره گی رنگ غده ها ب : ایجاد لکه های سبز رنگ
- ج : ایجاد لکه های رنگ پریده د : ایجاد لکه های روشن متمایل به سفید
- ۱۴- در صورت بروز فساد و آلودگی در قسمتی از محصول در انبار انجام چه عملیاتی ضروری است؟
- ۱۵- روش های ضد عفونی در انبارها را فقط نام بیرید.
- ۱۶- چگونگی روش دود دادن و استفاده از سموم را در انبار توضیح دهید.
- ۱۷- سمپاشی با سموم شیمیایی بر روی محصولات در چه صورتی مجاز است و از چه سمومی استفاده می گردد؟
- ۱۸- طرز تهیه طعمه مسموم با استفاده از سبوس را توضیح دهید.
- ۱۹- در طرز تهیه طعمه مسموم با استفاده از یک کیلوگرم گندم . ۲۰ گرم روغن کنان، چه میزان سم فسفر دوزنگ مورد نیاز است؟
- الف : یک کیلوگرم ب : ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ گرم ج : ۵۰ یا ۱۰۰۰ گرم د : ۱ تا ۵ کیلوگرم

پیمانهٔ مهارتی: آیش‌بندی

شمارهٔ شناسایی: ۴-۹-۱۰-۷۹/ک

مهارت: آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات

شمارهٔ شناسایی: ۹-۱۰-۷۹/ک

پیمانهٔ مهارتی شماره چهار آیش‌بندی

هدف کلی

شناسایی گیاهان زراعی منطقه و تدوین برنامه آیش‌بندی آنها

هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این پیمانهٔ مهارتی باید بتواند:

- ۱- آیش‌بندی را تعریف نموده، ضرورتها و اصول آیش‌بندی را نام ببرد.
- ۲- فواید و مضرات زراعت تکمحصولی را توضیح دهد.
- ۳- اراضی زراعی را براساس اصول آیش‌بندی تقسیم نماید.

زمان (ساعت)	
عملی	ثوری
۱۲	۵

آزمون ورودی

۱- فضول کاشت گیاهان زراعی زیر را مشخص نمایید.

گندم، چغندر قند، ذرت، سورگوم، یونجه، نخود، باقلاء، سیب زمینی، نیشکر، پنبه

الف : پاییزه (زمستانه)

ب : بهاره

۲- مراحل تهیه زمین برای کاشت گیاهان زراعی را به صورت کلی ذکر کنید.

۳- تفاوت گیاهان بهاره و پاییزه را به صورت کلی بیان نمایید.

۴- عوامل اقلیمی مؤثر بر رشد و نمو گیاهان زراعی را نام ببرید.

۵- مصرف آب در کدامیک از گیاهان زراعی زیر کمتر است؟

الف : نیشکر ب : برنج ج : گندم
د : چغندر قند

۶- کدام گیاه به ازت (کود ازته) بیشتری نیاز دارد؟

الف : ذرت علوفه‌ای ب : یونجه ج : شبدر د : اسپرس

۷- گیاهانی که میزان مشترک یک آفت هستند در صورت تکرار کشت چه اثری در جمعیت آفت به همراه دارند؟

۸- کنترل زراعی علفهای هرز را شرح دهید.

۹- کودهای آلی را نام بده، اثرات آنها را در حاصلخیزی خاک شرح دهید.


۱۰- گیاهان وجینی را توضیح داده، حداقل ۴ گیاه وجینی را نام ببرید.

تعیین نوع گیاه برای کاشت

چه محصولی بکاریم؟



چه محصولی بکارم



شکل ۱-۴

برای مثال بعضی از گیاهان مثل یونجه، آهک دوست و بعضی دیگر مثل کتان، آهک گریز هستند. در جدول ۱-۴ بعضی از نیازهای شاخص گیاهان زراعی آورده شده است.

هر گیاه بسته به وضعیت و خواص نژادی، در محیط بخصوصی رشد و نمو و سازگاری مناسب دارد یا به عبارت ساده‌تر احتیاج گیاهان به خاک، آب، حرارت، نور و ... متفاوت می‌باشد.

پیمانه مهارتی: آیش‌بندی شماره شناسایی: ۹۰۱۰۹۴/ک	مهارت: آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات شماره شناسایی: ۹۰۱۰۹۱/ک
--	---

جدول ۱ - ۴

نوع گیاهان زراعی	خاک	شرایط آب و هوایی	نور	رطوبت
گندم	عموماً اراضی رس دار	در اکثر شرایط آب و هوایی بسته به رقم	روز بلند	۴ تا ۸ هزار مترمکعب؛ نیاز آبی در مناطقی با بیشتر از ۳۰۰ میلیمتر تزوالت به صورت کشت دیم
جو	متوسط و دارای مقداری شن	در اکثر شرایط آب و هوایی؛ در مقابل سوری، خشکی و گرم مقاوم	روز بلند	۳ تا ۵ هزار مترمکعب؛ در بیشتر از ۲۵۰ میلیمتر تزوالت کشت دیم امکان پذیر
برنج	لیمونی و رسی	مرطوب استوایی و گرم یا معتدل	روز کوتاه	۹ تا ۱۲ هزار مترمکعب؛ سازگار با مناطقی دارای ۱۰۰۰ میلیمتر بارندگی
ذرت	رسی آهکی یا رسی شنی عمیق، pH حدود ۵/۵ تا ۷	مناطق گرم	روز کوتاه	۹ هزار مترمکعب
نیشکر	لیمونی	گرم و نیمه گرم	روز کوتاه	نیاز به ۸۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیمتر بارندگی دارد بیش از ۲۰ هزار مترمکعب
چغندر قند	رسی شنی دارای مواد آلی	معتدل	روز بلند	بیش از ۷۰۰۰ مترمکعب
بنبه	رسی آهکی عمیق	نیمه گرم	روز کوتاه	۱۰ هزار مترمکعب نیاز آبی و با بیش از ۵۰۰ میلیمتر بارندگی کشت دیم
سویا	رسی شنی و عمیق	مرطوب معتدل	روز کوتاه	نیاز به ۷۰ میلیمتر بارندگی
آفتابگردان	شنی رسی و یا رسی شنی حساس به خاکهای شور	گرم معتدل	غیرحساس	۴ تا ۷ هزار مترمکعب
سیب‌زمینی	رسی شنی یا شنی رسی pH حدود ۵/۵ تا ۶	آب و هوایی خنک و معتدل	غیرحساس	۱۲ تا ۱۶ هزار مترمکعب
توتون	شنی رسی	معتدل	روز کوتاه	۴ تا ۴/۵ هزار مترمکعب
بونجه	لیمونی عمیق (رسی شنی آهکدار)	در مناطق خشک و مناطق سرد تا گرم بسته به نوع رقم	روز بلند	۱۲ تا ۱۸ هزار مترمکعب
شبد	رسی و آهکی	مرطوب و نسبتاً سرد	روز بلند	به آب زیادی نیاز دارد (بیشتر از بونجه)

«تک کشتی» نامیده می‌شود که هرچند استفاده از این روش دارای محاسن محدودی است اما بمراتب معاوی بیشتری دارد و به همین دلیل امروزه در کشاورزی پیشرفت‌های کمتر از این روش استفاده می‌شود.

برای ایجاد مهارت در آیش‌بندی و تناوب لازم است ابتدا با معاوی و محاسن زراعت تک محصولی آشنا شویم.

معاوی

۱- خشکی و مسمومیت زمین: دراثر کشتِ ممتد یک گیاه حتی با استفاده از بهترین ترکیب کودی، در درازمدت، عملکرد به نحو مؤثری کاهش پیدا خواهد کرد که این امر، از خستگی و مسمومیت زمین ناشی می‌شود. باید توجه داشت افزایش ترشحات ریشه یک گیاه باعث ایجاد خستگی و مسمومیت زمین (اللوپاتی) خواهد شد. این موضوع در بعضی از گیاهان مثل کتان شدت بیشتری دارد (شکل ۴-۲).

در عمل برای تعیین زراعت در یک منطقه از تطبیق انواع گیاهان زراعی و طریقهٔ کشت آنها با عوامل طبیعی (اقلیمی)، اقتصادی و همچنین تلفیق عملیات زراعتی برای تولید اقتصادی بیشتر با زحمت و هزینهٔ کمتر استفاده می‌شود.

بر این اساس گیاهانی را انتخاب می‌نمایند که با داشتن مزایای اقتصادی - اجتماعی، سازگاری بیشتری با منطقه داشته باشند.

زراعت تک محصولی (تک کشتی)

در گذشته و در زراعت سنتی، کشت گیاهان در یک زمین زراعی به صورت پیاپی و ممتد انجام می‌شد مثلاً اگر برای مدت طولانی فقط کشت گندم یا در بعضی مناطق فقط کشت برنج و ... بر روی یک زمین صورت گیرد. این استفاده از یک نوع محصول، «زراعت یکطرفه» یا «تک محصولی» و یا




شکل ۴-۲- استقبال زمین از گیاه جدید

۲— کاهش مواد غذایی: در اثر کشت پیاپی یک محصول با نیاز خاص به یک عنصر غذایی و با توجه به وضعیت گسترش ریشه، عمق مشخصی از خاک نسبت به عنصر غذایی بخصوصی فقیر خواهد شد. مثلاً ریشه یونجه، شدیداً فسفر و پتاس اعماق خاک را کاهش می‌دهد (شما نیز مثالی ارائه نمایید).

۳— افزایش آفات و بیماریها: کشت ممتد یک گیاه باعث تجمع آفات و بیماریهای بخصوصی با توجه به شرایط مساعد و وجود میزبان مناسب در طول سالهای پیاپی خواهد شد مثل آفت کرم ساقه خوار برنج یا بوته میری جالیز (حداقل دو مثال نیز شما ارائه نمایید) (شکل ۳-۴).



شکل ۳-۴— افزایش آفات و بیماریها



شکل ۴-۴— غلبه علف هرز بر بعضی از گیاهان

۴— افزایش علفهای هرز: در اثر کشت تک محصولی، علفهای هرز گیاهان میزبان به نحو مؤثری افزایش می‌یابد. در حالی که با تغییر گیاه میزبان شرایط مناسب رشد علفهای هرز نیز ازین خواهد رفت مثلاً رشد و توسعه یولاف در کشت ممتد گندم (مثال دیگری را شما ارائه نمایید) (شکل ۴-۴).

جو و...)، کشت بهاره یا تابستانه (چغندر، جالیز، پنبه و...) و اراضی نکاشت (آیش)، مجموعاً یک عمل آیش‌بندی می‌باشد. ضرورت آیش‌بندی: با آیش‌بندی مزرعه یا تقسیم زراعت در مکان (قطعات) و تنوع نوع محصولات، ضمن برخورداری از یک برنامه مدرن کاری مزایایی به شرح زیر حاصل می‌گردد:

- ۱- به حداقل رساندن ریسک در تولید با توجه به تغییر ناگهانی قیمت محصولات و نیز بروز بلایای طبیعی: در صورت کشت یک محصول بدون برنامه کاری و در صورت کاهش شدید قیمت، خسارت جبران ناپذیری به تولید کننده وارد خواهد شد و یا در صورت بروز یک عامل نامساعد جوی، امکان ازبین رفتن یک نوع محصول حساس وجود خواهد داشت اما گیاه مقاوم آسیب زیادی نخواهد دید مثلاً در یک مزرعه با وجود قطعات گوجه‌فرنگی و بادمجان و بروز یک تگرگ بوته‌های گوجه‌فرنگی دچار خسارت شدید خواهد شد در حالی که این خسارت بر روی بوته‌های بادمجان در حداقل است.

بررسی خسارت کشت تک محصولی و عدم آیش‌بندی از طریق شرایط نامساعد جوی، نوسانات بازار و ... در منطقه، به‌شما محول می‌گردد این موضوع را تحقیق نمایید.

- ۲- حصول حداقل سود با ترکیب کاشت گیاهان مختلف با توجه به میزان آب: هر گیاه نیاز آبی خاصی داشته و در فضول و ایامی از سال حساسیت جدی و حیاتی به کمبود آب دارد و در ایامی نیاز به حداقل آب دارد و در اواخر رشد و بعد از برداشت این نیاز به صفر خواهد رسید. با آیش‌بندی می‌توان راندمان استفاده از آب را به حداقل افزایش داد، به‌طوری که:

الف) هیچ آبی به هدر نرود.

ب) حداقل استفاده از آب موجود به عمل آید.

ج) هیچ یک از محصولات در دورهٔ حساس رشد با کم‌آبی مواجه نشود.

- ۳- توزیع زمانی نیروی کار و ماشین‌آلات: با آیش‌بندی، گیاهان به گونه‌ای تقسیم‌بندی می‌شوند که در هریک از فضول

۵- عدم استفاده بهینه از وسائل و امکانات: با انجام زراعت تک کشتی استفاده کامل از وسائل و نهاده‌ها انجام نمی‌شود و آب، زمین، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و ... در فضولی از سال معطل و بلااستفاده خواهد ماند که این عمل نه علمی خواهد بود و نه اقتصادی.

با بررسی زراعت تک کشتی در مزارع منطقهٔ خود، معایب دیگری را شناسایی و تحقیق نمایید.

محاسن تک کشتی

همانگونه که گفته شد زراعت تک کشتی از محاسن محدودی برخوردار است که به‌طور شاخص عبارت‌اند از:

- ۱- کسب مهارت و تجربهٔ نیروی انسانی برای اجرای عملیات مختلف بر روی یک محصول (مثلاً برنج کاری در شمال، خربزه کاری در مناطق مرکزی)

- ۲- عدم نیاز به تهیه ماشین‌آلات گسترده و متنوع برای محصولات مختلف.

- ۳- استفاده از منابع و امکانات محدود درجهت کشت گیاهان محدود سازگار مثل کشت دیم غلات در مناطقی که دارای نزولات محدود در پاییز و زمستان هستند.

آیش‌بندی چیست؟

پس از مشخص شدن نوع گیاهان زراعی برای کاشت در مزرعه، با توجه به عملیات زراعی، شرایط اقلیمی، میزان آب، فصل کاشت و امکانات و وسائل موجود و بازار فروش و ...، سطح زیرکشت گیاهان مورد نظر تعیین خواهد شد و بر این اساس قطعه‌بندی در مزرعه برای کاشت صورت می‌گیرد. این تقسیم زمین مزرعه به قطعاتی که از نظر عملیات زراعی و اقتصادی مشابه هستند «آیش‌بندی» نامیده می‌شود.

باید توجه داشت که آیش‌بندی با آیش تفاوت دارد و آیش به قطعه زمین زراعی گفته می‌شود که کاشت ناشده باقی مانده باشد. تقسیم اراضی یک مزرعه به کشت پاییزه (گندم،

۱- ضروری است فرآگیر دست کم پنج مورد دیگر را بر شمارد.

شاید با ذکر جواب خیر، به سفت شدن سطح خاک، رویش علفهای هرز، فرسایش خاک، کند شدن فعالیت موجودات زنده خاک و... در اثر رهانمودن اراضی آیش اشاره نمایید. به درست است. اینها بخشی از عوارض ناشی از رهاکردن اراضی به آیش گذاشته شده می‌باشد.

عملیات داشت در زمین آیش

برای کمک به افزایش اثرات مفید ناشی از آیش آموختیم که اجرای عملیات مختلف در سال آیش لازم و ضروری است. پس از برداشت محصول قبلی، از دو روش عمدهٔ عملیاتی در اراضی آیش استفاده می‌شود.

۱- آیش همراه با شخم (کاه و کلش زراعت قبلی با شخم زیر خاک می‌شود).

۲- آیش همراه با کاه و کلش

در صورتی که در منطقه باد شدید وجود داشته باشد یکی از این دو روش برای مقابله با فرسایش کارسازتر خواهد بود.

به نظر شما کدام‌یک در این زمینه مفیدتر است؟ چرا؟

با استفاده از دستگاههای پیشرفتهٔ تهیهٔ زمین و بکارگیری شیوه‌های مدرن در اراضی آیش که موجب به‌جا ماندن کاه و کلش در مزرعه می‌شود:

۱- ذخیره‌سازی آب حاصل از برف و تزولات و نفوذپذیری خاک افزایش می‌یابد.

۲- ضربب تبخیر و هرز رفتن آب کاهش می‌یابد.

۳- از فرسایش آبی و بادی جلوگیری می‌شود.

۴- با انجام تهويهٔ مناسب، فعالیت موجودات زنده (ارگانیسمها) افزایش پیدا کرده، حاصلخیزی خاک بیشتر خواهد شد. در کشت دیم و در سال آیش، مهمترین هدف ذخیرهٔ رطوبت در خاک است و برای نگهداری و حفظ رطوبت برای کاشت زراعت بعدی عملیات بیشتری با استفاده از ماشین‌آلات مخصوص انجام می‌شود که ترتیب اجرای عملیات عبارت است از:

سال از نیروی کار و ماشین‌آلات حداکثر استفاده بعمل آید و این امکانات بالقوه تولیدی در هیچ زمانی به‌طور کامل بلااستفاده و معطل باقی نماند. برای مثال اگر در یک مزرعه فقط کشت گندم انجام شود و بعد از برداشت محصول، اراضی به آیش اختصاص داده شود در فصل تابستان نیروی انسانی و ماشین‌آلات مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و امکانات و سرمایه به‌هدر خواهد رفت.

۴- حفظ حاصلخیزی خاک: با اجرای آیش‌بندی، استعداد خاک به‌طور مناسب مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت و با برداشت صحیح و متعادل از آن، از خستگی و کاهش حاصلخیزی خاک در درازمدت ممانعت به عمل خواهد آمد.

کار عملی

بازدید یا نمایش فیلم از مزارعی که آیش‌بندی در آنها رعایت شده است.

چرا بخشی از اراضی به آیش (نکاشت) اختصاص داده می‌شود؟

از آنجا که با توجه به نیاز شدید به مواد غذایی، بخشی از اراضی مورد آیش قرار می‌گیرد این سؤال باقی است که چرا آیش اجرا می‌شود؟ دلایل عمدۀ استفاده از آیش عبارت است از:

۱- محدودیت امکانات مثل رطوبت، وسایل کاشت و فرصت زمانی برای زیرکشت بردن کلیهٔ اراضی

۲- ذخیرهٔ رطوبت در خاک

۳- ایجاد فرصت برای بازسازی و احیای حاصلخیزی خاک

۴- کاهش آفات و امراض

۵- کاهش علفهای هرز

آیا به نظر شما رها نمودن زمین آیش (بدون عملیات) کاری مبتنی بر علم و عقل است؟ چرا؟

کار عملی

بازدید یا نمایش فیلم از اراضی آیش که عملیات داشت در آنها اجرا شده است. این روش را با اراضی آیش به روش سنتی مقایسه نمایید.

تقسیم‌بندی قطعات در آیش‌بندی

پس از تعیین انواع محصول برای کاشت متناسب با وسعت اراضی، میزان آب و دیگر امکانات سطح زیرکشت، گیاهان انتخاب شده تعیین و بر حسب زمان کاشت بر روی اراضی مزرعه تقسیم خواهد شد. در آیش‌بندی باید توجه داشت که سطوح تقسیم شده برای هر قسمت یا هر زراعت، مضری از کوچکترین سطح زیرکشت انتخاب شده باشد.

برای مثال در صورتی که در یک مزرعه یکصد هکتاری کمترین سطح زیرکشت تعیین شده متعلق به چغندرقند با ۵ هکتار وسعت باشد و گیاهان انتخابی بر اساس عوامل مؤثر در تعیین نوع محصول گندم، جو، جالیز (خریزه، هندوانه) باشند و بخشی از اراضی نیز به آیش اختصاص داده شود یک آیش‌بندی با رعایت اصول مربوط می‌تواند به صورت زیر انجام گیرد:

الف - شخم پاییزه در سال آیش با استفاده از گاوآهن قلمی به منظور نرم کردن خاک و افزایش نفوذپذیری آن.

ب - شخم بهاره در سال آیش با استفاده از گاوآهن پنجه غازی به منظور از بین بردن علفهای هرز، از بین بردن لوله‌های مویین و افزایش نفوذپذیری خاک.

ج - ادامهٔ عملیات در بهار و تابستان با استفاده از گاوآهن پنجه غازی برای جلوگیری از سفت شدن سطح خاک و تشکیل لوله‌های مویین و مبارزه با علفهای هرز.

که در کل با اجرای این عملیات ۳۵ درصد رطوبت سالانه در زمین حفظ خواهد شد و همین رطوبت برای کشت بعد از آیش در پاییز سال بعد و سبز شدن زراعت، قبل از شروع تزوالت پاییزه کافی خواهد بود.

در روش سنتی در سال آیش، کاه و کلش با قیمانده به مصرف چرای دام می‌رسد. به نظر شما با توجه به اجرا نشدنِ عملیات زراعی در این اراضی، استفاده از این روش چه معایبی به همراه خواهد داشت؟ (حداقل در ۲ سطر توضیح دهید).

.....

.....

۱/۱	چغندرقند	۶	گندم طبسی
۱/۲	جالیز (خریزه)		
۲	جالیز (خریزه)	۷	گندم روشن
۳	جالیز (هندوانه)	۸	گندم قدس
۴	آیش	۹	زرجو
۵	آیش	۱۰	جو آربیوات

کار عملی

- ۱- بر اساس آنچه آموخته‌اید در منطقه تحصیلی یا استان محل سکونت خود، حداقل چهار گیاه زراعی غالب منطقه را شناسایی نموده، عوامل مؤثر در انتخاب این گیاهان را بررسی و دسته‌بندی نمایید. سپس یک نقشه آیش‌بندی برای این گیاهان تدوین کنید.
- ۲- اگر سطح زیرکشت کوچکترین زراعت در یک مزرعه دو هکتار و برای آفتابگردان تعیین شده باشد و دیگر گیاهان زراعی مورد کاشت سویا، پنبه، گندم و جو و کل وسعت مزرعه ۴۰ هکتار باشد، بر اساس اصول مربوط، یک نقشه آیش‌بندی برای این مزرعه تهیه و تنظیم نمایید.
- ۳- حداقل دو گیاه مناسب برای منطقه خود که کشت آنها در حال حاضر در محل رایج نیست ولی دارای ویژگیهای مناسب و سازگاری مطلوب هستند انتخاب و با ذکر دلایل معرفی کنید.
- ۴- تحقیق نمایید که:
 - الف - چرا سطح زیرکشت خربزه‌کاری در گیلان و مازندران، کم و سطح زیرکشت برنج، زیاد است؟
 - ب - چرا سطح زیرکشت پنبه و شبدر در مناطق مرکزی ایران کم است؟
 - ج - چرا نیشکر در خوزستان، توسعه بیشتری نسبت به چغندر قند دارد؟
- ۵- حداقل از دو مزرعه که آیش‌بندی در آنها انجام گرفته است بازدید به عمل آورید و چگونگی آیش‌بندی در آنها را بررسی و تحلیل نمایید.

در این آیش‌بندی اصولی رعایت شده است که مهترین آنها عبارت اند از :

- ۱- تقریباً ۵۰ درصد سطح زیرکشت، به غلات ریزدانه شامل ۳۰ هکتار گندم و ۲۰ هکتار جو اختصاص داده شده است. باید توجه داشت که به دلیل سازگاری و مقاومت گندم و جو در مقابل سرمای زمستان و برای استفاده از نزولات آسمانی و دیگر امکانات تولیدی در این فصول به طورنسبی این مقدار از اراضی به کاشت غلات ریزدانه اختصاص داده می‌شود.
 - ۲- ۵۰ درصد بقیه اراضی به ۲۰ هکتار آیش و ۳۰ هکتار گیاهان زراعی صیفی (شامل چغندر ۵ هکتار + ۲۵ هکتار جالیز) اختصاص دارد. برحسب منطقه و میزان آب موجود و دیگر عوامل مؤثر در تولید، این سطوح و نوع گیاهان تغییرپذیرند.
 - ۳- تمامی سطوح زیرکشت یا آیش، مضری از کوچکترین سطح زیرکشت یعنی چغندر قند (۵ هکتار) می‌باشد.
 - ۴- نسبت گیاهان پاییزه و یا گیاهان صیفی و آیش برحسب امکانات، خصوصاً میزان آب متغیر است.
 - ۵- جدول آیش‌بندی، شمالی از وضعیت مزرعه خواهد بود و با توجه به مقیاس، عیناً قابل پیاده کردن در مزرعه است. باید توجه داشت که ممکن است سطح زیرکشت برای سالیان مختلف یکسان باشد اما جای گیاهان زراعی در آیش‌بندی تغییر می‌یابد. زیرا در صورت ثابت بودن نوع گیاه در هر قطعه و در طول سالیان متتمادی معايب زراعت تک کشتنی در این قطعات تا حدودی بروز پیدا خواهد کرد.
- براساس تجربیات علمی و فنی، کشت پایپی یک محصول در یک قطعه جایز نیست و در هر سال می‌باید نوع محصول هر قطعه به صورت چرخشی تغییر نماید که اصول مربوط در مهارت اجرای تناوب مورد بحث و عمل قرار خواهد گرفت.

آزمون نهایی

۱- تک کشته، یعنی کشته که :

- الف : به وسیله یک کشاورز انجام می‌شود. ب : تنها شامل یک محصول است.
ج : در یک کشور و یا یک قاره انجام می‌شود. د : منحصر به فرد و نمونه باشد.

۲- آیش یعنی :

الف : تقسیم زراعت در مکان

ب : تقسیم زراعت در زمان

ج : زمین زراعی مورد استراحت در یک فصل زراعی

د : زمینی که دارای حداکثر محصول و رسیدگی باشد.

۳- در آیش‌بندی :

الف : اندازه قطعات مساوی و برابر است.

ب : تعداد محصولات (گیاهان) بهاره و پاییزه مساوی است.

ج : کلیه قطعات به آیش اختصاص داده می‌شود.

د : هیچکدام

۴- در تعیین نوع گیاه زراعی برای هر منطقه کدام دسته از عوامل مؤثرند؟

الف : اقتصادی، سیاسی، فرهنگی

ب : اقلیمی، سیاسی، اجتماعی

ج : فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی

د : اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی

۵- ذرت، گیاهی است روز بلند مناطق گرم و طالب مناطق معتدل روز کوتاه می‌باشد.

۶- پنبه به خاک رسی آهکی و حدود ۱۰ هزار مترمکعب آب نیاز دارد.
شنی هوموسی ۲۰ هزار مترمکعب

۷- کشت ممتد یک محصول در یک قطعه زمین موجب می‌شود.

الف : افزایش درآمد

ب : افزایش کیفیت

ج : خستگی و مسمومیت زمین

د : بهبود حاصلخیزی خاک

۸- مزایای آیش‌بندی و تنوع گیاهان زراعی در یک مزرعه را فقط نام بیرید.

۹- در مناطقی که باد شدید در آنها جریان دارد، استفاده از کدام روش در آیش توجیه می‌شود؟

الف : آیش بدون عملیات

ب : آیش همراه با چرای دام

ج : آیش همراه با شخم کاه و کلش

د : آیش همراه با کاه و کلش

۱۰- عملیات سال آیش در اراضی دیم را به ترتیب ذکر نماید و مشخص کنید این عملیات با چه وسایلی انجام می‌شود؟

۱۱- در اراضی آیش، چرای دام و عدم انجام عملیات زراعی چه معایبی را به همراه خواهد داشت؟

۱۲- در یک طرح آیش‌بندی نسبت سطح زیرکشت غلات ریزدانه به بقیه اراضی چگونه است؟

الف: $\frac{1}{3}$ ب: $\frac{1}{3}$ ج: $\frac{1}{3}$

۱۳- در تقسیم‌بندی قطعات آیش‌بندی سطح زیرکشت کمترین محصول چه نسبتی با بقیه سطوح خواهد داشت؟

الف: همه قطعات به همین اندازه تعیین می‌شود.

ب: این سطح در تعیین مساحت بقیه قطعه‌ها اثری ندارد.

ج: همه قطعات، مضربی از سطح این قطعه می‌باشد.

د: سطح زیرکشت گیاهان بهاره به همین اندازه و پاییزه دو برابر آن منظور می‌شود.

۱۴- محل گیاهان زراعی در یک مزرعه در طول سالیان مختلف می‌باشد.

الف: ثابت ب: متغیر

ج: بسته به نظر کشاورز می‌تواند همیشه ثابت باشد. د: بسته به عوامل محیطی می‌تواند همیشه ثابت باشد.

۱۵- آیش‌بندی عبارت است از :

الف: کاشت ناشده باقی ماندن زمین

ب: تقسیم اراضی به قطعاتی با عملیات زراعی و زمان کاشت مشابه

ج: تسلسل کشت گیاهان در طول زمان در یک قطعه

د: مرزبندی کردن زراعت

۱۶- در زراعت تک محصولی (تک کشتی)

الف: میزان محصول بیشتر است.

ب: کیفیت محصول بالاتر است.

ج: میزان محصول کم و آفات و بیماریها بیشتر است.

د: میزان محصول زیاد و آفات و بیماریها کمتر است.

۱۷- قطعاتی از زمین زراعی که کاشت نشده باقی می‌ماند چه نامیده می‌شود؟

الف: آیش ب: بایر ج: آیش‌بندی د: مواد

۱۸- در یک مزرعه به وسعت ۱۲ هکتار، کدام تقسیم‌بندی براساس اصول فنی انجام شده است؟

الف: حبوبات ۱ هکتار، جالیز ۱ هکتار، چغندر قند ۲ هکتار، آیش ۲ هکتار، غلات ۶ هکتار

ب: حبوبات $\frac{1}{3}$ هکتار، جالیز $\frac{1}{7}$ هکتار، چغندر قند $\frac{3}{4}$ هکتار، آیش $\frac{1}{2}$ هکتار، غلات $\frac{4}{4}$ هکتار

ج: حبوبات ۱ هکتار، جالیز $\frac{2}{5}$ هکتار، چغندر قند $\frac{1}{5}$ هکتار، آیش ۲ هکتار، غلات ۵ هکتار

د : حبوبات ۲ هکتار، جالیز ۲ هکتار، چغندرقند ۲ هکتار، آیش ۲ هکتار، غلات ۴ هکتار

۱۹- کشت ممتد یک محصول در یک قطعه زمین

ب : اقتصادی است.

د : نه علمی و نه اقتصادی است.

۲۰- عمدۀ ترین دلایل کاهش سطح زیر کشت پنبه را ذکر نماید.

۲۱- چغندرقند گیاهی است روزکوتاه و طالب آب و هوای معتدل می‌باشد.
روز بلند گرم

۲۲- آیا در زمین آیش نیاز به اجرای عملیات زراعی می‌باشد؟ چرا؟

۲۳- حداقل چهار مورد از اثرات مفید آیش را نام ببرید.

۲۴- قطعات طرح زیر را به زراعتهای گندم، جو، چغندرقند، جالیز، حبوبات و آیش اختصاص دهید و علل اساسی این تقسیم‌بندی را به اختصار ذکر نمایید. (اندازه قطعات مساوی و هر کدام ۲ هکتار است.)

۶	۷	۸	۹	۱۰
۱	۲	۳	۴	۵

پیمانهٔ مهارتی شماره پنج تناوب

هدف کلی

تهیه برنامه تناوبی برای مزارع در مناطق مختلف

هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این پیمانهٔ مهارتی باید بتواند:

- ۱- تناوب را تعریف کند و معایب کشت ممتد را توضیح دهد.
- ۲- اصول آیش‌بندی را شناخته، آنها را در تناوب بکار گیرد.
- ۳- گیاهان باغی و زراعی را با نظم و ترتیب معین در جدول تناوبی قرار دهد.
- ۴- جداول تناوبی را براساس اصول فنی و علمی برای مناطق و شرایط مختلف ترسیم نماید.

مهارتها و اطلاعات مورد نیاز

- مهارت آیش‌بندی
- مهارت کاشت

زمان (ساعت)	
عملی	تئوری
۱۲	۵

آزمون ورودی

۱- دلایل گسترش علوفه‌ای هرز را توضیح دهید.

۲- زمان کاشت گیاهان زیر را براساس دو فصل پاییزه (زمستانه) و بهاره (تابستانه) مشخص نماید.
گندم، چغندرقند، ذرت، سویا، پنبه، جو، برنج، سیب‌زمینی، سورگوم، نخود، باقلاء، عدسی، لوبيا، نیشکر،
بونجه، شبدر، اسپرس.

الف : پاییزه ب : بهاره

۳- کدام یک از گیاهان زیر دارای ریشه افشار سطحی هستند؟

الف : گندم ب : پنبه ج : سیب‌زمینی د : سورگوم

۴- نیاز کدام گیاه به پتاس بیشتر است؟

الف : گندم ب : سورگوم ج : چغندرقند د : ذرت

۵- زمان برداشتِ موقع گیاهان زیر را شرح دهید :

الف : گندم

ب : ذرت (برای سیلوشدن)

ج : بونجه

د : چغندرقند

۶- نیاز آبی کدام گیاه بیشتر است؟

الف : پنبه ب : گندم ج : چغندرقند د : نیشکر

۷- آیش چیست؟

الف : تغییرات زمان کشت گیاهان ب : تغییر زراعت در مکان

ج : زمین زراعی کاشته شده برای یک یا دو فصل زراعی

د : تقسیم اراضی به قطعات مشابه از نظر عملیات زراعی و فصل کاشت

۸- آیش‌بندی را تعریف نماید.

۹- چه عواملی در تعیین نوع زراعت در یک منطقه مؤثرند؟ آنها را دسته‌بندی نموده، نام ببرید.

۱۰- فاصله برداشت گندم و کاشت چغندرقند بعد از زراعت گندم حداقل چه مدت است؟ چرا؟

همین اساس جداول به صورت دو ساله، سه ساله و چند ساله تهیه و تنظیم می‌شود.

اجرای یک کار عملی برای تعیین دوره تناوب: برای تعیین دوره تناوب و یا تنظیم جدولهای مربوط در یک مزرعه مثلاً اگر با توجه به عوامل مختلف، گیاهان زراعی مانند گندم، جو، جالیز (خربزه) حبوبات مد نظر باشند و کوچکترین سطح زیر کشت مربوط به حبوبات و در سطح سه هکتار تعیین شده باشد سطوح زیر کشت دیگر محصولات با توجه به شرایط و امکانات، مضربي از وسعت این قطعه خواهد بود. برای مثال:

کشت صیفی .	حبوبات	۱ قطعه	۳ هکتار
کشت شتوی .	جو	۲ قطعه	۶ هکتار
کشت شتوی .	گندم	۳ قطعه	۹ هکتار

آیش .	نکاشت	۲ قطعه	۶ هکتار
-------	-------	--------	---------

در این تقسیم‌بندی پنج قطعه به کشت شتوی و سه قطعه به کشت صیفی و دو قطعه به آیش اختصاص داده شده است. مشاهده می‌شود که اراضی مورد نظر، به ۱۰ قطعه تقسیم گردیده و در یک دوره ۱۰ ساله، یک بار حبوبات، دو بار جالیز (خربزه)، دو بار جو، سه بار گندم و دو بار آیش وجود دارد.

بنابراین دوره تناوب در این مزرعه ۱۰ ساله خواهد بود برای اجرای دقیق‌تر تناوب در زراعتهایی که به بیش از یک قطعه نیاز دارند، می‌توان از ارقام مختلف یک محصول استفاده نمود مثلاً برای کشت گندم که در سه قطعه به اجرا درمی‌آید در مناطق مرکزی ایران می‌توان ارقام قدس، طبسی و روشن را در هر قطعه کشت کرد.

اصول تناوب

بدیهی است قرار گرفتن گیاهان پشت سر هم در تناوب، تصادفی نیست بلکه مبتنی بر اصول و نکات فنی می‌باشد که برای

تناوب چیست و چرا انجام می‌شود؟

در آیش‌بندی متوجه شدیم که در اثر کشت پیاپی یا ممتد یک نوع گیاه در قطعه زمین معین در طول سالهای مختلف، معایبی به شرح زیر وجود خواهد داشت:

۱- خستگی و مسمومیت زمین (آلوباتی)

۲- افزایش آفات و بیماریها

۳- افزایش علفهای هرز

۴- کاهش حاصلخیزی خاک حتی با وجود مصرف کود

و مواطنیهای لازم

۵- معطل و بی‌استفاده ماندن امکانات، مثل نیروی انسانی، ماشین‌آلات، آب، اراضی و... در مدتی از ایام سال

۶- بروز مشکلات اقتصادی ناشی از نوسان قیمتها، کسر بازار در بعضی از سالها

۷- زیانهای ناشی از بروز عوامل نامساعد جوی

برای خنثی کردن این عوامل و معایب و حداقل استفاده از امکانات برای تولید بیشتر ناچار به تغییر یا گردش نوع زراعت طی سالهای مختلف در یک قطعه زمین زراعی هستیم مثلاً در زمینی که امسال به کشت صیفی اختصاص دارد در سال بعد کشت غلات و سال سوم آیش انجام خواهد شد که این چرخش زراعت در طول سالیان مختلف «تناوب» نام دارد. به عبارت دیگر، تسلیسل (کشت پشت سر هم) گیاهان مختلف در یک قطعه زمین براساس نظم و ترتیب معین طی سالهای مختلف «تناوب» نامیده می‌شود. آموختیم که تناوب تقسیم زراعت در طول زمان است همانگونه که آیش‌بندی تقسیم زراعت در مکان بود.

برای اجرای تناوب و تنظیم جداول مربوط نیازمند مهارت و اطلاعات دیگری از جمله تعیین دوره تناوب هستیم.

دوره تناوب چگونه تعیین می‌شود؟

زمان بین دو عبور یک کشت را در هر قطعه زمین زراعی (دوره تناوب) می‌گویند به عبارت دیگر، دوره تناوب، زمانی است که جدول تناوبی یک دوره کامل مورد اجرا قرار می‌گیرد و بر

اجرای تناوب باید مورد توجه قرار گیرد. این اصول فنی به اختصار عبارت اند از:

۱- تغذیه گیاهی: گیاهان از نظر عمق توسعه ریشه و نیاز غذایی با هم اختلاف دارند و متفاوتند. مثلاً بعضی از آنها مثل غلات، دارای ریشه افشار بوده، از منابع سطحی خاک استفاده می‌کنند و برخی دیگر مثل پنبه و یونجه دارای ریشه عمیق هستند و از منابع غذایی عمق خاک برخوردار می‌شوند همچنین نیاز غذایی گیاهان یکسان نیست. مثلاً بعضی از گیاهان ازت زیادی می‌خواهند و عده‌ای به پاس علاقه بیشتری دارند و بعضی دیگر آهک دوست یا نیازمند فسفر زیاد هستند. در تناوب، گیاهان مشابه از نظر ریشه یا نیاز غذایی یکسان، باید پشت سر هم قرار داده شوند.

۲- مسمومیت خاک: کشت پیاپی یک نوع از گیاهان در یک قطعه، باعث افزایش غلظت ترشحات ریشه بخصوصی در خاک می‌گردد که در نهایت موجب مسمومیت خاک خواهد شد. خصوصاً در گیاهانی مثل کتان، این ترشحات و مسمومیت از شدت بیشتری برخوردار است. برای جلوگیری از مسمومیت خاک (آللوپاتی) از کشت پیاپی این گیاهان در یک قطعه زمین باید خودداری شود.

۳- شیوع آفات و بیماریها: برای جلوگیری از شیوع و طغیان آفات و بیماریها باید از کشت گیاهانی که میزبان آفت یا بیماری مشترک هستند خودداری به عمل آید. مثلاً در صورت کشت پیاپی (پشت سر هم) گیاهانی مثل پنبه و گوجه فرنگی که میزبان کرم غوزه هستند جمعیت این آفت با وجود میزبان مناسب، افزایش خواهد یافت.

۴- گسترش علفهای هرز: هر دسته از گیاهان دارای علف هرز بخصوصی هستند که در صورت توالی کشت، دسته بخصوصی از گیاهان علفهای هرز مشترک یا همزیست آنها بهشدت افزایش می‌یابد. بهتر است ابتدا با دسته‌های مختلف گیاهان که نقش مؤثری در زیست و رشد علفهای هرز دارند آشنا شویم (شکل ۱-۵).



دم رو باهی



تاج خروس



تاتوره



خرفه



سوروف



پنجه مرغی



تاج ریزی



چمن

شکل ۱-۵


الف - دسته‌ای از گیاهان مثل ارزن در مقابل علفهای هرز قادر به رقابت نیستند و موجب افزایش علفهای هرز می‌شوند که به آنها از نظر توسعه علفهای هرز «کثیف‌کننده» می‌گویند (شکل ۵-۲).



شکل ۵-۲ - غلبه علف هرز بر زراعت

ب - دسته دیگری از گیاهان با رشد سریع و غلبه بر علفهای هرز موجب کاهش رشد و توسعه آنها می‌شوند به این‌گونه گیاهان «خفه‌کننده علف هرز» می‌گویند مثل جو و گندم سیاه (شکل ۵-۳).

ج - دسته‌ای از گیاهان به تمیزکننده علف هرز یا گیاهان وجدی معروف‌اند که به دلیل رشد کند این گیاهان، زارعین مجبور به مبارزه و دفع علفهای هرز (وجین) در این‌گونه زراعتها می‌باشند. به همین دلیل در این گروه از گیاهان علفهای هرز به مقدار زیادی از بین برده می‌شود (شکل ۴-۵).



شکل ۵-۳ - بعضی از گیاهان خفه‌کننده علفهای هرز هستند.



شکل ۴-۵ - کنترل علفهای هرز در کشت‌های ردیفی و زراعتها و جینی

گیاهان در برنامه تناوب قرار خواهند گرفت و در صورت محدودیت آب، گیاهان خشکی دوست مثل گندم، جو، نخود و اسپرس جای بیشتری را در تناوب به خود اختصاص خواهند داد.

۶- حاصلخیزی خاک: عوامل دیگری مثل میزان ماده آلی موجود در بقایای زراعت به جا مانده برای حفظ حاصلخیزی خاک نیز در اجرای تناوب مؤثرند و باید در انتخاب گیاهان به گونه‌ای برنامه‌ریزی انجام شود که گیاهان مناسب در تناوب وجود داشته باشند و با استفاده از این گیاهان، امکان بهجای ماندن شاخ و برگ و بقایای گیاهی برای افزایش هوموس خاک فراهم باشد مثلاً کاه و کلش غلات، شاخ و برگ سبب زمینی و نخودفرنگی باعث افزایش هوموس می‌گردد.

د- در انواع گیاهان زراعی، علفهای هرز همزیست خاصی وجود دارد؛ مثلاً در گیاهان آب دوست، انواع خاص علف هرز مثل سوروف گسترش می‌باید در حالی که در گیاهانی مثل بونجه و سبزیجات، انگل (سس) بخوبی تکثیر و توسعه پیدا می‌کند.

در تناوب، از کشت پیاپی یک گروه مشابه باید خودداری شود.

۵- میزان آب: چون نیاز آبی گیاهان متفاوت است طبعاً یکی از عوامل مؤثر در تعیین نوع زراعت میزان آب خواهد بود. در صورت وجود آب فراوان، سطح زیر کشت گیاهان آب دوست مثل نیشکر، برنج، یونجه و پنبه افزایش خواهد یافت و این گونه



شکل ۵-۵- باقیمانده کاه و کلش در زراعت پس از جمع آوری بسته‌های کاه

لازم برای انجام عملیات خاکورزی و آماده نمودن زمین برای کاشت وجود داشته باشد مثلاً در تناوب پنبه و گندم، این فرصت به اندازه کافی وجود ندارد در حالی که در تناوب خود و گندم مشکلی از این نظر وجود نخواهد داشت.

۹- در مناطق دارای محدودیت تزوالتات یا امکانات یا نیروی انسانی، سطح قطعات آیش افزایش پیدا خواهد کرد.

۱۰- جدول تناوبی به صورت مربع تنظیم می‌گردد یعنی تعداد قطعات با تعداد سالهای اجرای یک تناوب مساوی خواهد بود.

			قطعه
			سال
۳	۲	۱	
جو بهاره	پنبه	شبدر	اول
شبدر	جو بهاره	پنبه	دوم
بنبه	جو بهاره	شبدر	سوم

مثلاً در تناوب سه قطعه‌ای، سالهای تناوب نیز سه ساله می‌باشد.

۱۱- در ستونهای افقی و عمودی، از تکرار گیاهان باید اجتناب شود. مواردی که بیش از یک قطعه به یک نوع زراعت اختصاص می‌یابد، استثناست.

۱۲- برای تنظیم جدول تناوبی، ابتدا یکی از ستونهای عمودی یا افقی براساس ترتیب قرار گرفتن گیاهان و اصول مربوط تنظیم خواهد شد. برای مثال در صورت لزوم استفاده از گیاهانی مثل ذرت، چغندر قند، حبوبات، گندم و شبدر یا نیاز به آیش براساس اصول تناوب، ترتیب قرار گرفتن گیاهان و آیش در ستون اول عبارت است از:

شبدر، چغندر قند، حبوبات، ذرت، گندم و آیش برای تنظیم ردیف یا ستون دوم محصول، موجود در خانه اول (در اینجا شبدر) از جای خود به انتهایِ ردیف منتقل خواهد شد. یعنی:

۱- شبدر، چغندر قند، حبوبات، ذرت، گندم، آیش و...

چگونگی انجام و تنظیم یک برنامه تناوب برای اجرای یک برنامه تناوب، رعایت موارد زیر ضروری است:

۱- از نظر بیولوژیکی بهتر است در برنامه تناوب، ۵۰ درصد غلات، ۵۰ درصد نباتات دیگر نظر نباتات وجینی (چغندر قند، سیب زمینی، پنبه و ذرت) یا نباتات لگومینوز علوفه‌ای (شبدر، یونجه و اسپرس) و یا لگومینوز حبوبی (خود، لوبیا، باقلاء و عدس) و یا نباتات روغنی (برزک، آفتابگردان و شاهدانه) و آیش در نظر گرفته می‌شود.

۲- گیاهان وجینی به دلیل نیاز فراوان به مواد غذایی و هوموس، پس از محصولاتی که موجب افزایش این مواد در خاک می‌شوند مثل گیاهان علوفه‌ای لگومینوز و یا بعد از مصرف کود آلی قرار داده می‌شوند.

۳- در صورت استفاده از دو گیاه وجینی در یک برنامه تناوب ابتدا گیاهی که موقع بیشتری دارد منظور خواهد شد مثلاً در صورت استفاده از چغندر قند و ذرت در یک تناوب، چون چغندر قند دارای موقع بیشتری است ابتدا این گیاه در تناوب قرار می‌گیرد.

۴- حبوبات در تناوب در بین دو گیاه وجینی یا قبل از غلات دانه ریز قرار می‌گیرند چون گیاه وجینی زمین را از نظر تمیز شدن علف هرز برای حبوبات آماده می‌نماید و حبوبات نیز با تثبیت ازت از نظر مواد غذایی، زمین را برای غلات مهیا خواهد ساخت.

۵- غلات دانه ریز بعد از گیاهان وجینی یا حبوبات، در تناوب قرار خواهد گرفت.

۶- آیش یا نکاشت، می‌تواند قبل از گیاه وجینی یا بعد از غلات و یا انتهای تناوب قرار گیرد.

۷- گیاهان علوفه‌ای چند ساله معمولاً در اول تناوب قرار داده می‌شود.

۸- در ترتیب قرار گرفتن گیاهان باید دقت شود که بین برداشتِ محصول زراعتِ اول و کاشت زراعتِ بعدی، فاصله

۵- گندم، آیش، شبدر، چغندرقند، حبوبات و ذرت

۶- آیش، شبدر، چغندرقند، حبوبات، ذرت و گندم

و چون تعداد قطعات ۶ مورد است تعداد سالهای اجرایی

این تناوب نیز ۶ سال خواهد بود و جدول تناوبی به صورت مریع

۶×۶ تهیه و تنظیم می شود که ردیف افقی و عمودی شماره ۱ تا

۶ براساس ردیفهای تعیین شده فوق جایگذاری شده است و

بدیهی است ردیفهای افقی و عمودی هر شماره جدول با هم برابر

و یکسان می باشد.

۲- چغندرقند، حبوبات، ذرت، گندم، آیش و شبدر

در ردیف ۳ نیز گیاه موجود در خانه اول ردیف ۲ به انتهای

ردیف منتقل خواهد شد و این روش تا تعیین آخرین ستون یا

ردیف اجرا خواهد شد.

۱- شبدر، چغندرقند، حبوبات، ذرت، گندم و آیش

۲- چغندرقند، حبوبات، ذرت، گندم، آیش و شبدر

۳- حبوبات، ذرت، گندم، آیش، شبدر و چغندرقند

۴- ذرت، گندم، آیش، شبدر، چغندرقند و حبوبات

۶	۵	۴	۳	۲	۱	قطعه سال
آیش	گندم	ذرت	حبوبات	چغندرقند	شبدر	اول
شبدر	آیش	گندم	ذرت	حبوبات	چغندرقند	دوم
چغندرقند	شبدر	آیش	گندم	ذرت	حبوبات	سوم
حبوبات	چغندرقند	شبدر	آیش	گندم	ذرت	چهارم
ذرت	حبوبات	چغندرقند	شبدر	آیش	گندم	پنجم
گندم	ذرت	ذرت	حبوبات	چغندرقند	شبدر	ششم

حال، برای مهارت در تنظیم جدول تناوب، خانه های
جداول زیر را که در مناطق مختلف کشور مورد اجرا می باشد
تکمیل نمایید.

۲	۱	قطعه سال
گندم	حبوبات	اول
		دوم

۲	۱	قطعه سال
آیش	گندم	اول
		دوم

۳	۲	۱	قطعه سال
گندم	حبوبات	سیب زمینی	اول
			دوم
			سوم

پیمانهٔ مهارتی: تناوب شمارهٔ شناسایی: ۵-۹-۱۰-۷۹/ک	مهارت: آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات شمارهٔ شناسایی: ۹-۱۰-۷۹-۱-۱۰/ک
--	--

					قطعه سال
۴	۳	۲	۱		
آیش	گندم	حبوبات	پنبه		اول
					دوم
					سوم
					چهارم

حال جداولی را که تکمیل نموده اید با نمونهٔ تکمیل شده مقایسه نموده، اشکالات احتمالی را برطرف کنید.

		قطعه سال
۲	۱	
گندم	حبوبات	اول
حبوبات	گندم	دوم

		قطعه سال
۲	۱	
آیش	گندم	اول
گندم	آیش	دوم

					قطعه سال
۳	۲	۱			
گندم	حبوبات	سیب زمینی			اول
سیب زمینی	گندم	حبوبات			دوم
حبوبات	سیب زمینی	گندم			سوم

					قطعه سال
۴	۳	۲	۱		
آیش	گندم	حبوبات	پنبه		اول
پنبه	آیش	گندم	حبوبات		دوم
حبوبات	پنبه	آیش	گندم		سوم
گندم	حبوبات	پنبه	آیش		چهارم

کار عملی

- ۱- گیاهان زراعی غالب منطقه را شناسایی نمایید. (حداقل ۵ گیاه)
- ۲- یک جدول تناوبی براساس اصول فرا گرفته شده با استفاده از گیاهان شناسایی شده (گیاهان غالب منطقه) تهیه و تنظیم نمایید.
- ۳- با استفاده از مریب آموزش دهنده، اشکالات احتمالی را برطرف نمایید.
- ۴- با بازدید از مزارع، چگونگی اجرای تناوب را بررسی کنید. تفاوت بین اجرای تناوب و عدم آن را در عملکرد مزارع مشاهده و تحقیق نموده، گزارش کار تهیه نمایید.

آزمون نهایی

۱- آیش بندی عبارت است از تقسیم زراعت در و تناوب زراعی عبارت است از تقسیم زراعت در

۲- منظور از مسمومیت و خستگی خاک یا آللوپاتی چیست؟

الف: ایجاد مسمومیت با ریختن سوم شیمیایی توسط افراد ناآگاه

ب: ایجاد مسمومیت با ریختن سوم علف کش توسط افراد ناآگاه

ج: افزایش غلظت ترشحات ریشه در اثر کشت پیاپی یک گیاه

د: موارد الف و ب

۳- گیاهانی که میزبان مشترک یک آفت یا بیماری هستند چگونه در تناوب قرار می‌گیرند؟

ب: با فاصله زمانی بیش از یک سال

الف: پشت سر هم

د: کلیه گیاهان یک تناوب را تشکیل می‌دهند.

ج: اصلاً در یک تناوب با هم قرار نمی‌گیرند.

۴- حبوبات در تناوب، قرار دارند.

الف: بعد از غلات

ب: قبل از گیاهان علوفه‌ای

ج: در آخر تناوب

د: بین دو گیاه وجینی یا قبل از غلات

۵- اصول و نکات فنی مورد نظر در تسلسل کشت گیاهان (تناوب) را فقط نام بیرید.

۶- با توجه به امکان تأمین نیاز غذایی اراضی با استفاده از کودهای شیمیایی و آلی و استفاده از سوم شیمیایی و علف کشها برای مقابله با آفات و بیماریها و علفهای هرز، آیا باز هم تناوب زراعی دارای اهمیت و کاربرد است؟ دلایل آن را بنویسید.

۷- محل قرار گرفتن گیاهان وجینی در برنامه تناوبی زراعی را ذکر نمایید.

۸- در کدام ترتیب، قرار گرفتن گیاهان فاصله برداشت زراعت اول و کاشت زراعت بعدی نامناسب می‌باشد؟

الف: آفتابگردان - گندم

ج: پنبه - گندم

۹- ترتیب قرار گرفتن کشتهای یونجه (۲ ساله)، گندم - پنبه (وجینی)، لوبيا (حبوبات) و آیش را در یک

تناوب مشخص نمایید.

۱۰- با استفاده از گیاهان و موارد سؤال ۹، یک برنامه تناوب (جدول) برای اجرا در یک مزرعه تنظیم نمایید.

۱۱- تناوب عبارت است از

الف: گردش زراعت در زمان

د: استراحة اراضی زراعی

۱۲- مسمومیت خاک (آللوپاتی) به علت حاصل می‌شود.

الف: استفاده از سوم شیمیایی

د: روش کشت کپهای

ج: کشت پیاپی یک گیاه

پیمانه مهارتی: تناوب شماره شناسایی: ۹۵-۱۰۷۹-۱۰۷۹/ک	مهارت: آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات شماره شناسایی: ۹-۱۰۷۹-۱۰۷۹/ک
---	--

۱۳- گیاهان و جینی در تناوب،..... قرار دارند.

- الف : قبل از آیش
ج : بعد از غلات

ب : بعد از استفاده از کود حیوانی یا قبل از حبوبات
د : بعد از گیاهان صنعتی

۱۴- در تناوب، از نظر ترکیب کشت، غلات دانه ریز در کجا قرار دارند؟

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ب : قبل از گیاهان و جینی یا حبوبات | الف : بعد از گیاهان و جینی یا حبوبات |
| د : پس از استفاده از کود حیوانی | ج : در اول تناوب |

۱۵- فاصله برداشت زراعت اول و تاریخ کاشت زراعت دوم چگونه است؟

- الف : هیچ فاصله‌ای بین آنها وجود ندارد.

ب: فاصله مناسب پرای انجام عملیات خاک ورزی پاید وجود داشته باشد.

- ج : حداقل یک سال فاصله برای حاصلخیزی و عملیات تکمیلی نیاز دارد.
د : فاصله زمانی در تناوب مطرح نیست.

۱۶- جداول تناوب زراعی به صورت تنظیم می شود.

- الف : خطى** **ب : مستطيل** **ج : مربع** **د : ستونى**

۱۷- ما توجهه به تر تسب قرار گرفته، گاهان در تناوب، کدام مود صحبت است؟

- الف : حفندر، قند، حيوانات، گندم و آش

ب: حمیه بات، حغند، قند، آش و گندم

- ج : گندم، چغندرقند، آیش و حبوبات
د : آیش، گندم، حبوبات و چغندرقند

۱۸- در تنظیم جدول تناوب، در هر ستون یا ردیف تکرار یک گیاه زراعی چگونه است؟

- الف : يکبار** ب : دو بار

ج : محدودیتی ندارد. د : مضری از تعداد گیاهان انتخابی است.

۱۹- ترتیب قرار گرفتن گندم، سیب زمینی، حبوبات، آیش و ذرت دانه‌ای را در تناوب مشخص نمایید.

۲۰- یک جدول تناوبی با استفاده از گندم، سیب زمینی، آیش، حبوبات و ذرت دانه‌ای تنظیم کنید.

پاسخ سوالات آزمون نهایی پیمانه شماره یک

۱- در رسیدن فیزیولوژیکی، رشد طبیعی محصول کامل شده است و پس از آن به وزن خشک محصول چیزی اضافه نمی شود اما در رسیدن تجاری محصول قابل عرضه به بازار است و ممکن است این زمان با رسیدن فیزیولوژیکی همزمان نباشد.

۲- ج

۳- رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد، شدت تابش و بارندگی

۴- الف

۵- میزان سرمایه، مزد کارگر، هزینه ماشینآلات برداشت، بازار مصرف، راههای ارتباطی، وسایل حمل و نقل و ...

۶- بازار مصرف و تقاضای زیاد، پایین بودن هزینه کار و ماشینآلات، وجود وسایل حمل و نقل و ...

۷- ریزش محصول، خسارت آفات، کاهش کیفیت، کاهش ارزش غذایی

۸- ریزش محصول، باقی ماندن قسمتی از محصول در مزرعه، طولانی شدن دوره برداشت، کاهش کیفیت محصول

۹- ج

۱۰- دستگاه انتقال حرکت، کفس و کفسکها، صفحه و میله ردیف‌ساز، قسمتهای برش‌دهنده، ضامن ایمنی اتصال سه نقطه، قاب دستگاه

۱۱- لق می‌زند، خمیده می‌شود.

۱۲- الف

۱۳- به دو نوع عمودی و بشقابی تقسیم می‌شوند و از محفظه به منظور حفاظت تیغه‌ها و جلوگیری از پخش شدن علوفه بریده شده استفاده می‌شود.

۱۴- دارای انواع دو تا چهار چرخ، پایه بلند و پایه کوتاه است و جلوبرندی غالب آنها برای برداشت غلات و علوفه قابل تعویض است و بازدهی آنها ۳ تا ۵ هکتار است.

۱۵- ب

۱۶- د

۱۷- روند بعد از هر ۲۴ ساعت کار تعویض می‌شود. هواکش پس از هر ۸ ساعت کار تمیز می‌شود. فیلتر گازوئیل پس از مصرف چهار بار سوخت تمیز و در پایان فصل تعویض می‌شود.

۱۸- کم - زیاد

۱۹- ابتدا بازوی سمت چپ، سپس بازوی سمت راست و بعد از آن گاردان به بی‌تی او متصل می‌شود. در غده‌کنهای معمولی گاردان وجود ندارد و عمق کار بهوسیله دستگاه هیدرولیک یا چرخ تنظیم عمق به گونه‌ای تنظیم می‌شود که عمیق‌ترین محصول از خاک خارج شود.

۲۰- د

<p>پیمانه مهارتی: تناوب شماره شناسایی: ۵-۹-۱۰-۱-۷۹/ک</p>	<p>مهارت: آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات شماره شناسایی: ۹-۱۰-۱-۷۹/ک</p>
--	--

پاسخ سوالات آزمون نهایی پیمانه مهارتی شماره دو

- ۱- سیلوها مخازن نگهداری محصولات کشاورزی است که با دارا بودن شرایط خاص، موجب حفظ کیفیت محصول می شوند و به سه دسته زمینی، سطحی و هوایی تقسیم می گردند.
- ۲- در مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالاست و به شکل وان
- ۳- ب
- ۴- از دو قسمت تشکیل شده اند ۱- برج کار برای بوجاری و کنترل سیلو ۲- انبار ذخیره شامل کندوهای گرد و ستاره ای برای نگهداری محصول
- ۵- ج
- ۶- این سیلو خاکی و محدود است و در داخل زمین به شکل دوزنقه ایجاد می شود و برای جلوگیری از اختلاط محصول با خاک روی دیواره های آن را با کاه و کلش می پوشانند.
- ۷- دو گروه، با تهويه و بدون تهويه
- ۸- محصول با استفاده از نقاله از مخزن خارج و در معرض هوای شدید قرار داده می شود و سپس به قسمت دیگری منتقل می گردد.
- ۹- خاکی، ساده کلشی و مدرن (بتنی)، که در حال حاضر سیلوی مدرن (بتنی) بیشتر مورد استفاده می باشد.
- ۱۰- ذرت علوفه ای، سورگوم، نقاله و برگ چغندر، برگ چغندر علوفه ای
- ۱۱- الف
- ۱۲- ج
- ۱۳- ب
- ۱۴- الف
- ۱۵- کمتر از ۱۴ درصد، کمتر از ۱۲ درصد
- ۱۶- پس از پرشدن سیلو از محصول، روی آن ۱۰ سانتیمتر کاه ریخته می شود. سپس روی آن پلاستیک می کشیم و نهایتاً روی پلاستیک با سنگ، کاه و کاهگل پوشیده می شود.
- ۱۷- سیاه، بوی سوختگی و آمونیاک
- ۱۸- د
- ۱۹- در درجه حرارت های ۸ تا ۳۰ درجه حاصل می شود و موجب ثبات، پایداری و مرغوبیت محصول می گردد.
- ۲۰- عدم دقت در سیلو کردن و ورود هوای زیاد به داخل توده محصول سیلو شده موجب می شود که درجه حرارت بالا برود و تخمیر داغ حاصل شود.

مهارت: آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات
شماره شناسایی: ۹۰۱۱_۷۹_۱۱/ک
پیمانه مهارتی: تناوب
شماره شناسایی: ۹۵_۱۱_۷۹/ک

پاسخ سؤالات آزمون نهایی پیمانه مهارتی شماره سه

پیمانهٔ مهارتی: تناوب شمارهٔ شناسایی: ۵-۹-۱۰-۱-۷۹/ک	مهارت: آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات شمارهٔ شناسایی: ۹-۱۰-۱-۷۹/ک
--	---

پاسخ سوالات آزمون نهایی پیمانهٔ مهارتی شماره چهار

- ۱- ب
- ۲- ج
- ۳- د
- ۴- ج
- ۵- روز کوتاه - گرم
- ۶- رسی آهکی - ۱۰ هزار مترمکعب
- ۷- ج
- ۸- به حداقل رسیدن رسیک در تولید - حصول حداکثر سود و بهره‌گیری بیشتر از آب و امکانات - توزیع زمانی نیروی کار و ماشین‌آلات و حفظ حاصلخیزی خاک
- ۹- د
- ۱۰- الف : شخم پاییزه با گاوآهن قلمی ب : شخم بهاره با گاوآهن پنجه غازی
ج : ادامهٔ عملیات بهاره و تابستانه با پنجه غازی
- ۱۱- الف : سطح خاک عاری از هرگونه پوشش گیاهی می‌شود و در طول دورهٔ آیش کاملاً عربان می‌ماند و در معرض فرسایش قرار خواهد گرفت.
ب : سطح خاک سفت و غیرقابل نفوذ خواهد شد و رطوبت به جای ذخیره شدن، در سطح خاک جاری و تبدیل به سیل می‌گردد.
- ۱۲- الف
- ۱۳- ج
- ۱۴- ب
- ۱۵- ب
- ۱۶- ج
- ۱۷- الف
- ۱۸- الف
- ۱۹- د
- ۲۰- مسایل اقتصادی مثل بالا بودن دستمزد کارگران، نامتناسب بودن قیمت فروش در مقایسه با هزینه‌ها،
گران بودن ماشین‌آلات
- ۲۱- روز بلند - معتمد
- ۲۲- بله؛ چون در زمین رها شده حاصلخیزی و کنترل آفات و علفهای هرز بخوبی انجام نمی‌شود و اهداف آیش‌گذاری از نظر نفوذپذیری و... حاصل نخواهد شد.
- ۲۳- ذخیرهٔ رطوبت، افزایش نفوذپذیری، ایجاد فرصت برای احیای حاصلخیزی خاک، کنترل آفات،

بیماریها و علوفهای هرز (۴ مورد کافی است).

۲۴- ۵۰ درصد قطعات به کشت غلات ریزدانه (گندم و جو) اختصاص دارد و ۵۰ درصد دیگر به کشت‌های بهاره و آیش و کلیه قطعات، مضری از کوچکترین سطح زیر کشت دو هکتار خواهد بود. در تقسیم قطعات ۱ تا ۵ سطح زیر کشت کوچکترین قطعه را می‌توان کمتر منظور کرد مثلاً ۱ هکتار چغندر قند و بقیه مضری از آن خواهد بود.

سطح جو و گندم نیز قابل تبدیل می‌باشد.

گندم	گندم	گندم	جو	جو
۶	۷	۸	۹	۱۰
آیش	چغندر	حبوبات	جالیز	جالیز
۱	۲	۳	۴	۵

پاسخ سوالات آزمون نهایی پیمانهٔ مهارتی شماره پنج

۱- مکان - زمان

۲- ج

۳- ب

۴- د

۵- تغذیه گیاهی - گسترش علفهای هرز - مسمومیت خاک - شیوع آفات و بیماریها - میزان آب -
میزان ماده آلی

۶- به؛ چون این شرایط مانع ایجاد خستگی و مسمومیت خاک، استفاده متناسب از عوامل و امکانات تولید
و..... نخواهد شد.

۷- بعد از محصولاتی چون گیاهان علوفه‌ای لگومینوز و یا بعد از مصرف کود آلی که موجب افزایش مواد
غذایی و هوموس می‌شوند.

۸- ج

۹- یونجه، یونجه، پنبه، لوبيا، گندم و آيش

۱۰- برنامهٔ تناوب مورد نظر چنین خواهد بود :

۶	۵	۴	۳	۲	۱	قطعه سال
آيش	گندم	لوبیا	پنبه	یونجه	یونجه	اول
یونجه	آيش	گندم	لوبیا	پنبه	یونجه	دوم
یونجه	یونجه	آيش	گندم	لوبیا	پنبه	سوم
پنبه	یونجه	یونجه	آيش	گندم	لوبیا	چهارم
لوبیا	پنبه	یونجه	یونجه	آيش	گندم	پنجم
گندم	لوبیا	لوبیا	پنبه	یونجه	یونجه	ششم

۱۱- الف

۱۲- ج

۱۳- ب

۱۴- الف

۱۵- ب

۱۶- ج

۱۷- الف

۱۸- الف

پیمانه مهارتی: تناوب شماره شناسایی: ۵-۹-۱۰-۱-۷۹/ک	مهارت: آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات شماره شناسایی: ۹-۱۰-۱-۷۹/ک
--	--

۱۹- گندم، آیش، سیب زمینی، حبوبات و ذرت

۲۰- جدول تناوبی مورد نظر چنین خواهد بود :

۵	۴	۳	۲	۱	قطعه سال
ذرت	حبوبات	سیب زمینی	آیش	گندم	۱
گندم	ذرت	حبوبات	سیب زمینی	آیش	۲
آیش	گندم	ذرت	حبوبات	سیب زمینی	۳
سیب زمینی	آیش	گندم	ذرت	حبوبات	۴
حبوبات	سیب زمینی	آیش	گندم	ذرت	۵

منابع و مأخذ

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| ۱- خواجه‌پور محمدرضا | اصول و مبانی زراعت | انتشارات جهاد دانشگاهی
دانشگاه صنعتی اصفهان |
| ۲- عطایی منصور | اصول زراعت | انتشارات دهخدا |
| ۳- خوشخوی مرتضی و دیگران | اصول باغبانی | انتشارات دانشگاه شیراز |
| ۴- علیزاده امین و دیگران | اصول زراعت در مناطق خشک (جلد دوم) | انتشارات آستان قدس
رضوی |
| ۵- باقری زنوز | روشهای مبارزه با آفات انباری و قرنطینهای انتشارات ادب | |
| ۶- وزارت آموزش و پرورش | سبزیکاری (خوداتکالی) | انتشارات وزارت آموزش
و پرورش |
| ۷- وزارت آموزش و پرورش | اصول دیمکاری | انتشارات وزارت آموزش
و پرورش |
| ۸- وزارت کشاورزی | مجموعه اطلاعات کشاورزی و دامداری | انتشارات سازمان ترویج
کشاورزی |
| ۹- وزارت آموزش و پرورش | تولید محصولات زراعی و باغی کد ۴۶۷ | انتشارات وزارت آموزش
و پرورش |
| ۱۰- وزارت آموزش و پرورش | زراعت سال دوم هنرستان کشاورزی
کد ۵۸۶ | انتشارات وزارت آموزش
و پرورش |

