

فصل ۳

پرورش دهنده سبزی و صیفی



معمولًاً پس از رویش بذرها یا مستقر شدن نشاءها در صورتی که مشاهده شود قسمتی از مزرعه بوته کافی ندارد و کشت کاملاً یکنواخت نیست، باید آن قسمت‌ها را واکاری کرد برای این کار با کاشتن نشا و یا مقداری بذر خیسانده شده، می‌توان بوته‌های مورد نیاز را تأمین کرد. معمولًاً این کار در زمین‌های کوچک انجام می‌گیرد. اگر در موقعی، در اثر پایین بودن قوه نامیه بذر، حمله آفات و سرمایزدگی، قسمت اعظم مزرعه بدون گیاه باشد، لازم است که به فوریت تمام مزرعه دوباره از همان بذر و یا بذر دیگر کاشته شود.



واحد یادگیری ۴

واکاری

مقدمه

معمولًاً پس از رویش بذرها یا مستقر شدن نشاها در صورتی که مشاهده شود قسمتی از مزرعه بوته کافی ندارد و کشت کاملاً یکنواخت نیست، باید آن قسمت‌ها را واکاری کرد. برای این کار با کاشتن نشا و یا مقداری بذر خیسانده شده، می‌توان بوته‌های مورد نیاز را تأمین کرد. معمولًاً این کار در زمین‌های کوچک انجام می‌گیرد. اگر در موقعی، در اثر پایین بودن قوه نامیه بذر، حمله آفات و سرمازدگی، قسمت اعظم مزرعه بدون گیاه باشد، لازم است که به فوریت تمام مزرعه دوباره از همان بذر و یا بذر دیگر کاشته شود.

استاندارد عملکرد

واکاری ۲۰۰۰ بوته یا ۱۰۰ مترمربع در یک روز کاری در شرایط مطلوب

واکاری

واکاری عملی عکس تنک کردن است.

کاشتن دوباره قسمت هایی از زمین را که به تعداد کافی در آن گیاه سبز نشده، واکاری گویند.

عوامل اقلیمی:

۱- سرما و یخندا

اگر اغلب سبزی های فصل گرم (بادمجان، کدو و گوجه فرنگی) را در اوایل بهار زودتر کشت کنید، هوای سرد و یخندا مانع سبز شدن گیاهان می شود. کلم یکی از سبزی های فصل سرد است و سرما را تا حدودی تحمل می کند.

۲- تگرگ

تگرگ یکی از عوامل اقلیمی سبز نشدن یا از بین رفتن گیاهان است.

۳- خشکی و گرمای هوا

اثر خشکی و گرمای بیش از حد برای بسیاری از سبزی های فصل سرد مناسب نمی باشد و باعث از بین رفتن و یا زودتر به گل نشستن آنها می شود. بادمجان یکی از گیاهان فصل گرم است و گرمای هوا را تا حدودی تحمل می کند.

۴- رطوبت زیاد

رطوبت زیاد باعث پوسیدن ریشه گیاه و توسعه بیماری های قارچی می شود.



تنک گردن

واکاری



۵- اثر باد

خسارت باد بر محصول سیب زمینی

عوامل گیاهی:

ضعف قوه نامیه یا قدرت نامیه (چپ) و زیادی آن (راست) در سبز شدن بذرها بسیار مؤثر است.



بذرهای بعضی از گیاهان ممکن است پوک باشند و به همین دلیل بعد از استقرار در خاک یا اصلاً جوانه نمی زنند یا ممکن است جوانه زده ولی سر از خاک در نیاورند.



عوامل جانوری:

جوندگان از آفات مضر محسوب می شوند برخی از پرندگان مثل کلاغ، بذرها را می خورند یا از گیاهان تغذیه می کنند.

آبدزدک از ریشه و طوقه گیاه را قطع می کند و مورچه بذرها را خورده یا جمع آوری می کند.



پیشگیری | مبارزه

همیشه پیشگیری بهتر از مبارزه با آفات است.



نصب حصار، توری،
دیوار، پرچین، کابل یا
سیم های فلزی افقی
فوایل معین



استفاده از آنک در
مراعع



دفن سریع لانه
حیوانات تلف شده برای
جلوگیری از جلب توجه
حیوانات گوشتخوار



استفاده از نور و روشن
گردان آتش در هنگام
احتمال حمله و حوش



بارگرداندن احتمام به
 محل های نگهداری آنها
تا پیش از تاریک شدن
هوا خصوصاً در فصل
زمستان و در مناطق
سردمر



ایجاد سر و صدا و
تبلندازی هوانی

عوامل خاکی

در زمین سله بسته بذر سبز نمی شود. سله شکنی به ویژه در زمین های رسی ضروری است.



معمولًاً پیش از کشت بذر یا نشا، زمین را باید به خوبی تسطیح کنیم. در غیر این صورت، در موقع واکاری عمل تسطیح به سختی انجام می گیرد.

عوامل مکانیکی

۱- منظم نبودن ماشین های کارنده یا ردیف کار ۲- عدم استقرار بذر راه کار: بررسی و یافتن علت سبز نشدن بذرها. برای جلوگیری از کاهش عملکرد و هدر رفتن هزینه و وقت تنظیم ماشین و یا واکاری.



فعالیت
عملی



مزارع سبزی ها و صیفی های هنرستان یا زمین های اطراف خود را مشاهده و بررسی کنید. آیا تراکم بوته ها مناسب است. آیا زمین های فوق به واکاری نیاز دارد؟ دلیل عدم سبز نکردن بذرها یا نشاها چه بوده است؟ گزارش کامل و جامعی تهیه و به هنرآموز خود ارائه دهید.

زمان واکاری

همه روزه از زمین سبزی یا صیفی بازدید کرده و به محض مشاهده خالی بودن بعضی از قسمت های زمین با نشا نسبت به واکاری اقدام کنید.

زمان واکاری:

بلافاصله بعد از سبز کردن بذرها یا اطمینان از خشک شدن نشاها در زمین اصلی

روش‌های واکاری

روش‌های واکاری



کاشت بذر در فواصل خالی بوته‌ها



کاشت نشا در قسمت‌های خالی زمین



از بوته‌های اضافی حاصل از تنک‌کردن هم می‌توان برای واکاری استفاده کرد.

کاشت مجدد بذر

فعالیت
عملی



- ۱- قطعه زمین سبزی کاشته شده در قبل را که نیاز به واکاری دارد، انتخاب کنید.
- ۲- مقدار بذر مورد نیاز برای واکاری را پیش بینی کرده و تهیه کنید.
- ۳- بذرها را در لای پارچه با کیسه مرطوب قرار دهید تا جوانه بزند.
- ۴- بذرها جوانه زده را با احتیاط به وسیله شفره یا بیلچه در محل های خالی بکارید.
- ۵- بلافضله زمین واکاری شده را آبیاری کنید.
- ۶- از مراحل مختلف کار گزارش تهیه و به هنرآموز خود ارائه دهید. (عکس و تصاویر).



کاشت مجدد نشا

- ۱- قطعه زمینی را که قبلاً نشاکاری کرده بودید و نیاز به واکاری دارد، انتخاب کنید.
 - ۲- قطعه زمین فوق را برای عملیات واکاری آبیاری کنید (جوی ها را از محل داغ آب پر کنید).
 - ۳- نشاء مورد نیاز را تهییه کنید.
 - ۴- زمین خزانه را از هر جهت برای انجام عملیات انتقال مهیا کنید.
 - ۵- نشاهای خوب و سالم را بعد از فراهم شدن شرایط انتقال از خزانه به زمین اصلی انتقال دهید و بکارید.
 - ۶- از مراحل مختلف واکاری گزارش تهییه کرده و به هنر آموز خود ارائه دهید.
- در صورت سبز نشدن اکثر بذر یا نشاه، کاشت مجدد در کل زمین لازم است.

فعالیت
عملی



ارزشیابی شایستگی واکاری

۱ شرح کار:

۱- آماده سازی بذر ۲- آماده سازی بستر سبزی ۳- بذر ریزی یا نشا کاری ۴- پوشاندن بذر ۵- آبیاری

۲ استاندارد عملکرد:

واکاری ۲۰۰۰ بوته یا ۱۰۰ مترمربع در یک روز کاری در شرایط مطلوب
شاخص ها:

کاشت بذر سبزی یا نشا و انجام واکاری

۳ شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مزرعه سبزی - تأمین بذر یا نشا مورد نیاز - زمان مناسب کاشت
ابزار و تجهیزات: لباس کار - وسایل ایمنی فردی - سومون مجاز قارچ کش - کود دامی - خاک - بشکه - بیل - فرغون - خط کش
کاشت - ریسمان - قیچی باگبانی

۴ معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	جمع آوری بقایای خشک شده گیاهان	۱	
۲	تهییه بذر	۱	
۳	آماده سازی بذر	۲	
۴	آماده سازی بستر	۲	
۵	کاشت مجدد	۲	
	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: تصمیم گیری - مدیریت مالی - مدیریت زمان - درستکاری	۲	
*	میانگین نمرات		

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری ۵

تنک

مقدمه

فرایند تنک کردن (Thinning) گیاهان کار ظاهراً سختی است که مجبور هستیم در کشت سبزی و صیفی با آن رو به رو شویم. آگاهی از زمان مناسب برای تنک کردن و چگونگی انجام این کار برای سلامت گیاهان و موفقیت کار اهمیت زیادی دارد. عمل تنک کردن گیاه به این منظور انجام می‌شود که فضای کافی برای رشد گیاهان فراهم شود و گیاهان بتوانند همه عوامل لازم برای رشد مناسب خود از جمله رطوبت، نور، مواد مغذی و غیره را دریافت کنند بدون این که لازم باشد با گیاهان دیگر بر سر این منابع رقابت داشته باشند. هنگامی که گیاهان را تنک می‌کنید، به بھبود گرداش هوا در اطراف آنها نیز کمک می‌کند. اگر گیاهان خیلی به هم نزدیک باشند جریان هوا بین آنها محدود شده و ممکن است بیماری‌های قارچی به خصوص در صورت مرطوب‌ماندن برگ‌ها به مدت طولانی، ایجاد شده و گسترش پیدا کنند.

استاندارد عملکرد

فرد در شرایط مناسب آب و هوایی مساحت ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع را در یک روز کاری تنک نماید.

تنک‌گردن



برداشت خود را از تصویر مقابل در یک سطر توضیح دهید.

تراکم بوقه


تعداد بوقه در واحد سطح زمین را تراکم بوقه گویند. تراکم بوقه اثرات زیادی بر عملکرد محصول دارد. بطوری که گاهی تراکم بوقه را عامل رقابت می‌نامند. یعنی هرچه عملکرد کل بوقه‌ها در واحد سطح بهعلت افزایش تعداد بوقه‌ها افزایش می‌یابد، کاهش وزن هر بوقه این افزایش را خنثی می‌کند. لذا دانستن عوامل مؤثر بر تراکم بوقه حائز اهمیت می‌باشد.

گفت و گو
کنید



چرا باید بوقه‌های مزرعه را تنک کرد؟

مساحت مستطیل در شکل
مقابل ۱ مترمربع است



چرا باید بوقه‌های مزرعه را تنک کرد؟

ضرورت تنک‌گردن

پس از کاشت بذر و آبیاری مزرعه، گیاهچه‌ها سر از خاک بیرون می‌آورند. در بعضی از موارد مشاهده می‌شود که ۲ تا ۳ بذر در یک جا که در نتیجه بذر پاشی زیاد در واحد سطح می‌باشد، سبز می‌شوند (شکل الف):



ب) تراکم بوقه به تعداد نیاز است (تراکم مطلوب)



الف) تراکم بوقه دو برابر تعداد مورد نیاز است
(تراکم نامطلوب)



برای اینکه تراکم بوته‌ها در شکل الف به حد استاندارد برسد، باید نصف بوته‌ها را تنک کرد.
حذف بوته‌های اضافی را تنک کردن می‌نامند.
تنک کردن بوته‌های اضافی پس از برطرف شدن خطرات احتمالی تگرگ، سرما یا یخ‌زدگی ضروری است؛
چون:



تنک کردن بر عکس واکاری می‌باشد اما هدف هر دو عملیات یکی بوده و آن هم به حد استاندارد و مطلوب رساندن تعداد بوته‌ها در واحد سطح یا طول (در کشت ردیفی یا خطی) می‌باشد.
در صورت تراکم بالا در استفاده از عوامل محیطی بین بوته‌ها رقابت پیش خواهد آمد.

هنرجویان در حین بازدید از مزارع مختلف در منطقه تحصیلی و زندگی خود، بررسی کنند که به چه دلایلی بذر بیشتری نسبت به حد استاندارد در زمین پاشیده یا کاشته می‌شود و سپس گزارش مربوط به آن را در کلاس ارائه دهند.

پژوهش
کنید



علت تنک کردن

درباره علت تنک کردن گفت و گو کنید.

گفت و گو
کنید



تنک کردن سبزی‌ها و صیفی‌ها مانع بروز رقابت بین بوته‌ها از نظر دریافت نور و مواد غذایی می‌شود و از طرف دیگر تنک نکردن باعث کاهش تهویه و افزایش رطوبت و در نتیجه افزایش بیماری‌های گیاهی و بالاخره کاهش عملکرد محصول می‌گردد. بنابراین بهمنظور افزایش عملکرد و تولید محصول با کیفیت بالا باید نسبت به تنک کردن مزرعه اقدام کرد.

۱- فواید تنک کردن


گفت و گو
کنید



درباره فواید تنک کردن بحث و گفت و گو کنید.

اثر نور در گیاهان: ۱- عمل متابولیسم ۲- فتوسنتز ۳- تنظیم رشد گیاه ۴- تولید مواد پروتئینی و گلوسیدها(قند) ۵- مرحله زایشی گیاه ۶- فتوتروپیسیم
بطور کلی گیاهان مختلف برای گلدهی به طول روزهای مختلفی احتیاج دارند و در این ارتباط به گروههای زیر تقسیم می شوند:

الف - گیاهان روز کوتاه: برای گلدهی به روز کوتاه و در واقع به شب بلند احتیاج دارند (۱۵ الی ۱۲ ساعت); مانند: مارچوبه، باقلاء، لوبیا، هویج و سیب زمینی



ب - گیاهان روز بلند: نباتاتی هستند که برای گلدهی به روز بلند و شب کوتاه نیاز دارند (۱۴ الی ۱۸ ساعت); مانند اسفناج، پیاز، کلم، شلغم، انواع کدوئیان.

ج - گیاهان بی تفاوت (روز خنثی): این گونه گیاهان به طول روز حساس نیستند و در هر طول روزی که قرار بگیرند گل می دهند؛ مانند گوجه فرنگی.



بررسی: چرا ارقام مختلف گیاهان در داخل یک گونه نیز در کشت‌های زمستانه به یک صورت عمل نمی‌کنند؟

- | | |
|--|--|
| ۴- نسبت سطح برگ به وزن برگ
۵- روش کشت گیاهان
۶- تغییرات مختلف واکنش‌های فیزیولوژیکی رشد؛ مانند نورگرایی و بهاره کردن | پاسخ:
۱- استفاده ناچیز از انرژی نورانی
۲- شدت تنفس
۳- تولید برگ |
|--|--|

نورگرایی (Phototropism): تمایل اندام هوایی گیاه به سمت نور. انتخاب ارقام مناسب زمانی که نور کم است، اهمیت بسیار دارد. بهاره کردن (Vernalization): وادار کردن گیاه به گلدهی با قراردادن آن در معرض سرمای زمستانی.



پژوهش
کنید




هنرجویان با قراردادن چند گلدان از یک نوع گیاه در تاریکی، سایه و نور مستقیم آفتاب اثرات نور را برروی گیاه مشاهده و تغییرات و نحوه رشد و نمو هر گلدان را ضمن مشاهده، یادداشت و گزارش مربوط به آن را در کلاس درس ارائه دهند.

۲- عدم تهویه در منطقه رشد و نمو گیاهان

در مورد متناسب کردن هوا و تهویه در منطقه رشد و نمو گیاهان بحث و گفت و گو کنید.



گفت و گو
کنید



کدام گازها در رشد و نمو گیاهان تأثیر بیشتری دارند؟

گفت و گو
کنید



 گیاهان با عمل فتوستز گاز کربنیک گرفته و اکسیژن پس می دهند.	 ترکیب اکسیژن با عناصر دیگر را اکسیداسیون می گویند.
 کربن	 گاز کربنیک

ترکیب هوای طبیعی
تعدادی از گازهای مهم در نمودار بالا آمده است.

الف) اکسیژن: برای تنفس انسان و سایر موجودات هوایی ضروری است.

(ب) ازت (نیتروژن)

نیتروژن در ترکیب مواد آلی از جمله کلروفیل یا سبزینه گیاه نیز وجود دارد.

(ج) گاز کربنیک

گاز مهمی است که در عمل کربن گیری برای ساختن قندها دخالت دارد.


[بالا بودن میزان محصول اثر گاز کربنیک تنظیم دمای محیط]

گاز کربنیک حرارت زیاد آفتاب را گرفته و در سرما این حرارت ذخیره شده را پس می‌دهد.

کاهش فتوسنترز → کاهش گازها در اکوسیستم گیاهی → جریان نیافتن هوا

غلظت گاز کربنیک در شرایط تابش نور شدید در مناطق سبزی کاری < 250 قسمت در میلیون است.
غلظت گاز کربنیک در شرایط تابش نور شدید در مزارع سبزی کاری حدود ۱۵۰ قسمت در میلیون است.
غلظت زیاد گاز کربنیک در پرورش سبزی ها و صیفی های گلخانه ای دارای اهمیت زیادی است.
تهویه اجباری در گلخانه ها باعث کاهش سریع رطوبت خواهد شد.

۳- رطوبت مناسب



گفت و گو
کنید



رطوبت چه تأثیراتی در رشد و نمو سبزی ها و صیفی جات دارد؟
با افزایش هوا و کاهش تعرق و ظرفیت بالای آب، گیاهان به حداقل توان رشد دست می‌یابند.
کاشت سبزی ها و صیفی جات در مناطقی که نزدیک به دریا، دریاچه و سایر مناطق مرتبط هستند به دلیل رطوبت هوا بسیار مناسب است؛ از طرفی رطوبت خیلی زیاد هم برای گیاهان مناسب نیست زیرا موجب بروز بیماری در گیاهان (مانند گوجه فرنگی) می‌شود.

۴- کاهش رقابت بین بوته ها

گفت و گو
کنید



اگر تعداد بوته ها در واحد سطح بیش از حد استاندارد باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

۵- حداکثر استفاده از امکانات مؤثر در رشد

گفت و گو
کنید



چرا آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز به بوته‌های ضعیف بیشتر خسارت می‌زنند؟

تراکم بالای بوته‌ها (فاصله کمتر از حد بین آنها) مانع انجام عملیات داشت و برداشت می‌شود.



گفت و گو
کنید



هنرجویان دو مزرعه تنک شده و نشده را از نظر عملکرد محصول (كمی و کیفی) مقایسه و گزارش مربوط به آن را به هنرآموز خود ارائه دهند.

پژوهش
کنید



عوامل مؤثر در ایجاد تراکم بیش از حد مطلوب بوته

عوامل زیادی در ایجاد تراکم بیش از حد مطلوب بوته‌ها در واحد سطح وجود دارد که مهم‌ترین آنها به شرح ذیل می‌باشد:

■ عوامل مؤثر بر ایجاد تراکم بیش از حد مطلوب

- ۱- نحوه آبیاری
- ۲- میزان دریافت نور
- ۳- ضدغافونی بذر
- ۴- استفاده از قیم
- ۵- عملیات مدیریتی در مزرعه
- ۶- وضعیت حاصلخیزی خاک
- ۷- طول دوره رویش گیاه
- ۸- زمان و روش کاشت
- ۹- عوامل اقلیمی
- ۱۰- قوه نامیه بذر
- ۱۱- نوع بذر
- ۱۲- حجم بوته

■ زمان مناسب کاشت: ۱- عدم نیاز به کشت بذر زیاد

۲- نامساعد بودن شرایط جوی

۳- عدم خطرات آفات

■ دلایل کاشت بیش از حد بذر: ۱- عدم اطمینان از رویش تمام بذرها

۲- احتمال از بین رفتن بذر در اثر عوامل


جوی

گفت و گو
کنید



در مورد عوامل موثر در ایجاد تراکم بیش از حد مطلوب بوته‌ها در واحد سطح بحث و گفت و گو کنید.

قوه نامیه بذر:



نوع بذر:

تخم کدو چون دارای چربی است؛ احتمال پوسیدنش در خاک زیاد است.



نوع رقم:



ارقام پررشد یک نوع سبزی نسبت به ارقام کمتری در واحد سطح نیاز دارند.

رقم گوجه فرنگی ایرلی گرل (Early girl): دارای رشد نامحدود (Indeterminate) است و نیازی به قیم ندارد.

رقم گوجه فرنگی پاکوتاه رینر (Reiner): دارای رشد محدود (Determinate) است و احتیاج به قیم و فضای زیادتری برای رشد دارد و برداشت آن سخت است.


حجم بوته‌ها

تراکم بوته‌های پیاز (دارای شاخ و برگ کم) در واحد سطح، چندین برابر هندوانه (دارای شاخ و برگ زیاد) در نظر گرفته می‌شود

طول دوره رویش گیاه:

– دوره رویش کوتاه تراکم بیشتر – دوره رویش طولانی تراکم کمتر

نحوه آبیاری:



وضعیت حاصلخیزی خاک:



شکل ۴: مقایسه وضعیت رشد بوته‌ها در دو حالت تراکم بالا (راست) و پایین (چپ).

عملیات مدیریتی در مزرعه:

- لزوم کم کردن تراکم بوته‌ها
- انجام درست عملیات زراعی (آبیاری، سله‌شکنی، تنک، وجین و...)
- عدم استفاده از قیم
- دریافت نور بیشتر توسط گیاه
- دوره رویش طولانی
- آبیاری نشتی
- زمین حاصلخیز
- بدرا مرغوب
- دارای شاخ و برگ زیاد
- اطمینان از رویش تمام بدراها

استفاده از قیم:

میزان دریافت نور:

محاسبه تعداد بدرا لازم در واحد سطح

برای تهیه بدرا ابتدا بایستی تعداد و یا وزن بدرا مورد نیاز را تعیین کنید. حال اگر فواصل کشت بدراها مشخص باشد، به راحتی با فرمول زیر می‌توان تعداد بدرا یا بوته لازم در واحد سطح را به دست آورد:

$$\text{مساحت (مترمربع)} = \frac{\text{تعداد بوته}}{\text{فاصله ردیف‌ها (متر)} \times \text{فاصله بوته‌ها (متر)}}$$

اگر فرض کنیم که فاصله بوته‌ها ۴۰ و فاصله ردیف‌ها از هم ۵۰ سانتیمتر باشد، طبق فرمول فوق تعداد بوته در هر هکتار (۱۰۰۰۰ مترمربع) ۵۰۰۰۰ بوته خواهد بود:

$$\text{بوته در هکتار} = \frac{۱۰۰۰۰}{(۰/۴۰ \times ۰/۵۰)} = ۵۰۰۰۰$$

اگر فاصله بوته‌های یک نوع صیفی ۳۵ سانتیمتر و فاصله ردیف‌ها ۴۵ سانتیمتر باشد، تعداد بوته‌ها در ۲ هکتار چه تعداد باید باشد؟

محاسبه
کنید

+ -
× ÷

هنرجویان پژوهش کنند که ایجاد تراکم بیش از حد مطلوب و غیراستاندارد در کشت سبزی‌ها و صیفی‌ها در منطقه تحصیلی و زندگی خود به دلیل کدام عوامل است و گزارش مربوطه را در کلاس درس ارائه دهند.

پژوهش
کنید



مراحل رشد گیاه:

هنرجویان با استفاده از منابع مکتوب و غیرمکتوب و همچنین بازدید میدانی در مورد مراحل رشد گیاه شامل تعداد برگ بوته، اندازه بوته و غیره بررسی و تدبیرکرده و نتایج را در کلاس ارائه کنند.
زمان مناسب تنک کردن

گفت و گو
کنید



در مورد زمان‌های مناسب تنک کردن بحث و گفت و گو کنید.

زمان تنک: هنگام عصر، زمین مرطوب، مرحله ۲ تا ۴ برگی





**حذف بوتهای مریض
(مانند بیماری ویروسی موzaئیک
خیار و یا بیماری قارچی بوته میری)
در هنگام تنک ضروری است**

چنانچه احتمال بروز آفت خاص، یخنبدان یا تگرگ وجود دارد، بهتر است تنک در دو نوبت انجام گیرد.

هنرجویان در منطقه تحصیلی و زندگی خود پژوهش کنند که کشاورزان در چه زمان یا زمانهایی و در چه مرحله‌ای از رشد سبزی یا صیفی نسبت به تنک کردن اقدام می‌کنند و سپس گزارش خود را در کلاس درس ارائه دهند.

پژوهش
کنید



علامت‌گذاری محل‌های مورد نیاز تنک



با استفاده از چارچوب یا حلقة گمانه‌زنی به صورت تصادفی در مزرعه در اندازه‌گیری تراکم بوته در صورت دانستن مساحت چارچوب یا حلقة گمانه‌زنی و شمارش تعداد بوته‌ها در داخل آن با یک تناسب ساده می‌توانید تراکم بوته را محاسبه کنید.

محاسبه
کنید



تعداد بوته‌های مزرعه‌ای را با استفاده از روش علامت‌گذاری (چارچوب گمانه یا حلقة گمانه) محاسبه کنید و سپس آن را با استاندارد تعداد بوته‌های آن سبزی یا صیفی مقایسه کنید.



تعیین مناطق پر تراکم بوته در مزرعه

وسایل مورد نیاز:

۱- لباس کار ۲- چارچوب گمانه یا حلقة گمانه

مراحل انجام کار:

- ۱- لباس کار خود را بپوشید.
- ۲- با دقیقت و بدون لک کردن بوته ها وارد مزرعه شوید.
- ۳- وضعیت رویش بوته ها را از نظر تراکم بررسی کنید.
- ۴- تعداد بوته در واحد سطح یا طول را با استفاده از چارچوب گمانه یا حلقة گمانه بررسی کنید.
- ۵- با توجه به استاندارد کشت گیاه موردنظر (تراکم مطلوب بوته در واحد سطح یا طول) نظر خود را درخصوص نیاز یا عدم نیاز مزرعه به تنک به هنرآموز بگویید.
- ۶- اقدامات و یافته های خود را جمع بندی و گزارش مربوط به آن را تهیه و به هنرآموز تحويل دهید.

روش های تنک کردن

عوامل مؤثر بر تنک کردن: ۱- سطح زیر کشت ۲- روش کاشت ۳- مرحله رشد گیاه

روش های تنک کردن: ۱- دستی ۲- ماشینی

۱- روش دستی

تنک کردن دستی دارای کیفیت خوبی است زیرا بوته های ضعیف حذف می شوند و دو بوته در کنار هم باقی نمی مانند و در نتیجه به بوته های باقیمانده آسیب نمی رسد. روش دستی در کاشت پراکنده و غیر ریدیفی انجام می گیرد. در بسیاری از موارد برای جلوگیری از آسیب به ریشه بوته های باقیمانده، بریدن و قطع کردن بوته های اضافی با چاقو یا حتی ناخن صورت می گیرد. البته عیب تنک کردن دستی هزینه بالای آن، طولانی بودن مدت عمل و ضرورت مهارت و دقیقت کارگر است. تنک کردن باید با دقیقت و همراه با صبر و حوصله انجام گیرد تا بتوان به حداقل محصول دست یافت.



ابزار و وسایل دستی تنک کردن

بهتر است عمل تنک کردن را با ناخن انگشت و یا یک قیچی انجام دهید و بوتهای را که باید حذف شود از نزدیکی سطح زمین قطع کنید.



گیاهان غیرنشانی را برای تنک کردن، به جای کندن آنها بهتر است با استفاده از ناخن دست، کارد، قیچی و امثال آن از سطح زمین قطع کنید.
سبزی های برگی و ریشه ای چندان به تنک حساس نیستند و آنها را می توان در موقع تنک کردن با دست از زمین کند.



برای زمان هایی که احتمال بروز برخی آفات، خطر یخ‌بندان یا تگرگ است، توصیه می شود تنک کردن در دو مرحله انجام گیرد.
در سبزی های ریشه ای، بهتر است زمین را آبیاری کرده و پس از گاؤ رو شدن تنک کنید.

جدول اندازه مناسب فاصله بوته ها و بین ردیف های بعضی از سبزی ها و صیفی جات به سانتی متر

ردیف	نام سبزی یا صیفی	فاصله بین بوته ها	فاصله بین ردیف ها
۱	پیاز بذری(گیاهان پیازی)	۷/۵	۳۰
۲	هویج(گیاهان ریشه ای)	۲/۵	۳۰
۳	خیار(کدوئیان)	۴۵	۴۵
۴	خریزه(کدوئیان)	۹۰	۹۰
۵	بادمجان(از خانواده گوجه فرنگی)	۴۵	۴۵
۶	اسفناج (سبزی برگی)	۲/۵	۴۵
۷	گوجه فرنگی(از خانواده گوجه فرنگی)	۶۰	۶۰

لازم است پس از تنک کردن، خاک اطراف بوته های باقیمانده را به آرامی کمی سفت کنید. اگر گیاهان اضافی حاصل از تنک نشاء در زمین دیگری نیستند، باید آنها را جمع آوری و از مزرعه خارج سازید. در غیر این صورت ممکن است بوی آنها موجب جلب حشرات آفت به سمت مزرعه شود. پس از انجام عملیات تنک توصیه می شود که برای تقویت بوته های باقیمانده یکبار دیگر آبیاری صورت گیرد. این کار باعث می شود که خاک، دوباره اطراف ریشه ها را پر کند.



انجام عملیات تنک کردن به روش دستی

تنک کردن به روش دستی
مواد و وسائل مورد نیاز:

۱- لباس کار -۲- وسائل ساده و دستی تنک کردن مانند چاقو، قیچی، بیلچه ۳- فرغون ۴- بیل (برای مرتب کردن جوی ها و پشتله ها)

مراحل انجام کار:

۱- لباس کار خود را بپوشید.

۲- رطوبت مزرعه را از نظر گاو رو بودن بررسی کنید.

۳- وسائل و ابزار مربوط به تنک کردن را از انبار واحد آموزشی تحويل بگیرید.

۴- با توجه به نکات مربوط به تعیین مناسب ترین زمان تنک کردن بوته ها وارد مزرعه شوید.

فعالیت
علمی



- ۵- قسمت‌های مختلف مزرعه را از نظر تراکم بررسی کنید.
- ۶- در نقاط پرتراتراکم (تراکم بیش از حد استاندارد و مطلوب) بوته‌های قوی‌تر و شاداب‌تر را شناسایی کنید.
- ۷- بوته‌های اضافی را با رعایت و مراقبت و حفظ بوته‌های قوی و شاداب، حذف کنید.
- ۸- بوته‌های اضافی را جمع‌آوری و از آنها برای تهیه کود کمپوست استفاده کنید و در غیر این صورت نسبت به حذف و انهدام آنها اقدام نمایید.
- ۹- سطح مزرعه را از نظر جوی‌ها و پشت‌های که در اثر عملیات تنک تغییر پیدا کرده‌اند، مرتب کنید.
- ۱۰- جوی‌های آبیاری مزرعه را بازسازی کنید.
- ۱۱- وسایل و ابزار را تمیز و به انبار واحد آموزشی تحويل دهید.
- ۱۲- عملکرد و یافته‌های خود را ثبت و به هنرآموز گزارش کنید.


توجه



در حین عملیات تنک، نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنید.

۲- روش مکانیزه

علت استفاده از روش مکانیزه تنک کردن	\Rightarrow	مشکل گرانی دستمزد و کمبود کارگر کشاورزی
سرعت ماشین‌های تنک‌کننده	\Rightarrow	۲۰ برابر یک کارگر
دقت ماشین‌های تنک‌کننده	\Rightarrow	۹۸ درصد



دو نوع ماشین تنک کننده کاهو

از ماشین‌های تنک‌کننده برای تنک‌کردن محصولاتی که به طور ردیفی کشت شده‌اند، استفاده می‌شود. متدالول ترین این ماشین‌ها، تنک‌کن دور است که وظیفه آن نابود کردن بوته‌های اضافی روییده در ردیف، به منظور تنظیم فاصله‌های بوته‌ها بر روی ردیف‌های کشت است.


الف - ماشین‌های تنک کننده تصادفی :

در این روش به صورت تصادفی نسبت به تنک‌کردن بوته‌های سبزی و صیفی اقدام می‌نمایند. بدین ترتیب که به صورت تصادفی مثلاً هر ۱۵ سانتی متر یک فاصله باقی گذاشته و بقیه سطح خاک را می‌تراشد. این روش اغلب

مطلوب نیست چون هیچگونه انتخابی در حذف و حفظ بوته‌ها بر حسب کیفیت آنها صورت نمی‌گیرد.

ب - ماشین‌های تنک کننده هوشمند:

این ماشین‌ها دارای چشم الکتریکی بوده و به طور دقیق بوته‌های اضافی را حذف می‌کنند.



الواع ماشین‌های تنک کننده
هوشمند
دوار
تصادفی (این روش مطلوب نیست)

تنک گل و میوه

علت تنک گل یا میوه = حفظ تعادل نسبت برگ به میوه

تنک صحیح گل یا میوه ← افزایش کیفیت میوه‌های باقی‌مانده (اندازه، شکل و یکنواختی)



■ در پرورش خیار در گلخانه در هر گره (زاویه برگ) روی ساقه اصلی و جانبی فقط یک خیار باقی گذاشته و بقیه حذف می‌شوند (مگر در برخی ارقام اصلاح شده که در هر گره می‌توان گاهی ۴-۵ میوه برداشت کرد).
■ راه دیگر تنک کردن برداشت به موقع محصول خیار است.



■ در واریته‌هایی که نیاز به تنک میوه دارند، روی هر خوش فقط ۳ گل (در آب و هوای سرد و ابری پاییز و زمستان) یا ۴ گل (در آب و هوای گرم و آفتابی بهار و تابستان) را نگهداشته و بقیه را حذف می‌کنند.

■ حذف گل‌ها در گوجه‌فرنگی وقتی باید انجام گیرد که آنها تازه تشکیل یافته و هنوز بزرگ نشده‌اند (برای جلوگیری از اتلاف بیهوده انرژی و موادغذایی گیاه و ضعف بوته‌ها).

انجام هرس گل یا میوه به تجربه و دقت کافی نیاز دارد.

باید در انجام این کار عواملی مانند قدرت بوته و شرایط آب و هوایی مد نظر گیرد.



تنک کردن گل و میوه:

وسایل مورد نیاز:

۱- لباس کار ۲- چاقو برای تنک کردن

مراحل انجام کار:

۱- لباس کار خود را بپوشید.

۲- چاقوی مناسب برای تنک کردن گل های اضافی بوته ها را انتخاب کنید.

۳- با احتیاط و بدون اینکه آسیبی به گیاهان وارد شود، داخل مزرعه شوید.

۴- با توجه به استاندارد تعداد گل و میوه در روی هر گیاه، نسبت به حذف گل ها و میوه های اضافی بوته ها اقدام کنید.

۵- کلیه گل ها و میوه های حذف شده بوته ها را در یک یا چند محل مزرعه جمع آوری کنید.

۶- کلیه گل ها و میوه های حذف شده را منهدم و یا برای تهیه کود در محل مناسب قرار دهید.

۷- چاقو و لباس کار خود را در محل مناسب قرار دهید.

اقدامات پس از تنک کردن:

در صورت خراب شدن قسمت هایی از مزرعه بعد از تنک، باید نسبت به اصلاح و ترمیم مسیرهای آب (جوی و پشتہ ها یا سایر شیوه های آبیاری) اقدام کرد.

نتایج تنک کردن:

تنک کردن بوته ها در مزارع و گلخانه ها نتایج متعددی دارد که تعدادی از آنها عبارت اند از :

۱- باعث افزایش عمل کربن گیری شده و در نتیجه رشد گیاهان را افزایش می دهد.

۲- عملکرد محصول را در واحد سطح افزایش می دهد.

۳- رقابت بین بوته ها را برای جذب مواد غذایی کاهش می دهد و در نتیجه تولید محصول افزایش می یابد.

هنرجوی عزیز با استفاده از منابع مکتوب و غیرمکتوب و همچنین بررسی میدانی نتایج تنک کردن را شناسایی و بنده های زیر را تکمیل کنید.

.....۴

.....۵

.....۶

ارزشیابی شایستگی تنک

۱ شرح کار:

- تصاویر انجام عمل تنک (قبل از تنک بعد از تنک)
 ۱- ارزیابی مناسب بودن زمان تنک کردن ۲- بررسی وضع تراکم مزرعه ۳- تعیین نقاط پر تراکم ۴- انتخاب ابزار و وسایل ۵- کندن بوته های نزدیک به بوته هدف با دست ترمیم شکل سطح زمین ۶- انجام آبیاری

۲ استاندارد عملکرد:

فرد در شرایط مناسب آب و هوایی مساحت ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع را در یک روز کاری تنک نماید.
شخص ها:
 آسیب ندیدن گیاهان باقی مانده.
 قوی و مناسب بودن گیاهان باقی مانده.
 تناسب الگوی ایجاد شده با الگوی مناسب کاشت.
 مناسب بودن زمان انتخاب.
 مرتب و منظم بودن شکل سطح مزرعه پس از اتمام عملیات.
 آبیاری شدن مزرعه بعد از کار.

۳ شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مزرعه سبزی با تراکم بالا بیل - بیلچه - دستکش
 گیاه در مراحل ۲ تا ۴ برگی تا حد اکثر ۶ برگی - اطمینان از عدم بروز عوامل زراعی و اقلیمی کاهش دهنده تراکم
 شرایط مناسب آب و هوایی و خاک گاو رو
 وجود آب برای آبیاری
ابزار و تجهیزات: بیل - بیلچه - دستکش - کلاه

۴ معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنر جو
۱	انتخاب زمان تنک کردن	۲	
۲	تعیین محل های تنک کردن	۲	
۳	انجام تنک کردن	۲	
۴	عملیات تکمیلی	۲	
	شاپیتگی های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: شاپیتگی های غیرفنی: تصمیم گیری - مدیریت زمان - مدیریت مواد و تجهیزات / اینمنی و بهداشت	۲	
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنر جو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری ۶

سله شکنی

مقدمه

معمولًاً وجین و سله شکنی به طور هم‌زمان با یک وسیله صورت می‌گیرد. سله، لایه سخت و متراکمی است که در خاک‌های سنگین تا نیمه‌سنگین و تحت فشار آب تشکیل می‌شود. تخریب ساختمان خاک در اثر خاک‌ورزی در وضعیت خشک یا خیس بودن خاک بر حساسیت خاک نسبت به عوامل مولد سله می‌افزاید. عوامل تشدید سله، تر و خشک شدن متوالی خاک، کمبود ماده آلی، جایگزین شدن کلسیم توسط سدیم و زیادی رس خاک است. مهم‌ترین ضرر سله بستن خاک این است که رشد گیاه با نقصان روبه رو می‌شود. در مواردی که دانه یا بذر کوچک باشد شاید بتواند به راحتی از مابین شکاف‌های سله بیرون بیاید ولی در حالتی که دانه یا بذر حجیم باشد امکان دارد رشد با نقصان روبه رو شود و لپه‌ها مابین سله باقی بماند و در اثر تدوام رشد محور زیر لپه، قطع می‌شوند. سله نفوذپذیری خاک را نسبت به هوا و آب کم می‌کند. شرایط مناسب برای فرسایش را ایجاد می‌کند و باعث مشکلاتی در آبیاری می‌شود و همچنین تهویه خاک را محدود می‌کند.

استاندارد عملکرد


سله شکنی - ۲۰۰۰ متر مربع با فوکا - ۷ هکتار با تراکتور و کولیتواتور در یک روز کاری

در مورد شکل‌های زیر نظر دهید:



سله در خاک و نحوه خروج گیاه از خاک‌های سله بسته

در سطح خاک بعضی از مزارع، شکافها و درزهای مشاهده می‌شود که این پدیده را در اصطلاح کشاورزی، سله می‌گویند.



از فضاهای خالی بین ذرات آب و هوا جایه جا می‌شوند.

گفت و گو
کنید

هنرجویان در مورد دلایل مختلف سله و سله‌بستان خاک در گروه خود بحث و تبادل‌نظر کنند و بعد نظرات را در کلاس درس ارائه دهند.



دلایل مختلفی برای تشکیل سله و سله‌بستان در خاک وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌انداز:



- ۱ وجود رس زیاد در بافت خاک
- ۲ کمبود ماده آلی خاک
- ۳ بارندگی شدید و نحوه نامناسب آبیاری
- ۴ فشردگی و متراکم شدن خاک

۱- وجود رس زیاد در بافت خاک


رس‌ها ذراتی از خاک
هستند که فقط کمتر
۰۰۵ میلی‌متر دارند.

خاک رسی یا سنگین، در صد
بالایی ذرات رس دارد.

خاک‌های رسی در اثر جذب
آب منبسط و با از دست
دادن آب منقبض می‌شوند.

درنتیجه باعث ایجاد ترک
در سطح خاک شده و سبب
قطع ریشه گیاهان می‌شود.

۲- کمبود مواد آلی در خاک



کمبود مواد آلی

جانداران ریز و درشتی که در خاک زندگی می‌کنند (کرم‌ها، موریانه‌ها، حشرات، جلبک‌ها، قارچ‌ها و غیره) همگی در اثر فعالیت‌های خود باعث به وجود آمدن مواد آلی در خاک می‌شوند.



هنرجویان عزیز به سیله بیلچه یا بیل، خاک را زیر و رو کنید و جانداران ریز و درشتی که در خاک زندگی می‌کنند را شناسایی و نتایج را در کلاس درس ارائه دهید.

تحقیق
کنید



۳- بارندگی شدید و نحوه نامناسب آبیاری

بارندگی شدید و یا نحوه نامناسب آبیاری سبب جمع شدن آب بر روی سطح خاک شده که این مورد در خاک‌های سنگین یا رسی منجر به سله بستن خاک می‌شود.

۴- فشردگی و متراکم شدن خاک



برخورد شدید قطرات آب به سطح خاک آبیاری غرقابی باعث از هم پاشیدگی ساختمان خاک و در نتیجه ایجاد سله می‌شود.



مضرات سله بستن

۱- ایجاد درز و شکاف در سطح خاک ۲- تخریب ساختمان خاک ۳- از دست رفتن رطوبت خاک ۴- قطع شدن ریشه‌های گیاه

بنابراین برای جلوگیری از خسارت حاصل از سله بستن، ضرورت دارد که سله خاک را از بین ببریم. سله‌شکنی و نرم کردن خاک و از بین بردن ترکها و درزهای ایجاد شده در سطح خاک با افزایش ماده آلی خاک به صورت دستی یا مکانیزه دارای ویژگی‌های بسیاری است از جمله ۱- حفظ ذخیره رطوبتی ۲- افزایش عملکرد در واحد سطح ۳- کاهش مشکلات ناشی از تنفس رطوبتی ۴- هوادهی بهتر خاک ۵- افزایش درآمد و رسیدن به توسعه پایدار



از زمین‌ها و مزارع دارای سله در محل سکونت خود بازدید و از دلایل سله بستن آنها گزارشی تهیه کرده و آن را در کلاس ارائه دهید.

روش‌های پیشگیری از سله بستن

هنرجویان عزیز ابتدا در مورد روش‌های پیشگیری از سله بستن در گروه بحث و تبادل نظر کنید و سپس نتایج را در کلاس ارائه دهید.

۱- اصلاح خاک

الف- افزوden کودهای حیوانی ب- افزوden کود برگ یا سبز پ- افزوden کمپوست ت- افزوden شن و ماسه و
(در نتیجه افزایش حاصلخیزی و جلوگیری از سله بستن)

مواد آلی در خاک ترکیباتی به نام کلوبیدهای آلی ایجاد می‌کنند. کلوبیدهای آلی باعث می‌شوند که ذرات خاک به یکدیگر متصل شده و در نتیجه خاک دانه‌های تشکیل شده بسیار محکم و پایدار گردند و به راحتی متلاشی نشوند. از سوی دیگر انجام آبیاری قبل از کاشت که به آن هیرم کاری می‌گویند، خطرات سله بستن خاک را در زمان جوانه زنی از بین می‌برد. به طور کلی در روش خشکه کاری که ابتدا بذر را در خاک نسبتاً خشک می‌کارند و سپس آبیاری می‌کنند، به ویژه در آبیاری به روش غرقابی و روش کاشت درهم، خطر سله بستن بیشتر شده که باید برای سله‌شکنی در اولین فرصت اقدام کرد.

فعالیت علمی



۱- لباس کار خود را بپوشید ۲- سه جعبه کشت به عمق ۱۵ تا ۱۵ سانتی‌متری را آماده کنید. ۳- یکی از جعبه‌ها را فقط با خاک رس پر کنید. ۴- یکی از جعبه‌ها را با خاکرس که با مواد آلی ترکیب شده است پر کنید. ۵- یکی از جعبه‌ها را با موادمعدنی ترکیب شده است پر کنید. ۶- سطح هر سه جعبه را به طور کامل و به یک میزان آب دهید. ۷- تفاوت خاک جعبه را پس از خشک شدن مشاهده کنید. ۸- گزارش نتایج آزمایش خود را به هنرآموز ارائه دهید.

۲- استفاده از روش‌های مناسب آبیاری

با استفاده از روش‌های مناسب آبیاری از جمله آبیاری نشتی و غیره به جای آبیاری غرفائی، می‌توان از سله‌بستن خاک‌ها جلوگیری کرد. (در آبیاری نشتی که آب در جویچه‌ها بین ردیف‌های کشت جاری است، فقط باعث سله‌بستن داخل جویچه‌ها می‌شود ولی بقیه مزرعه سله نمی‌بندد). البته اگر کشت به صورت درهم باشد، به ویژه در کشت‌های متراکم که به صورت کرتی کشت شده باشند، استفاده از آبیاری تنها روش ممکن برای شکستن سله می‌باشد. با رسیدن آب به زمین، سله نرم می‌شود و جوانه می‌تواند از زمین خارج شود.

یکی از روش‌های شکستن سله استفاده از آب آبیاری است. این روش هرچند ساده و آسان است ولی مشکلات و معایبی نیز دارد.

استفاده از این روش در مناطق گرم با کشت درهم، همراه با آب قابل دسترس روش مناسبی است.





معایب شکستن سله با آب آبیاری



زمان مناسب سله شکنی

انجام عملیات سله شکنی به صورت دستی یا ماشینی باید در زمان مناسب صورت گیرد. مناسب‌ترین زمان برای سله شکنی زمانی است که اصطلاحاً خاک، گاو رو شده باشد.

۱- لباس کار خود را بپوشید. ۲- از مزرعه واحد آموزشی بازدید کنید. ۳- وضعیت فیزیکی سطح خاک مزرعه را بررسی کنید.

فعالیت عملی



توجه



دقت کنید



روطوبت سطح مزرعه باید در زمان سله شکنی کمی کمتر از حد گاورو و تا حدودی خشک باشد.

- در صورت بروز سله، سطح خاک سفت می‌شود.
- هوای ابری و عدم تابش مستقیم خورشید مانع سفتی شدید سطح خاک می‌شود و ممکن است نیاز به سله شکنی را برطرف یا به عقب اندازد.


۴- در صورت مشاهده سله در سطح خاک، نظر خود را به هنرآموز بگویید.
۵- وضعیت رویشی سبزی‌ها و صیفی‌جات کاشته شده را بررسی کنید.
۶- با توجه به مرحله رشد گیاه کاشته شده (مرحله جوانهزنی، مرحله ۴ تا ۶ برگی) زمان مناسب سله شکنی را تشخیص دهید.

مراقب باشید



- در صورت احتمال بارندگی، سله شکنی را به عقب بیاندازید.
- در زمان سله شکنی هوا باید آرام و تا حد ممکن مساعد باشد.

ابزارها و وسایل سله‌شکنی به صورت دستی: ۱- بیل ۲- بیلچه ۳- کج بیل (فوکا) ۴- شفره ۵- کلوخ خردکن




ماشین‌های سله‌شکنی:



روش‌های سله‌شکنی:

در روش دستی از ابزار و وسایلی مانند بیل، بیلچه، کج بیل (فوکا)، کلوخ خردکن، شفره و در روش ماشینی از ماشین‌هایی مانند پنجه‌غازی، چنگک‌های گردان، گاوآهن قلمی استفاده می‌شود. برای انجام دادن سله‌شکنی به روش دستی به زمان و کارگر بیشتری نیاز است، اما در انجام سله‌شکنی به روش ماشینی نیاز به کارگر کمتری است و سله‌شکنی در زمان کوتاهی انجام می‌شود؛ اما هزینه‌های خرید ماشین‌های سله‌شکن و سروپس و نگهداری آنها نیز باید در نظر گرفته شود.



عملیات سله‌شکنی دستی:

فعالیت علمی



۱- لباس کار خود را بپوشید. ۲- زمین را آبیاری کنید. ۳- پس از مدتی خاک زمین را از نظر گاو رو بودن امتحان کنید.

۴- ابزار سله‌شکنی دستی شامل: بیل، کج بیل (فوکا)، کلوخ خردکن، شفره یا بیلچه را آماده کنید. ۵- با یکی از ابزارهای سله‌شکنی دستی بین ردیف‌های کاشت قرار گیرید. ۶- لایه سفت و سخت خاک با یکی از ابزارهای سله‌شکن دستی طوری شکسته شود تا کلیه ترک‌ها و شکاف‌ها و درزهای موجود در زمین از بین برده شوند.

توجه



فرد سله‌شکن به‌ نحوی باید بین ردیف‌ها قرار گیرد تا لطمehای به محصول وارد نشود. به عبارت دیگر محصول زیر پای فرد له نشود.

در صورت استفاده از بیل یا کج بیل (فوکا) برای سله‌شکنی باید سله‌شکنی با حالت ایستاده صورت گیرد و در صورت استفاده از شفره، سله‌شکنی به صورت نشسته انجام گیرد. در هنگام سله‌شکنی به اندام‌های گیاه صدمه‌ای وارد نشود.

عملیات سله‌شکنی مکانیزه:

برای انجام دادن عملیات سله‌شکنی با ماشین باید فعالیت‌های زیر انجام گیرد.

فعالیت علمی



۱- لباس کار خود را بپوشید. ۲- زمین را آبیاری کنید. ۳- پس از مدتی خاک زمین را از نظر گارو بودن امتحان کنید. ۴- دستگاه سله‌شکن را به پشت تراکتور متصل کنید. ۵- دستگاه سله‌شکن را با توجه به نوع کشت و فواصل ردیف‌ها و عمق مورد نظر تنظیم کنید.

۶- در صورت وجود سله در زمین بعد از سله‌شکنی با ماشین، نسبت به سله‌شکنی با ابزار دستی اقدام نمایید.

۷- دستگاه سله‌شکن را از پشت تراکتور جدا کنید.

۸- دستگاه سله‌شکن و کلیه وسایل و ابزار را تمیز و در محل خود قرار دهید.

به دلیل احتمال خرابی ساختمان خاک و به تبع آن کاهش قطر خاک دانه‌ها و کاهش نفوذپذیری خاک نسبت به آب و افزایش تبخیر سطحی آب از خاک، می‌توان از رتیواتور به جای دستگاه‌های دیگر در سله‌شکنی استفاده کرد.

توجه



۱- عملیات سله‌شکنی با ماشین به‌گونه‌ای باید انجام گیرد تا به محصول آسیبی نرسد و کلیه سله‌های بین ردیف‌ها از بین بروند.

۲- در کلیه مراحل انجام سله‌شکنی نکات ایمنی رعایت گردد.



اثرات سله‌شکنی

سله‌شکنی اثرات متعددی دارد که تعدادی از آنها عبارت‌اند از :

- ۱- حفظ رطوبت در خاک
- ۲- افزایش نفوذپذیری خاک نسبت به هوا
- ۳- جلوگیری از هدر رفت و اتلاف آب

هنرجویان با استفاده از منابع مختلف در مورد اثرات سله‌شکنی خاک تحقیق کرده و سپس نظرات خود را در بنویسند.

ارزشیابی شایستگی سله‌شکنی

۱ شرح کار:

عکس: زمین‌های سله بسته

- ۱- بررسی وضعیت رطوبت زمین
- ۲- انتخاب روش سله‌شکنی
- ۳- انتخاب وسیله
- ۴- انجام عملیات سله‌شکنی

۲ استاندارد عملکرد:

سله‌شکنی ۲۰۰۰ متر مربع با فوکا ۷ هکتار با تراکتور و کولیتواتور در یک روز کاری
شاخص‌ها:

خرد شدن تمامی سطوح سله بسته، سرعت سله‌شکنی با فوکا ۲۵۰ متر مربع سطح زمین در یک روز کاری با تولرانس ۲۵۰ متر مربع - سرعت سله‌شکنی با تراکتور و کولیتواتور یا روتویاتور ۷ هکتار در روز کاری با تولرانس یک هکتار

۳ شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: انجام سله‌شکنی در مزرعه در شرایط محیطی مزرعه

ابزار و تجهیزات: فوکا، بیل، شفره، کولیتواتور، روتویاتور، تراکتور، تراکتور باغی

۴ معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تعیین زمان سله‌شکنی	۲	
۲	تعیین ابزار سله‌شکنی	۲	
۳	انجام عمل سله‌شکنی	۲	
	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش	۲	
	تصمیم‌گیری، مدیریت مالی	*	
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.